

## 2023-24 年湖南省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库附答案（培优 B 卷）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: 成人末梢血  $8.0 \times 10$
- B: 成人静脉血  $3.0 \times 10$
- C: 成人静脉血  $4.3 \times 10$
- D: 新生儿  $16.0 \times 10$

答案：B

2. 特布他林平喘的主要机制是

- A: 拮抗 M 胆碱受体
- B: 抑制白三烯受体
- C: 阻断腺苷受体
- D: 激动肾上腺素  $\beta_2$  受体

答案：D

3. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次/分，律齐，无杂音。

- A: 支气管哮喘

- B: 慢性支气管炎合并肺气肿
- C: 阻塞性肺气肿
- D: 慢性支气管炎

**答案：A**

4. 解热镇痛药用于退热属于对症治疗，因此两次用药的间隔时间应该是

- A: 5~7 小时
- B: 3~5 小时
- C: 2~4 小时
- D: 4~6 小时

**答案：D**

5. 中成药舒肝丸具有舒肝和胃、理气止痛的功效，与其合用会导致作用相反、降低药效的药物是

- A: 地高辛
- B: 甲氧氯普胺
- C: 复方利血平
- D: 氯苯那敏

**答案：B**

6. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

- A: 10~18 例
- B: 12~13 例
- C: 20~24 例
- D: 20~30 例

**答案：D**

7. 患者，女，24 岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

- A: 过氧化苯甲酰凝胶
- B: 异维 A 酸片
- C: 阿达帕林凝胶
- D: 红霉素乳膏

**答案：B**

8. 氟乙酰胺杀鼠药中毒呈现

- A: 恶心、呕吐、口内有金属味
- B: 抽搐、进行性加重
- C: 出血、凝血时间延长
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

**答案：B**

9. 少数患者在口服时可出现前庭神经紊乱（如头晕、眩晕）的痤疮治疗药是

- A: 口服短效避孕药
- B: 过氧化苯甲酰
- C: 维 A 酸
- D: 米诺环素

**答案：D**

10. 一日一次用药的外文规范缩写是

- A: q. d
- B: q. o. d
- C: q. n

D: q. h

**答案：A**

11. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 静脉补液

B: 吸氧

C: 催吐、洗胃

D: 导泻与洗肠

**答案：C**

12. 敌百虫中毒应

A: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

B: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

C: 静脉滴注烟酰胺

D: 禁止使用肟类复能剂

**答案：B**

13. 有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

A: 铝碳酸镁

B: 美金刚

C: 多奈哌齐

D: 匹伐他汀

**答案：B**

14. 下列复方制剂中，不具有联合增效意义的是

- A: 头孢哌酮一舒巴坦
- B: 左旋多巴一苄丝肼
- C: 磺胺甲噁唑一甲氧苄啶
- D: 口服左氧氟沙星和硫酸亚铁

**答案：D**

15. 铁剂联用维生素 C，可增加疗效的机制是（）

- A: 促进机体的吸收利用
- B: 协同作用
- C: 作用于不同的靶点
- D: 延缓或降低抗药性

**答案：A**

16. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/mr，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 吗啡控释片
- B: 加巴喷丁胶囊
- C: 双氯芬酸钠缓释片
- D: 颠茄片

**答案：C**

17. 我国高警示药品推荐目录(2015 版)中，新遴选列入的药品种类是

- A: 茶碱类药物(静脉途径)
- B: 透皮贴剂
- C: 中药注射剂
- D: 肠内营养制剂

**答案：A**

18. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 阿托品
- B: 去甲肾上腺素
- C: 有机硫类
- D: 苯妥英钠

**答案：A**

19. 在一定范围内,其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是 ( )

- A: LDL-C
- B: HbA1c
- C: HDL-C
- D: TG

**答案：C**

20. 关于腹泻下列说法正确的是

- A: 排便一日超过 4 次
- B: 慢性腹泻病程大于 1 个月
- C: 急性腹泻病程小于 2 周
- D: 迁延性腹泻病程为 2 周至 1 个月

**答案：C**

21. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 ( $39.1^{\circ}\text{C}$ )，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查， $T38.8^{\circ}\text{C}$ ，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查： $\text{WBC}18.5\times10^9/\text{L}$  (参考值  $4.0\times10^9\sim10.0\times10^9$ )，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白
- B: 药用炭
- C: 洛哌丁胺
- D: 小檗碱

**答案：C**

22. 布噻嗪属于

- A: 抗组胺药
- B: 利尿剂
- C: 镇痛药
- D: 血管扩张药

**答案：B**

23. 茶碱属于

- A: CYP3A4 抑制剂
- B: CYP2C19 底物药物
- C: CYP1A2 底物药物
- D: CYP3A4 诱导剂

**答案：C**

24. 下列哪种属于配伍相容中化学稳定性的变化

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 浓度的变化
- B: 沉淀的变化
- C: 渗透压的变化
- D: 颜色的变化

**答案：A**

25. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药的 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；ADR 因果关系可评价为

- A: 可能
- B: 可能无关
- C: 很可能
- D: 待评价

**答案：B**

26. 怕热的药品

- A: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处
- B: 可贮存于严密的药箱内
- C: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧
- D: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

**答案：A**

27. 妊娠期妇女治疗眼疾不宜应用的药品是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 醋酸可的松滴眼剂
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 利福平滴眼剂

**答案：A**

28. 有糖尿病的高血压患者服用降压药，建议控制在

- A: <120 / 80mmHg
- B: <140 / 90mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <140 / 80mmHg

**答案：C**

29. 防心绞痛药物

A: 胃黏膜保护剂

B: 硝酸甘油

C: 甘草合剂

D: 去氨加压素

**答案：B**

30. 一患者的肝功能检查结果是 ALT 与 AST 超过正常值，且 AST/ALT 之比值大于 1。此结果提示病人可能患

A: 糖尿病

B: 急性胰腺炎

C: 缺铁性贫血

D: 肝硬化

**答案：D**

31. 妊娠早期初始，受精后半个月以内，患者用药不当的影响是

A: 几乎见不到药物的致畸作用

B: 中枢神经系统发育迟缓

C: 女性生殖系统发育迟缓

D: 可导致颅面部畸形、腭裂等

**答案：A**

32. 服用左旋多巴时应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开

A: 2~3 小时

B: 1.5~2 小时

C: 1~1.5 小时

D: 0.5~1 小时

**答案：A**

33. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 敏感化作用

B: 减少不良反应

C: 协同作用

D: 竞争性拮抗作用

**答案：D**

34. 维生素 D3 用于

A: 习惯性流产的辅助治疗

B: 防治夜盲症

C: 防治佝偻病

D: 防治坏血病

**答案：C**

35. 患者，男，58 岁，高血压病史 5 年；吸烟史 40 年，日均 40 支。2 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅 CT 检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

A: 氯吡格雷片 75mgqdp0

B: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp0

C: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp0

D: 华法林片 3mgqdp0

**答案：C**

36. 为减少共济失调，幻觉及"宿醉现象"，老年人失眠患者宜选用：

- A: 佐匹克隆
- B: 劳拉西泮
- C: 苯巴比妥
- D: 水合氯醛

**答案：A**

37. 在脑卒中各亚型中发病率最高的疾病为（）

- A: 缺血性脑卒中
- B: 脑出血
- C: 原发性蛛网膜下腔出血
- D: 脑梗死

**答案：A**

38. 可卡因属于兴奋剂中的

- A: 精神刺激剂
- B: 利尿剂
- C: 麻醉药品
- D:  $\beta$  受体阻断剂

**答案：A**

39. 在流行期间多见于小儿及老年体弱者

- A: 肺炎型
- B: 神经型
- C: 病毒型
- D: 胃肠型

**答案：A**

40. 痛风患者发作间歇期应使用苯溴马隆或者丙磺舒，以阻止肾小管对尿酸盐的重吸收。

- A: 抑制前列腺素合成
- B: 抑制粒细胞浸润
- C: 促进尿酸排泄
- D: 抑制尿酸生成

**答案：C**

41. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

- A: 氯吡格雷
- B: 氨氯地平
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

**答案：B**

42. （2018 年真题）患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 格列美脲片 2mgtidpo
- B: 罗格列酮片 2mgbidpo
- C: 二甲双胍片 0.5gtidpo
- D: 甲钴胺片 0.5mgtidpo

**答案：A**

43. 以下药物中，可用于蛇咬伤中毒解救的是

- A: 门冬酰胺酶?
- B: 凝血酶?
- C: 胰蛋白酶?
- D: 胃蛋白酶?

**答案: C**

44. (2016 年真题) 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是 ( )。

- A: 阿司匹林
- B: 氯吡格雷
- C: 利伐沙班
- D: 肝素

**答案: A**

45. 患者，女，65 岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是 ( )

- A: 苯海拉明
- B: 甲氧氯普胺
- C: 地塞米松
- D: 昂丹司琼

**答案: B**

46. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥

- A: 超适应症给药
- B: 盲目联合用药
- C: 撒网式给药

D: 有禁忌症用药

**答案：A**

47. 主要用于丙烯腈、氟化物、一氧化碳等中毒的解毒剂是

A: 谷胱甘肽

B: 亚硝酸钠

C: 盐酸烯丙吗啡

D: 双解磷

**答案：A**

48. 一般情况下，以洗胃方式解救毒物中毒为首要措施，洗胃液每次的用量为

A: 最多不超过 400ml

B: 最多不超过 500ml

C: 最多不超过 300ml

D: 最多不超过 200ml

**答案：B**

49. 青霉素钠注射液作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 100U/ml

B: 750U/ml

C: 500U/ml

D: 250U/ml

**答案：C**

50. 患者，男，23 岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

A: 地塞米松软膏

- B: 10%樟脑软膏
- C: 复方甲硝唑栓
- D: 复方片仔癀软膏

**答案：D**

51. 肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

- A: 异丙嗪
- B: 阿莫西林
- C: 辛伐他汀
- D: 苯巴比妥

**答案：C**

52. 及时发现重大药害事件，即可防止药害事件的蔓延和扩大；说明ADR 监测的意义是

- A: 为“药品召回”提供依据
- B: 促进新药的研制开发
- C: 促进临床合理用药
- D: 减少 ADR 的危害

**答案：D**

53. 急性结膜炎患者禁用的药品是

- A: 硫酸锌滴眼剂
- B: 醋酸可的松滴眼剂
- C: 利福平滴眼剂
- D: 酞丁安滴眼剂

**答案：A**

54. 危重支气管哮喘疾病的临床表现为

A: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

B: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

C: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

D: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 $>30$  次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 $>120$  次 / 分，奇脉， $PaO_2$

**答案：C**

55. 属于容积性泻药的是

A: 硫酸镁

B: 开塞露

C: 番泻叶

D: 乳果糖

**答案：A**

56. (2015 年真题) 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是 ( )。

A: 乙型肝炎病毒

B: 乙型肝炎病毒表面抗原

C: 乙型肝炎病毒 e 抗原

D: 乙型肝炎病毒表面抗体

**答案：D**

57. 以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

- A: 硫酸锌滴眼剂
- B: 2%硝酸银
- C: 红霉素眼膏
- D: 酞丁安滴眼剂

**答案：B**

58. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药
- B: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药
- C: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药
- D: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

**答案：C**

59. 属于渗透性泻药，成人起始剂量每日 30ml，早餐时一次性服用，糖尿病患者应慎用的是

- A: 比沙可啶
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 欧车前

**答案：B**

60. 较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药物是

- A: 布洛芬
- B: 比沙可啶
- C: 酮康环孢素唑
- D: 环孢素

**答案：C**

61. 下列药物中，药师需要提示患者随身携带的是

- A: 胰酶肠溶胶囊
- B: 高锰酸钾片
- C: 硝酸甘油片
- D: 甲硝唑片

**答案：C**

62. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- C: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5h
- D: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

**答案：B**

63. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快容易导致红人综合征的药物是

- A: 万古霉素

- B: 链霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 磷霉素

**答案：A**

64. 可用于治疗沙眼的处方药是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 磺胺醋酰钠
- C: 红霉素眼膏
- D: 硫酸锌

**答案：B**

65. 一新生儿确诊感染乙型肝炎，提示其生母妊娠期间血清学检查结果

- A: HBeAg 为阳性
- B: HBsAb, HBeAg 均为阳性
- C: HBsAg, HBeAg 均为阳性
- D: HBsAg 为阳性

**答案：C**

66. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是（）

- A: 环境污染
- B: 饮食
- C: 长期吸入汞蒸气
- D: 被投毒

**答案：C**

67. 应用氟马西尼可解救的是

- A: 三唑仑中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 铅、汞中毒
- D: 有机磷中毒

**答案：A**

68. 氯化钾注射液的正确给药方法是

- A: 直接静脉注射
- B: 鞘内注射给药
- C: 稀释后静脉滴注
- D: 直接肌肉注射

**答案：C**

69. 按照药品不良反应程度分级标准评判, 症状明显, 重要器官或系统功能有中度损害, 应评判为

- A: 重度
- B: 轻度
- C: 弱轻度
- D: 中度

**答案：D**

70. 患者, 男, 50 岁, 诊断为高血压、冠心病。医师处方: 氨氯地平片 10mgpoqd; 美托洛尔缓释片 47. 5mgpoqd; 贝那普利片 20mgpoqd; 阿司匹林肠溶片 100mgpoqd; 辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 阿司匹林肠溶片必须于晚上在餐后服用
- B: 若需减量, 美托洛尔缓释片可掰开服用
- C: 氨氯地平片可于早上服用
- D: 阿司匹林肠溶片应整片服用, 不能嚼碎

**答案：B**

71. 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈现阳性反应的指标是

- A: 乙型肝炎病毒表面抗原?
- B: 乙型肝炎病毒 e 抗体?
- C: 乙型肝炎病毒表面抗体?
- D: 乙型肝炎病毒 e 抗原?

**答案：C**

72. 可刺激胃肠黏膜，引起水肿或充血

- A: 酒
- B: 脂肪
- C: 食盐
- D: 食醋

**答案：A**

73. 甲状腺功能亢进患者服用丙硫胺嘧啶，可引起的典型药源性疾病是  
( )

- A: 慢性肾衰竭
- B: 溶血性贫血
- C: 消化性溃疡
- D: 粒细胞减少症

**答案：D**

74. 在治疗蛔虫病的药物中，"排虫缓慢而可能发生蛔虫游走与穿孔"的是

- A: 枸橼酸哌嗪
- B: 阿苯达唑

C: 噻嘧啶

D: 噻苯达唑

**答案: B**

75. 消化不良性腹泻宜选用的药物是

A: 双歧三联活菌制剂

B: 双八面体蒙脱石散

C: 胰酶

D: 山莨菪碱

**答案: C**

76. 长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

A: 匹伐他汀

B: 美金刚

C: 多奈哌齐

D: 铝碳酸镁

**答案: C**

77. 严重不良反应为胃肠道穿孔和瘘形成，发生胃肠道穿孔的患者永久停用的靶向药是

A: 帕博利珠单抗

B: 曲妥珠单抗

C: 利妥昔单抗

D: 贝伐珠单抗

**答案: D**

78. 设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

- A: 《美国药典药物信息》
- B: 《药物事实与比较》
- C: 《中国国家处方集》
- D: 《马丁代尔药物大典》

**答案：A**

79. 亚胺培南

- A: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- B: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫
- C: 与呋塞米合用可加重肾功能损害
- D: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

**答案：B**

80. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 使用西地那非 24 小时内不可应用单硝酸异山梨酯片，避免引起严重低血压
- B: 单硝酸异山梨酯缓释片与普通片均不适于心绞痛急性发作的治疗
- C: 单硝酸异山梨酯片每天早晚各服 1 片（20mg），应间隔 12 小时
- D: 规律使用硝酸酯类药物有助于预防心绞痛发作

**答案：C**

81. 慢性功能性便秘

- A: 羧甲基纤维素钠
- B: 比沙可啶
- C: 乳果糖
- D: 开塞露

**答案：C**

82. 服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

- A: 粉剂
- B: 糖浆剂
- C: 胶囊剂
- D: 包衣片

**答案：B**

83. 解救汞中毒的是（）

- A: 二巯丙醇
- B: 单价抗毒血清
- C: 盐酸戊乙奎醚
- D: 依地酸钙钠

**答案：A**

84. 抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

- A: 烟碱
- B: 醛类成分
- C: 咖啡因
- D: 焦油

**答案：A**

85. 是否基于试验结果是评价

- A: 摘要
- B: 讨论
- C: 结果

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 前言

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/005110134131012033>