专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024广西壮族自治区东兴市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库大全及下载答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.解救砷化合物中毒的是（）

A：二巯丁二钠

B：纳洛酮

C：亚硝酸钠

D：双复磷

答案：A

2.（2017年真题）患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L（正常值:3.9～6.1mmol/L），餐后血糖148mmo/L（正常值:<7.8mmol/L），血尿酸580μmol/L（正常值:男性180～440μmol/L），LDL-c3.7mmo/L（正常值:2.1~3.1mmo/L）肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A：控制体重

B：低嘌呤饮食

C：适量运动

D：应用阿司匹林

答案：D

3.交代患者药品未开启包装时应置于2℃~8℃保存，开始使用后不要存放于冰箱中，可在室温下（不超过25℃）存放4周的是

A: 枸橼酸铋钾

B: 胰岛素注射剂

C: 氟西汀

D: 米索前列醇

答案：B

4.（2015年真题）服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是（）。

A: 阿奇霉素

B: 磺胺甲噁唑

C: 红霉素

D: 头孢呋辛

答案：B

5.肌酸激酶超过正常值可

A: 诊断黄疸

B: 诊断痛风

C: 诊断贫血

D: 诊断心肌梗死

答案：D

6.普通胰岛素的作用峰时为()。

A: 0.25～0.5小时

B: 1.5～4小时

C: 6～12小时

D: 0.6～1.5小时

答案：B

7.一般较轻，结膜可充血和水肿，瘙痒而伴有流泪，一般无分泌物或稍有黏液性分泌物的是

A：流行性结膜炎

B：急性卡他性结膜炎

C：过敏性结膜炎

D：流行性出血性结膜炎

答案：C

8.毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A：20～30分钟

B：15～30分钟

C：10～20分钟

D：5～10分钟

答案：B

9.（2015年真题）药师在指导合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法。下列交代的内容，错误的是（）。

A：活菌制剂不能用超过40℃的水送服

B：泡腾片可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用

C：栓剂是外用制剂，不可口服

D：肠溶片要整片吞服，不宜嚼碎服用

答案：B

10.治疗缺铁性贫血给予元素铁

A：日服180mg

B：日服30～40mg

C：日服80mg

D：日服0.05mg

答案：A

11.用药时须与食物同服的增强认知功能药物为（）

A：苯海索

B：加兰他敏

C：多奈哌齐

D：卡巴拉汀

答案：D

12.部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

A：为肿瘤患者开具氟胞嘧啶

B：为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素

C：为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁

D：为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷

答案：C

13.医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。O

A：左眼

B：右眼

C：是()

D：适量

答案：C

14.高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

A: 胃肠型

B: 肺炎型

C: 神经型

D: 病毒型

答案：C

15.患者男25岁有癫痫病史2年一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦,癫痫控制良好近期因社区获得性肺炎入院。下列药物中,最可能影响患者基础疾病控制的是（）

A: 阿奇霉素

B: 头孢曲松

C: 莫西沙星

D: 阿莫西林

答案：C

16.处方是医院药品消耗及药品经济收入结帐的凭证和原始依据

A: 有效性

B: 技术性

C: 法律性

D: 经济性

答案：D

17.痛经症状严重者可选用的处方药为

A: 布洛芬

B: 贝诺酯

C: 可待因

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

18.患者，女,65岁,52岁绝经，自诉腰痛半年,加重2月，腰椎影像学检查提示腰2和腰3椎体压缩性骨折，骨密度检查提示重度骨质疏松，既往有高血压、高脂血症和系统性红斑狼疮,长期口服缬沙坦80mgaqd,阿托伐他汀20mgqn，阿司匹林10mgqd和泼尼松7．5mgqd。1个月前因反流性食管炎加用奥美拉唑20mgqd。否认不良嗜好，否认食物药物过敏史。

A: 泼尼松

B: 阿托伐他汀

C: 缬沙坦

D: 阿司匹林

答案：A

19.以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

A: 查药品，对药名、剂型、规格、数量

B: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量

C: 查临床诊断，对用药合理性

D: 查处方，对临床诊断

答案：A

20.能客观地反映过去3个月内平均血糖水平的指标是（）

A: HDL-C

B: LDL-C

C: HbA1c

D: TG

答案：C

21.采用华法林进行抗凝治疗时，国际标准化比值（INR）的有效安全范围是

A：0.8～1.5

B：3.0～4.0

C：1.5～2.0

D：2.0～3.0

答案：D

22.酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

A：呋喃唑酮

B：庆大霉素

C：依替米星

D：克林霉素

答案：A

23.保护药品免受破坏的联合用药是

A：头孢哌酮/舒巴坦复方制剂

B：硫酸阿托品联用吗啡

C：磷霉素联用其他抗菌药物

D：普萘洛尔联用硝苯地平降血压

答案：A

24.轻度药品不良反应是指

A：没有临床症状，无须治疗
B：指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
C：指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
D：指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗
答案：D

25.可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是
A：特拉唑嗪
B：头孢哌酮
C：卡马西平
D：左氧氟沙星
答案：A

26.提示：用药期间不饮酒（或含酒精的饮料），是针对
A：氟西汀
B：卡托普利
C：铋制剂
D：氯苯那敏
答案：A

27.属于抗酸药的是
A：三硅酸镁
B：哌仑西平
C：替普瑞酮
D：奥美拉唑
答案：A

28.可使阿莫西林免受 β-内酰胺酶破坏的药品是()。

A: 右旋糖酐

B: 西司他丁

C: 三唑巴坦

D: 克拉维酸钾

答案：D

29.患者，男，60岁。因面部出现慢性湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是

A: 利巴韦林软膏

B: 特比萘芬乳膏

C: 10%樟脑软膏

D: 他克莫司软膏

答案：D

30.药物血浆蛋白结合率下降，是指

A: 药物分布

B: 药物吸收

C: 药物排泄

D: 药物代谢

答案：A

31.下列医药卫生技术人员中，不具备处方审核资质的是

A: 主管药师

B: 药士

C: 执业药师

D: 药师

答案：B

32.饮酒可使其吸收明显减少的药物是
A：苯妥英钠
B：卡马西平
C：利血平
D：维生素B
答案：D

33.抑制细胞色素氧化酶损害中枢神经系统的是
A：磷化锌
B：氯化钠
C：氯化锌
D：磷化氢
答案：D

34.儿童2型糖尿病患者宜选用的药物是
A：格列喹酮
B：罗格列酮
C：阿卡波糖
D：二甲双胍
答案：D

35.以下关于抑郁症的介绍错误的是
A：抑郁症的好发年龄在20～50岁
B：该病具有高发病、高复发、高致残的特点
C：抑郁症的病因明确
D：及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率
答案：C

36.患者，女，26岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶450mg／d治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

A：血红蛋白

B：红细胞

C：白细胞

D：嗜酸粒细胞

答案：C

37.静脉药物配置的环境条件要求是

A：千级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上

B：万级洁净、密闭环境下，局部百级净化的操作台上

C：万级洁净、密闭环境下，局部千级净化的操作台上

D：万级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上

答案：B

38.患者因阴道瘙痒和阴道分泌物增多3天，自行到药店咨询和购买治疗药物。药师询问患者病史，了解患者阴道分泌物多且呈豆腐渣样，既往未出现过类似分泌物，无其他不适。经验治疗方案首选

A：2%克林霉素软膏5g，阴道用药，每晚1次，连用7日

B：克霉唑制剂，1粒（500mg），单次用药

C：甲硝唑400mg，每日2次，连服7日

D：甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚1次.连用7日

答案：B

39.稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

A：阿司匹林

B：低分子肝素

C: 氯贝丁酯

D: 硝酸甘油

答案：A

40.肾功能不全而肝功能正常者宜选用的药物是

A: 经肝肠循环消除的药物

B: 肾毒性小、经肝排泄的药物

C: 经肝肾双途径消除的药物

D: 肝毒性小、经肾排泄的药物

答案：C

41.糖尿病合并肾病患者首选的口服降血糖药为

A: 格列喹酮

B: 格列齐特

C: 格列吡嗪

D: 格列美脲

答案：A

42.患者男50岁临床诊断为焦虑症，给予氟西汀20mgqd治疗。对该患者用药教育的说法错误的是()

A: 服用氟西汀期间不能饮酒

B: 氟西汀应于睡前服用

C: 不得随意自行调整氟西汀剂量

D: 不能突然停止服用氟西汀

答案：B

43.6岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

A: 氯雷他定

B：依巴斯汀

C：庆大霉素

D：四环素

答案：B

44.（2021年真题）患者，女，65岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

A：昂丹司琼

B：地塞米松

C：甲氧氯普胺

D：苯海拉明

答案：C

45.(肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

A：1/10～1/5

B：1/5～1/2

C：3/5～3/4

D：1/7～1/5

答案：B

46.下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

A：餐前服用格列本脲

B：清晨服用帕罗西汀

C：餐前服用阿莫西林

D：清晨服用硫酸镁

答案：B

47.诊断为输尿管结石，给予黄体酮，应评判为
A：无正当理由超适应证用药
B：过度治疗用药
C：联合用药不适宜
D：有禁忌证用药
答案：A

48.可引起血清尿素氮降低的是
A：中毒性肝炎
B：慢性肾炎
C：急性胰腺炎
D：胃溃疡
答案：A

49.（2018年真题）患儿，男，50天，体重5kg,时值夏季，体温37.9℃，出现烦躁，哭闹不安，无其他症状。其家人到药店询购买退热药，药师应推荐（）
A：减少衣被，可物理降温或必要时就诊
B：对乙酰基酚片（500mg）1/10片，溶于少量温开水服用
C：阿苯片，半片，研碎后溶于少量温开水服务
D：阿司匹林泡腾片（500mg）1/10片，溶于少量温开水服用
答案：A

50.某患者的肝功能检查结果是：ALT与AST均超过正常值，且AST/ALT比值大于1。此结果提示病人可能患有
A：缺铁性贫血
B：肝硬化
C：急性胰腺炎

D: 糖尿病

答案：B

51.对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

A: 早晚联合服用他汀类和贝特类

B: 早晨用贝特类，晚上用他汀类

C: 晚上联合服用他汀类和贝特类

D: 早晨用他汀类，晚上用贝特类

答案：B

52.血液净化疗法可使重症毒物中毒者的预后大为改观，血液净化的方法不包括

A: 血液滤过

B: 血液透析

C: 血液置换

D: 腹膜透析

答案：C

53.可引起尿肌酐减少的是

A: 病毒性肝炎

B: 再生障碍性贫血

C: 肾小球肾炎

D: 肺结核

答案：C

54.患者，男，身高180cm，体重90kg，腰围100cm，其体重指数(BMI)是()

A: 18

B: 27.8

C: 30.2

D: 20

答案：B

55.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 注射胰岛素制剂时,应变换注射部位,两次注射点要间隔2cm

B: 开启的胰岛素需要冷藏保存

C: 未使用的胰岛素可以冷冻保存

D: 在注射胰岛素制剂时,针头可重复使用

答案：A

56.匹维溴铵的作用机制为()

A: M受体阻断剂

B: M受体激动剂

C: 钙拮抗剂

D: β 受体阻断剂

答案：C

57.患者男性，45岁，反复发作夜间呼吸困难1个月，加重1天就诊。体格检查：血压180／110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率130次／分。

A: 肺炎还是肺间质纤维化

B: 慢性支气管炎还是急性支气管炎

C: 支气管哮喘还是心源性哮喘

D: 肺心病还是冠心病

答案：C

58.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37．8℃，心率130次／分，血压80／40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: ACEI、AR

B: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

C: β 受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI

D: 硝普钠、利尿药、ACEI

答案：C

59.作用于有丝分裂M期，干扰微管合成的药物为

A: 卡培他滨

B: 紫杉醇

C: 替尼泊苷

D: 丝裂霉素

答案：B

60.下列组合中，属于联合化疗的是（）

A: VEGF抑制剂+ALK抑制剂（贝伐珠单抗+奥希替尼）

B: CHOP方案（环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松）

C: CTX+美司钠（环磷酰胺+美司钠）

D: MTX方案（甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注）

答案：B

61.对蛔虫，蛲虫，鞭虫，钩虫，鞭虫，绦虫感染都有效的药物是

A：吡喹酮

B：哌嗪

C：噻嘧啶

D：甲苯咪唑

答案：D

62.可升高红细胞，用于肾性及非肾性贫血的是

A：硫酸亚铁

B：维生素 B12

C：非格司亭

D：重组人促红素

答案：D

63.患者，男，33 岁。中度哮喘急性发作，宜选用的药物是

A：β2 受体阻断剂

B：糖皮质激素

C：短效 β2 受体激动剂

D：白三烯受体阻断剂

答案：C

64.对购药患者讲授安全用药常识是

A：被动方式

B：指令方式

C：质问方式

D：主动方式

答案：D

65.三环类抗抑郁药的致死量通常高于

A：1g

B：2g

C：1.5g

D：2.5g

答案：B

66.（2019年真题）患者，女，25岁，两天前淋雨后开始发热体温39.0℃，咳嗽，咳铁锈色黏痰，化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高，诊断为肺炎，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物

A：头孢唑林

B：阿米卡星

C：头孢他啶

D：阿奇霉素

答案：A

67.患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol／L，餐后血糖11.2mmol／L，糖化血红蛋白8.7％。

A：增加现用口服降糖药的剂量

B：启用胰岛素治疗

C：换用其他作用机制的口服降糖药

D：增加一种口服降糖药

答案：B

68.药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A：红霉素

B: 伊曲康唑

C: 利福平

D: 异烟肼

答案：C

69.患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是（）。

A: 很可能

B: 可能

C: 可能无关

D: 肯定

答案：D

70.急性荨麻疹的治疗首选药物是

A: 肾上腺糖皮质激素

B: 1：1000肾上腺素注射液

C: 第一代抗组胺药

D: 第二代非镇静抗组胺药

答案：D

71.（2015年真题）下列药物属于肝药酶诱导剂的是（）。

A: 环丙沙星

B: 氟康唑

C: 胺碘酮

D: 卡马西平

答案：D

72.患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选（）
A：针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物
B：针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物
C：针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
D：针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物
答案：A

73.紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于
A：湿度
B：空气
C：温度
D：日光
答案：D

74.（2019年真题）处方中外文缩写p
A：代表
B：微克
C：必要时
D：临睡时
答案：D

75.由于刺激食管和影响水、电解质代谢平衡，服用后需要大量饮水的是
A：苯溴马隆
B：依替膦酸二钠
C：莫西沙星
D：氨茶碱
答案：B

76.下列药物中，能解救含亚硝酸盐的食物中毒的是

A：维生素K1

B：亚甲蓝

C：维生素B6

D：普萘洛尔

答案：B

77.沟通的时间不宜过长，提供的信息不宜过多

A：认真聆听

B：关注特殊人群

C：注意掌握时间

D：注意语言的表达

答案：C

78.氰化氢中毒呈现

A：出血、凝血时间延长

B：呼出气体中可有苦杏仁气味

C：恶心、呕吐、口内有金属味

D：抽搐、进行性加重

答案：B

79.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

A：1%氯化钠

B：1%硫酸铜

C：1%硫酸镁

D：3%过氧化氢

答案：C

80.药物的成本与产生的收益之间进行对比，评价治疗方案的经济性，以货币为单位。该药物经济学评价方法是

A：成本-效益分析

B：成本-效果分析

C：最小成本分析

D：成本-效用分析

答案：A

81.（2018年真题）患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下：

A：阿司匹林泡腾片给药剂量不合理

B：氨溴索片给药剂量不合理

C：维生素C片用法用量不合理

D：左氧氟沙星片给药间隔不合理

答案：D

82.高血压患者的降压目标部分有糖尿病、蛋白尿等高危患者的高血压（）

A：<120/80mmHg

B：<140/90mmHg

C：<150/90mmHg

D：<130/80mmHg

答案：D

83.易吸湿的药品

A：用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

B：根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

C：可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

D：可贮存于严密的药箱内

答案：C

84.痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

A：秋水仙碱

B：苯溴马隆

C：泼尼松龙

D：别嘌醇

答案：B

85.年人应用下列药物可引起何种不良反应,抗心力衰竭药物如地高辛等可引起

A：嗜睡及头晕

B：脱水、低钾血症

C：室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症

D：青光眼，甚至致盲

答案：C

86.拓扑异构酶抑制剂

A：顺铂

B：放线菌

C：依托泊苷

D：培美曲塞

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/006015000055011030