

2023-24 年广东省斗门区《执业药师之西药学专业二》考试 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是（）

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

2. 替比夫定的作用靶点是

- A: HIV-1 反转录酶
- B: 神经氨酸酶
- C: 脱氧核糖核酸聚合酶
- D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案：C

3. 对 G

- A: 第三代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：A

4. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

- A: 甲泼尼龙
- B: 环孢素
- C: 环磷酰胺
- D: 硫唑嘌呤

答案：B

5. 吗啉类抗真菌药()

- A: 两性霉素
- B: 氟康唑
- C: 特比萘芬
- D: 阿莫罗芬

答案：D

6. 全身性红斑狼疮宜用

- A: 氢化可的松
- B: 泼尼松
- C: 地塞米松
- D: 倍他米松

答案：B

7. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

- A: 肾绞痛
- B: 骨关节炎
- C: 胃溃疡
- D: 痛风

答案：B

8. (2021 年真题) 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的药物是 ()

- A: 那格列奈
- B: 西格列汀
- C: 利拉鲁肽
- D: 格列美脲

答案: B

9. 有关阿托品的药理作用不正确的是

- A: 抑制腺体分泌
- B: 松弛内脏平滑肌
- C: 扩张血管, 改善微循环
- D: 大剂量可使心率减慢

答案: D

10. 抑制磷酸二酯酶, 增加细胞内的 cAMP 含量, 缓解慢性心力衰竭症状 ()

- A: 硝普钠
- B: 地高辛
- C: 多巴酚丁胺
- D: 氨力农

答案: D

11. 肝素过量所致出血的解救药物是 ()

- A: 维生素 K
- B: 蛇毒血凝酶
- C: 酚磺乙胺
- D: 鱼精蛋白

答案：D

12. 支原体、衣原体引起的肺炎宜选用()

- A: 阿奇霉素
- B: 克林霉素
- C: 氟康唑
- D: 万古霉素

答案：A

13. 下述药物中用于缓解鼻黏膜充血肿胀引起的鼻塞的是

- A: 盐酸麻黄碱滴鼻液
- B: 利巴韦林滴鼻液
- C: 链霉素溶剂
- D: 硼酸

答案：A

14. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

- A: 胺碘酮
- B: 利多卡因
- C: 奎尼丁
- D: 普萘洛尔

答案：B

15. 其缓释片剂应与食物同服的是

- A: 氨曲南
- B: 阿奇霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

答案：C

16. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

- A: 四环素
- B: 曲伏前列素
- C: 1%碘甘油
- D: 9%硼酸冰片滴耳液

答案：B

17. 硫脲类最重要的不良反应是

- A: 粒细胞下降
- B: 甲状腺素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 血管神经性水肿

答案：A

18. 具有较强抗铜绿假单胞菌作用的头孢菌素是()

- A: 头孢他啶
- B: 头孢克洛
- C: 头孢孟多
- D: 头孢唑林

答案：A

19. (2017 年真题) 可用于治疗重度痤疮, 但妊娠期妇女避免使用的药物是 ()

- A: 异维 A 酸
- B: 克拉霉素
- C: 特比萘芬

D: 克罗米通

答案：A

20. 患者，女性，40 岁，甲状腺肿大，伴有心悸、多汗、烦躁、消瘦等症状。诊断：甲状腺功能亢进症。

A: 丙硫氧嘧啶

B: 大剂量碘剂

C: 格列齐特

D: 放射性碘

答案：A

21. 糖皮质激素的抗炎作用是

A: 提高机体对细菌内毒素的耐受力

B: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

C: 提高中枢神经系统的兴奋性

D: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案：B

22. 属于短效 β_2 受体激动剂的是

A: 特布他林

B: 异丙托溴铵

C: 噻托溴铵

D: 福莫特罗

答案：A

23. 治疗 MRSA 的首选药物是

A: 万古霉素

B: 四环素

C: 青霉素

D: 林可霉素

答案: A

24. (2018 年真题) 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是 ()

A: 头孢呋辛

B: 头孢他啶

C: 头孢唑林

D: 头孢米诺

答案: B

25. 流行性脑脊髓膜炎首选药是

A: 磺胺嘧啶

B: 磺胺甲

C: 磺胺米隆

D: 柳氮磺吡啶

答案: A

26. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: S 期

B: G1 期

C: G0 期

D: M 期

答案: A

27. 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

A: 骨髓抑制

B: 血压升高

C: 心肌损伤

D: 痤疮样皮疹

答案: D

28. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

A: 红霉素眼膏

B: 氯霉素眼膏

C: 阿托品滴眼剂

D: 左氧氟沙星滴眼剂

答案: D

29. 镇静作用明显的 H

A: 组胺

B: 西咪替丁

C: 阿司咪唑

D: 苯海拉明

答案: D

30. 为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

A: LDL

B: IDL

C: HDL

D: VLDL

答案: C

31. 氯霉素与剂量和疗程无关的严重不良反应是()

- A: 可逆的性骨髓抑制
- B: 二重感染
- C: 严重的再生障碍性贫血
- D: 灰婴综合征

答案：C

32. 重度阻滞 Na^+ 通道的药物是

- A: 普罗帕酮
- B: 利多卡因
- C: 普鲁卡因胺
- D: 普萘洛尔

答案：A

33. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和其联合有协同作用的是()

- A: 人促红素
- B: 噻嗪类利尿药
- C: β 受体阻断药
- D: 留钾利尿药

答案：C

34. 可与抗菌药物联合应用的是

- A: 嗜热链球菌
- B: 嗜酸乳杆菌
- C: 保加利亚乳杆菌
- D: 地衣芽孢杆菌

答案：D

35. 治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 磺胺米隆

答案：C

36. 碳酸钙的适应证不包括()

- A: 佝偻病
- B: 骨发育不全
- C: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛
- D: 骨质疏松

答案：C

37. 患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列哪项不属于多柔比星的禁忌证

- A: 严重心脏病
- B: 腰椎间盘突出
- C: 骨髓功能抑制
- D: 妊娠及哺乳期妇女

答案：B

38. 患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 硫酸亚铁
- B: 蔗糖铁
- C: 叶酸

D: 琥珀酸亚铁

答案: B

39. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

A: 甲氧氯普胺

B: 甲地孕酮

C: 格雷司琼

D: 阿瑞吡坦

答案: C

40. 抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

A: 多毛、痤疮

B: 肾功能损坏

C: 子宫不规则出血

D: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

答案: C

41. 头孢拉定

A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

C: 肾毒性较大

D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案: C

42. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是
()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

- B: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- C: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

答案：A

43. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿米洛利

答案：B

44. 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防出血过多
- B: 预防粒细胞缺乏
- C: 预防癌症复发
- D: 预防过敏反应

答案：B

45. 青霉素在体内的主要消除方式是

- A: 肾小管分泌排泄
- B: 肝脏代谢
- C: 被血浆酶破坏
- D: 肾小球滤过

答案：A

46. 肾毒性大的是

- A: 阿莫西林
- B: 头孢哌酮
- C: 庆大霉素
- D: 头孢噻肟

答案：C

47. (2018 年真题) 普通感冒患者, 有打喷嚏、流鼻涕的症状, 宜选用的药物是 ()

- A: 右美沙芬片
- B: 茶碱缓释片
- C: 对乙酰氨基酚滴剂
- D: 氯苯那敏片

答案：D

48. 关于替加环素的使用, 错误的是

- A: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整
- B: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢
- C: 替加环素是 P—gp 的底物
- D: 8 岁以下儿童禁用替加环素

答案：B

49. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是

- A: 维生素
- B: 氨甲苯酸
- C: 维生素 K1
- D: 鱼精蛋白

答案：D

50. 与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

- A: 硫酸镁
- B: 阿托品
- C: 美沙酮
- D: 哌替啶

答案：B

51. 与顺铂联合应用可致严重肾毒性的药物是

- A: 利妥昔单抗
- B: 甲氨蝶呤
- C: 氟尿嘧啶
- D: 阿糖胞苷

答案：A

52. 主要用于经他莫昔芬辅助治疗 2~3 年后，绝经后雌激素受体阳性的妇女的早期浸润性乳腺癌的辅助治疗，直至完成总共 5 年的辅助内分泌治疗，以及经他莫昔芬治疗后，其病情仍有进展的自然或人工绝经后妇女的晚期乳腺癌，该药物是

- A: 氟维司群
- B: 依西美坦
- C: 他莫昔芬
- D: 来曲唑

答案：B

53. 肝素的抗凝作用特点是()

- A: 体内、外均有效
- B: 仅在体内有效
- C: 必须有维生素 K 辅助
- D: 作用缓慢

答案：A

54. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗

。

- A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- B: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿尿酸量
- C: 碱化尿液，促进尿酸排泄
- D: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

答案：A

55. 与林可霉素类抗菌药物存在交叉耐药性的是

- A: 四环素类
- B: 头孢菌素类
- C: 大环内酯类
- D: 氨基糖苷类

答案：C

56. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是()

- A: 长春瑞滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 吉西他滨
- D: 巯嘌呤

答案：C

57. 体内、外均有抗凝血作用的药物是

- A: 香豆素类
- B: 维生素 K
- C: 维生素 B12
- D: 肝素

答案：D

58. 突然停药可导致反跳现象的是

- A: 可乐定
- B: 硝酸甘油
- C: 哌唑嗪
- D: 氨氯地平

答案：B

59. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是

- A: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药
- B: 对于不同的手术，选择疗程不同
- C: 用药过量可导致出血并发症
- D: 用药期间需定期测定血红蛋白

答案：A

60. 患者。女,43岁,左乳浸润性导管癌术后放、化疗3年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第2日,患者出现重度恶心、呕吐,根据化疗药物致吐分级,宜选用的对症治疗药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 甲氧氯普胺

C: 昂丹司琼

D: 地塞米松

答案: C

61. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

A: 粉剂

B: 乳膏剂

C: 油剂

D: 洗剂

答案: B

62. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

A: 白三烯受体阻断剂

B: M 胆碱受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 长效 B₂ 受体激动剂

答案: B

63. 卡泊芬净属于()

A: 多烯类抗真菌药

B: 丙烯胺类抗真菌药

C: 唑类抗真菌药

D: 棘白菌素类抗真菌药

答案: D

64. 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入（PCI）治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

A: 双氯芬酸

- B: 奥美拉唑
- C: 华法林
- D: 氯吡格雷

答案：D

65. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

- A: 维生素 D
- B: 铁剂
- C: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- D: 钙剂

答案：C

66. (2019 年真题) 患者，男，8 岁，静脉滴注美洛西林后立即出现胸闷、气短、呼吸困难，喉头水肿，考虑为青霉素类抗生素的过敏反应，按照其发生机制，该患者发生的过敏反应，在分型上属于 ()

- A: II 型变态反应
- B: IV 型变态反应
- C: III 型变态反应
- D: I 型变态反应

答案：D

67. 可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

- A: 他达拉非
- B: 炔诺酮
- C: 米非司酮
- D: 丙酸睾酮

答案：A

68. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()

。

- A: 两性霉素 B
- B: 特比萘芬
- C: 伏立康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

69. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

- A: 来曲唑
- B: 卡莫氟
- C: 甲氨蝶呤
- D: 羟喜树碱

答案：A

70. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 泼尼松
- B: 奥沙利铂
- C: 吉西他滨
- D: 顺铂

答案：D

71. (2017 年真题) 应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内，应监测的电解质是()

- A: 钙
- B: 锂
- C: 钠
- D: 钾

答案：D

72. 属于水杨酸类解热镇痛药的是

- A: 布洛芬
- B: 阿司匹林
- C: 对氨基水杨酸钠
- D: 阿糖腺苷

答案：B

73. 两性霉素 B 与 () 合用具有协同作用。

- A: 氟胞嘧啶
- B: 酮康唑
- C: 利福平
- D: 伊曲康唑

答案：A

74. 布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

- A: 100 倍
- B: 40 倍
- C: 25 倍
- D: 15 倍

答案：C

75. 制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

- A: 两性霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 卡泊芬净
- D: 阿糖胞苷

答案：A

76. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A: Cr

B: CK

C: Hcy

D: BUN

答案：B

77. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

A: 替硝唑+苯巴比妥

B: 甲硝唑+乙醇

C: 奥硝唑+乙醇

D: 替硝唑+华法林

答案：A

78. 抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

A: 阿霉素

B: 放线菌素 D

C: 环磷酰胺

D: 丝裂霉素

答案：C

79. 用于肿瘤放、化疗引起的中性粒细胞缺乏症的药物是()

A: 氨甲环酸

B: 维生素 K

C: 香豆素类

D: 非格司亭

答案: D

80. 适用于各型疟疾，但主要用于抗氯喹恶性疟治疗和凶险型恶性疟的急救的药物是

A: 双氢青蒿素

B: 蒿甲醚

C: 乙胺嘧啶

D: 奎宁

答案: B

81. 主要作用于 S 期的抗肿瘤药物是

A: 长春碱类

B: 抗癌抗生素

C: 抗代谢药

D: 烷化剂

答案: C

82. 临床口服最常用的、唯一经过安慰剂对照临床试验评估的强心苷药物是()

A: 洋地黄毒苷

B: 去乙酰毛花苷

C: 地高辛

D: 毒毛花苷 K

答案: C

83. 属于抗甲状腺药的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 生长抑素
- C: 醋酸去氨加压素
- D: 左甲状腺素

答案：A

84. 属于润滑性泻药的是

- A: 番泻叶
- B: 利那洛肽
- C: 欧车前
- D: 多库酯钠

答案：D

85. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 出血性膀胱炎
- B: 骨髓抑制
- C: 肺纤维化
- D: 药物性肝炎

答案：C

86. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 提高靶组织对胰岛素的敏感性
- C: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- D: 直接补充胰岛素

答案：C

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/006134144105011030>