

2024 年河北省永清县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库大全（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下关于 5 型磷酸二酯酶抑制剂的描述，正确的是

- A: 口服后生物利用度较高
- B: 口服吸收迅速
- C: 代谢产物不具有活性
- D: 主要经过肾脏代谢

答案：B

2. 作用广泛，主要用于急性心衰，不宜作为心衰常规治疗的药物是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 地高辛
- C: 米力农
- D: 多巴胺

答案：D

3. 关于阿司匹林在心血管疾病治疗中的作用描述，错误的是

- A: 调节血脂
- B: 抑制血管损伤后内膜增生
- C: 可抑制血小板聚集
- D: 抑制细胞因子的合成

答案：A

4. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 环氧酶抑制剂
- B: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- C: 整合素受体阻断剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

5. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是()

- A: 维拉帕米
- B: 尼莫地平
- C: 氨氯地平
- D: 硝苯地平

答案：A

6. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β 受体激动剂是

- A: 沙丁胺醇
- B: 丙卡特罗
- C: 沙美特罗
- D: 福莫特罗

答案：D

7. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑首次使用不需给予负荷剂量
- B: 氟康唑对曲霉菌有效
- C: 氟康唑用于治疗侵袭性念珠菌感染
- D: 氟康唑是肝药酶诱导剂

答案：C

8. 以下关于 PPI 用法用量的描述，错误的是

- A: 泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次 40mg～80mg，每日 1～2 次
- B: 泮托拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次
- C: 艾司奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次
- D: 奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

答案：D

9. 患者，男，17 岁。拔牙 2 天后出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈。12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：T39℃，脉搏 89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音。实验室检查：WBC $28 \times 10^9/L$

- A: 咳出的痰直接涂片
- B: 咳出的痰进行细胞培养
- C: 通过环甲膜穿刺吸取痰液，进行痰涂片和需氧、厌氧菌检查
- D: 痰细胞学检查

答案：C

10. 治疗青光眼宜选用

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 复方托吡卡胺滴眼液

D: 左氧氟沙星滴眼液

答案：A

11. 可增加心脏毒性的药物是

A: 阿糖胞苷

B: β 受体阻断剂

C: 甲氨蝶呤

D: 利福平

答案：B

12. 第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

A: 表柔比星

B: 吡柔比星

C: 多柔比星

D: 柔红霉素

答案：D

13. 维生素 K 参与下列哪些凝血因子活化()

A: VII、XI、VII、IX 因子

B: II、VIII、XI、IV 因子

C: II、VII、IX、X 因子

D: II、VII 因子

答案：C

14. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

A: 阿替普酶

B: 氯吡格雷

C: 阿司匹林

D: 双嘧达莫

答案: B

15. 肌肉注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

A: 4 小时

B: 8 小时

C: 7~12 分钟

D: 10~25 分钟

答案: A

16. (2015 年真题) 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿剂的是 ()。

A: 乙酰唑胺

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 呋塞米

答案: B

17. 通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖 ()

A: 阿卡波糖

B: 艾塞那肽

C: 格列本脲

D: 二甲双胍

答案: A

18. 静脉溶栓首选的药物是

A: 重组人促红素

B: 维生素 K

C: 阿替普酶

D: 达比加群酯

答案：C

19. 哌唑嗪常见的不良反应是

A: 钠水潴留

B: 降压效应减弱

C: 口干、便秘、发热

D: 首剂量低血压反应

答案：D

20. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

A: 博来霉素

B: 紫杉醇

C: 氟胞嘧啶

D: 多柔比星

答案：D

21. (2020 年真题) 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 吲哚美辛

C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案：D

22. 伴有 () 的患者在应用 ACEI 首剂治疗时可能出现严重低血压

A: 低钠血症

- B: 干咳
- C: 蛋白尿
- D: 脑水肿

答案：A

23. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

- A: 噻嘧啶
- B: 氯喹
- C: 青蒿素
- D: 哌嗪

答案：D

24. 具有磺胺类药物结构，作用于近曲小管的利尿药是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋达帕胺
- D: 螺内酯

答案：A

25. 患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21次，BP110/70mmHg，HR110次/分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞13.4×10⁹/L，中性粒细胞82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0.59，每6小时一次。

A: 如发生转氨酶升高，应考虑氟康唑的肝毒性

B: 定期复查血常规、肝肾功能

C: 侵袭性真菌感染疗程较长，患者出院后仍需口服氟康唑

D: 出院后如发生过敏症状，可使用抗过敏药特非那定

答案：D

26. 唑类抗真菌药()

A: 两性霉素

B: 特比萘芬

C: 阿莫罗芬

D: 氟康唑

答案：D

27. 下列从作用机制讲不属于抗血小板药物的是

A: 噻氯匹定

B: 双嘧达莫

C: 氨甲环酸

D: 氯吡格雷

答案：C

28. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

A: 肾功能不全者可以使用

B: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

C: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色

D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

答案：A

29. (2016 年真题) 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

A: 洛哌丁胺片

- B: 双歧三联活菌胶囊
- C: 地衣芽孢杆菌胶囊
- D: 双八面体蒙脱石散

答案：A

30. 患者，女，24 岁，妊娠 2 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 阿莫西林
- C: 环丙沙星
- D: 青霉素 G

答案：C

31. 进行透析的急、慢性。肾衰竭患者静脉滴注复方氨基酸注射液（9AA），滴速为

- A: 不超过 15 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分
- C: 滴速 80~100 滴 / 分
- D: 滴速 20~30 滴 / 分

答案：A

32. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

- A: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿
- B: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎
- C: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

D: 可致甲状腺功能亢进,同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案: C

33. 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴生杆菌感染的药物是()

A: 头孢唑林

B: 头孢米诺

C: 头孢他啶

D: 头孢呋辛

答案: B

34. 与柔红霉素合用,可能增加心脏毒性的是

A: 肝素

B: 放线菌素

C: 氧烯洛尔

D: 对乙酰氨基酚

答案: C

35. 属于第二代喹诺酮类药物的是

A: 萘啶酸

B: 吡哌酸

C: 莫西沙星

D: 诺氟沙星

答案: B

36. 可用于慢性支气管炎引起的痰液稠厚、呼吸困难的是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 氨溴索

C: 右美沙芬

D: 羧甲司坦

答案: D

37. 可阻断钠通道，用于治疗室性心律失常的药品是

A: 硝酸甘油

B: 利多卡因

C: 氯沙坦

D: 氨氯地平

答案: B

38. 酒精、镇静剂、镇痛药、阿片类或神经类药物急性中毒患者禁用()

。

A: 曲马多

B: 吗啡

C: 芬太尼

D: 哌替啶

答案: A

39. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优()

A: 华法林

B: 华法林+低分子量肝素

C: 肝素

D: 低分子量肝素

答案: B

40. 柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是

A: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的氟马西尼

- B: 在用柔红霉素的同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素后 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

答案：D

41. 快速静脉滴注可出现低血压、心律失常的是

- A: 蛇毒血凝酶
- B: 甲萘氢醌
- C: 卡巴克络
- D: 氨基己酸

答案：D

42. 维生素 B12 的适应证为

- A: 拮抗华法林过量导致的出血
- B: 恶性贫血和巨幼细胞贫血
- C: 纤溶亢进所致的出血
- D: 拮抗肝素过量导致的出血

答案：B

43. （2018 年真题）不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是（）

- A: 两性霉素 B
- B: 氟康唑
- C: 伏立康唑
- D: 卡泊芬净

答案：B

44. （2019 年真题）同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素（NE）再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

- A: 马普替林
- B: 帕罗西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 度洛西汀

答案：D

45. 不能直接抑制凝血因子 Xa 的药物是

- A: 阿哌沙班
- B: 依度沙班
- C: 华法林
- D: 利伐沙班

答案：C

46. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

47. 利巴韦林最主要的不良反应是

- A: 头痛
- B: 溶血性贫血
- C: 听力异常
- D: 味觉异常

答案：B

48. 林旦不应与碱性物质或铁器接触。口诀：“碱淡淡铁旦旦”。

- A: 阿达帕林
- B: 林旦
- C: 莫匹罗星
- D: 克罗米通

答案：B

49. 用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

- A: 链霉素
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案：C

50. 属于耐酸耐酶的青霉素类药物是()

- A: 青霉素
- B: 丙匹西林
- C: 阿莫西林
- D: 甲氧西林

答案：D

51. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是()

- A: 巯嘌呤
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 纳武利尤单抗

答案：D

52. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 口服补液盐是复方制剂，II、II 代表不同的配方

B: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐

C: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

D: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用

答案：B

53. 用于绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A: 雌二醇

B: 米非司酮

C: 黄体酮

D: 地塞米松

答案：A

54. 环孢素合用可使赛洛多辛血药浓度升高，这是因为环孢素抑制

A: p-糖蛋白

B: UGT287

C: CYP3A4

D: 血浆蛋白

答案：A

55. 服用西地那非可导致()

A: 肾功能异常

B: 心律失常

C: 高血压

D: 视物模糊、复视

答案：D

56. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 胆碱酯酶复活药

B: 阿托品

C: 阿托品+新斯的明

D: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

答案：D

57. 用于低分子肝素过量时解救的药品是

A: 酚磺乙胺

B: 维生素 K1

C: 氨甲环酸

D: 鱼精蛋白

答案：D

58. 用军团菌、支原体肺炎的首选药()

A: 克拉霉素

B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案：C

59. 可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是()

A: 低分子肝素

B: 华法林

C: 达比加群酯

D: 肝素钠

答案: C

60. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 精氨酸

C: 赖氨酸

D: 复方氨基酸注射液(18AA)

答案: B

61. β_1 受体激动后的影响是

A: 脂肪分解

B: 增加心率

C: 肌肉震颤

D: 支气管扩张

答案: B

62. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制甲状腺过氧化酶

B: 抑制 Na^+-K^+ 泵

C: 抑制碘泵

D: 抑制甲状腺蛋白水解酶

答案: A

63. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和 () 联合有协同作用。

A: 噻嗪类利尿剂

B: 人促红素

C: β 受体阻断剂

D: 留钾利尿剂

答案: C

64. 替比夫定的作用靶点是

A: 脱氧核糖核酸聚合酶

B: HIV-1 反转录酶

C: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

D: 神经氨酸酶

答案: A

65. 体内代谢迅速,严重过量导致出血时,可用鱼精蛋白拮抗的药物是

A: 氯吡格雷

B: 阿司匹林

C: 依诺肝素

D: 肝素

答案: D

66. 可使人体对维生素 B2 的需求增加的是

A: 雌激素

B: 异烟肼

C: 丙磺舒

D: 糖皮质激素

答案: C

67. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时,接听病房咨询电话,得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者,出现高热、肺纹加重,患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 急性肝衰竭
- B: 红人综合征
- C: 血糖异常
- D: 高血压危象

答案：B

68. 脑瘤的首选药是

- A: 替尼泊苷
- B: 依托泊苷
- C: 博来霉素
- D: 羟喜树碱

答案：A

69. (2021 年真题) 常与 ACEI 联用，在协同降压的同时，兼具防治高钾血症的中效利尿剂是 ()

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 甘油果糖

答案：B

70. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 西格列汀
- C: 罗格列酮
- D: 二甲双胍

答案：A

71. 近期末用过唑类抗真菌药且临床情况稳定的念珠菌(光滑和克柔念珠菌除外)感染，首选()治疗

- A: 伏立康唑
- B: 卡泊芬净
- C: 氟康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

72. 抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用

- A: 碳酸钙
- B: 氢氧化镁
- C: 氢氧化铝
- D: 三硅酸镁

答案：D

73. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应

- A: 中枢神经系统毒性
- B: 眼部水肿
- C: 白细胞增高
- D: 白细胞减少

答案：A

74. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

- A: 青霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 异烟肼
- D: 红霉素

答案：B

75. 对念珠菌的抗菌活性高，且不易产生耐药性，因毒性大，不宜用作注射给药是

- A: 制霉菌素
- B: 伊曲康唑
- C: 特比萘芬
- D: 灰黄霉素

答案：A

76. （2017 年真题）药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 头孢曲松
- B: 头孢哌酮
- C: 阿米卡星
- D: 替考拉宁

答案：D

77. 熊去氧胆酸的禁忌证不包括

- A: 哺乳期妇女
- B: 高血压患者
- C: 胆道完全梗阻
- D: 严重肝功能不全者

答案：B

78. （2020 年真题）可引起心脏 Q-T 间期延长的药物是

- A: 克林霉素
- B: 磺胺甲噁唑

C: 左氧氟沙星

D: 头孢呋辛

答案: C

79. 巨幼红细胞性贫血应首选

A: 维生素 B

B: 亚叶酸钙

C: 维生素 B

D: 叶酸+维生素 B

答案: D

80. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

A: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

B: 修复消化道黏膜

C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素

D: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能

答案: A

81. (2020 年真题) 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A: 特比萘芬

B: 阿莫罗芬

C: 制霉菌素

D: 联苯苄唑

答案：A

82. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

A: BUN

B: CK

C: AST

D: Cr

答案：B

83. 口服治疗体癣，毛发癣，对深部真菌无效的药物是()

A: 环丙沙星

B: 灰黄霉素

C: 咪康唑

D: 克霉唑

答案：B

84. 下列药物中，不属于雌激素的是

A: 雌三醇

B: 黄体酮

C: 雌二醇

D: 尼尔雌醇

答案：B

85. 主要增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素敏感性的药物是

A: 罗格列酮

B: 二甲双胍

C: 胰岛素

D: 氢氧化镁

答案：B

86. (2018 年真题) 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

A: 骨髓抑制

B: 血压升高

C: 痤疮样皮疹

D: 心肌损伤

答案：C

87. (2016 年真题) 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是

A: 替考拉宁

B: 利福平

C: 磷霉素

D: 舒巴坦

答案：B

88. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的主要作用靶点是

A: Na^+-Cl^- 共转运子

B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

C: 远曲小管近端

D: 磷酸二酯酶

答案：A

89. (2015 年真题) 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是 ()。

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/006233200100011030>