

外科护理学试题含参考答案

1、颅脑损伤病人出现中间清醒期提示有

- A、硬脑膜外血肿
- B、颅底骨折
- C、脑内血肿
- D、脑震荡
- E、脑挫裂伤

答案：A

2、有关手术前的叙述错误的是

- A、手术前晚可给镇静剂
- B、急性必须灌肠
- C、急性呼吸道感染的病人控制后再手术
- D、术前戒烟
- E、术日晨测体温

答案：B

3、“白胆汁”见于

- A、急性单纯性胆囊炎
- B、坏疽性胆囊炎
- C、化脓性胆囊炎
- D、胆囊积液
- E、胆囊穿孔

答案：D

4、腰椎间盘突出症首发症状是

- A、大小便失禁
- B、跛行
- C、腰部活动受限
- D、腰痛
- E、坐骨神经痛

答案：D

5、原发性肝癌与其他恶性肿瘤转移特点不同的是

- A、淋巴转移
- B、种植转移
- C、跳跃性转移
- D、直接蔓延
- E、血运转移

答案：E

6、病人,女,35岁。诊断为“肝外胆管结石”,出现重度黄疸及皮肤瘙痒。对其护理措施不恰当的是

- A、防止皮肤损伤
- B、温水擦洗皮肤
- C、遵医嘱用药
- D、保持皮肤清洁
- E、协助病人搔抓,缓解发痒症状

答案：E

7、男性38岁,骨盆骨折并后尿道损伤,术后3个月,现排尿困难,此时应作

- A、膀胱造口
- B、抗生素应用
- C、少饮水
- D、尿道探子扩张尿道
- E、导尿

答案：D

8、病人,男,46岁。有胃溃疡病史近10年。近2个月疼痛加剧,无呕吐,服用多种抑酸剂不能缓解。查体:腹部平软,上腹部轻压痛,可扪及肿块,质硬。病人确诊应首选

- A、~~x~~ 线钡餐检查
- B、幽门螺杆菌检查
- C、胃镜检查
- D、大便隐血试验
- E、胃液分析

答案：C

9、肝移植术后病人需要戴口罩外出的时间是术

- A、2个月
- B、1年内
- C、3个月
- D、1个月内
- E、6个月

答案：E

10、病人,男,58岁。患结肠癌,拟行左结肠癌根治术,术前需几日开始服用肠道消炎药

- A、1d

B、 5d

C、 4d

D、 3d

E、 2d

答案： A

11、肾、输尿管结石的主要临床表现是

A、 尿末痛,尿流中断

B、 肾绞痛,血尿

C、 无痛性间歇性血尿

D、 慢性膀胱刺激征,血尿和脓尿

E、 排尿痛,尿流细和滴尿

答案： B

12、下肢静脉曲张早期的主要症状是

A、 下肢沉重感

B、 血栓性静脉炎

C、 静脉血栓形成

D、 溃疡形成

E、 曲张静脉破裂出血

答案： A

13、手术进行中的无菌原则哪项是错误的

A、 手术人员一经洗手,手臂即不接触未经消毒的物品

B、 不可在手术人员背后传递器械及手术物品

C、 手术过程中洞侧人员需调换位置时,应先退后一步,背对背转到另一位置。

D、 参观手术人员可靠近手术人员或站得太高

E、 如手套破损或接触到有菌区,需另换无菌手套

答案： D

14、腹部闭合性损伤时,最常见的实质性脏器损伤为

A、 肾

B、 肝

C、 胰

D、 胃

E、 脾

答案： E

15、对胸部损伤病人的康复指导首要的是()

A、 适当加强营养

- B、有效的呼吸、咳痰
- C、愉快的心情
- D、防止便秘
- E、劳逸结合

答案：B

16、病人,男,67岁。行左侧全肺切除术。术后病人应避免的体位是

- A、仰卧位
- B、坐位
- C、半卧位
- D、1/4左侧卧位
- E、左侧侧卧位

答案：E

17、肾修补或肾部分切除术后应卧床

- A、2周
- B、4~6周
- C、1周
- D、2~4周
- E、2~3d

答案：A

18、甲状腺大部切除术的手术体位是

- A、颈过伸位
- B、健侧卧位
- C、半卧位
- D、平卧位
- E、患侧卧位

答案：A

19、大隐静脉剥脱术后不当的是

- A、应注意观察患肢有无出血、肿胀及疼痛
- B、术后48h可下床活动
- C、鼓励病人早期活动患肢
- D、卧床休息,患肢放平
- E、弹力绷带包扎4~6周

答案：D

20、最容易发生骨肉瘤转移的脏器是

- A、脾

- B、肝
- C、肾
- D、肺
- E、脑

答案：D

21、行肝切除术后早期的病人体位应为

- A、尽量活动,有利于胃肠道功能恢复
- B、高半卧位,有利于引流
- C、鼓助,有利于保持呼吸通畅
- D、绝对平卧体息 24 小时以上
- E、低半卧位,有利于血液回流

答案：D

22、骨折与软组织损伤的鉴别,最有意义的是

- A、肿胀瘀斑
- B、疼痛
- C、压痛
- D、功能障碍
- E、纵轴叩击痛

答案：C

23、腹腔穿刺抽出凝固的血液提示

- A、抽出为血管内血液
- B、出血性胰腺炎
- C、肝、脾破裂
- D、腹腔内积血
- E、腹膜后血肿

答案：A

24、病人,男,50 岁。近来上腹部饱胀不适,疼痛,皮肤瘙痒,就诊医院诊断为“胰头癌”。该病人最主要的症状和体征是

- A、消瘦
- B、黄疸
- C、上腹饱胀
- D、上腹痛
- E、腹泻

答案：B

25、胃溃疡疼痛的一般规律是

- A、疼痛-进食-缓解
- B、进食-疼痛-缓解
- C、疼痛-缓解-进食
- D、无明显规律
- E、进食-缓解-疼痛

答案：B

26、病人,男,18岁。因车祸致头部受伤。伤后当即昏迷1h,清醒后诉头痛,有呕吐,右上肢肌力2级;脑脊液检查有红细胞。观察该病人生命体征的顺序是

- A、呼吸、脉搏、血压
- B、脉搏、血压、呼吸
- C、脉搏、呼吸、血压
- D、血压、脉搏、呼吸
- E、呼吸、血压、脉搏

答案：A

27、张某,49岁,有吸烟史,全麻术后回病房,麻醉未清醒,病人血压、脉搏正常,吸气困难,呼吸时喉头有啰音,应考虑为

- A、呼吸道分泌物多
- B、舌后坠
- C、呕吐物窒息
- D、喉痉挛
- E、呼吸不规则

答案：A

28、通常对开放性损伤进行清创,最佳时间为

- A、伤后24h内
- B、主即进行
- C、伤后8~10h内
- D、伤后12h内
- E、伤后6~8h内

答案：E

29、病人,男,60岁。右侧全肺切除术后,在输液过程中突然出现呼吸困难,气促咳嗽咳粉红色泡沫痰。示病人发生

- A、肺不张
- B、心律失常
- C、肺水肿
- D、肺栓塞

E、肺内感染

答案：C

30、以下哪项是血栓闭塞性脉管炎晚期特有的临床表现

A、休息痛

B、营养性改变

C、间歇性跛行

D、趾端坏疽

E、足背动脉搏动消失

答案：D

31、病人,男,58岁。因患早期直肠癌入院,行直肠癌根治术(Miles 手术),术后病人拒绝见人。导致其不愿与人接触的护理诊断是

A、绝望

B、焦虑

C、自我形象紊乱

D、不合作

E、悲哀

答案：C

32、骨折牵引术,下列哪项护理措施能防止过度牵引

A、鼓励病人功能锻炼

B、观察体温

C、每天用 70%酒精滴牵引针孔

D、定时测量肢体长度

E、抬高床尾 15-30cm

答案：D

33、冬眠低温疗法护理的注意事项,下列哪项错误()

A、单人房间,光线宜暗 • 室温 18-20℃

B、先物理降温,后冬眠

C、直肠内体温不低于 32℃

D、防止发生冻伤和肺炎

E、收缩压不低于 76.5mmHg

答案：B

34、乳房脓肿的确诊依据是()

A、寒战、高热

B、搏动性疼痛

C、白细胞升高

D、穿刺有脓液

E、有波动感

答案：D

35、黄某,36岁,行甲状腺大部分切除术后3天,出现手足疼痛,指尖针刺感并有轻微形成返神经提伤抽搐。护士应备好()

A、碘化钠

B、葡萄糖酸钙

C、碳酸氢钠

D、氯化钾

E、苯巴比妥

答案：B

36、肛管手术后,能促进炎症吸收,缓解肛门括约肌痉挛的护理措施是

A、早期适当活动

B、保持局部清洁

C、保持大便通畅

D、避免仰卧位

E、温水肛门坐浴

答案：E

37、手术切口的外源性感染途径不包括

A、手术人员的手和臂

B、手术区皮肤

C、手术台面

D、手术室空气灰尘

E、外科器械物品

答案：C

38、病人,男,24岁。外伤致右胫腓骨骨折。进行跟骨结节牵引,下列护理不妥的是

A、定期测量肢体长度、防止过度牵引

B、检查针孔周围皮肤有无红肿及疼痛

C、向病人解释牵引的目的及效果

D、每日用酒精擦针孔处1-2次

E、针孔处的血痂应除去以免感染

答案：E

39、病人,男,65岁。结肠癌术后发生吻合口瘘,需进行肠外营养支持,下列措施错误的是

- A、配制的营养液 24 h 内用完
- B、导管定期消毒
- C、暂时不输的营养液常温放置
- D、营养液在无菌条件下配制
- E、营养液中不宜添加抗生素

答案：C

40、以下哪种不是血栓闭塞性脉管炎的症状

- A、对寒冷敏感性增加
- B、局部皮肤颜色变化
- C、静息痛
- D、间歇性发作的突发性疼痛
- E、活动时有时有间歇痛

答案：D

41、病人,女,55 岁。体重 70kg,诊断为中度等渗性缺水,估计失水量为

- A、4500ml
- B、3000ml
- C、2500ml
- D、4000ml
- E、3500ml

答案：E

42、洪某,女性,50 岁。原有胆道结石病史,5 小时前饮食后突然出现上腹部剧烈疼痛伴呕吐;查体:体温 39℃,血压 90/60mmHg,上腹部明显压痛、反跳痛、腹肌紧张,腹穿抽出血性腹水;辅助检查:血、尿淀粉酶明显升高,B 超报告胆总管末端结石、胰腺明显肿大,进入病房后护士应

- A、立即抗休克抢救,同时行急诊手术准备
- B、给予抗生素,降温处理
- C、仅给予抗休克治疗
- D、常规处理
- E、等待医嘱

答案：A

43、麦氏点位于

- A、右髂前上棘与脐连线中内 1/3 交界处
- B、右髂前上棘与脐连线 1/2 交界处
- C、左髂前上棘与脐连线中内 1/3 交界处
- D、左髂前上棘与脐连线中外 1/3 交界处

、右髂前上棘与脐连线中外 1/3 交界处

答案：E

44、下列哪项与下肢静脉曲张的发病无关

- A、长期静脉压力升高
- B、静脉壁薄弱
- C、长期站立工作
- D、静脉瓣膜功能不全
- E、静脉管腔狭窄

答案：E

45、某病人头部击伤,头皮裂开已 12 小时以上,伤口无明显感染,其处理为

- A、清创并置放胶片引流
- B、观察 2~3 天,二期缝合
- C、彻底清创,一期缝合
- D、不予缝合,以免增加损伤
- E、凡士林纱布覆盖

答案：B

46、诊断小肝癌和微小肝癌的方法是

- A、b 超
- B、ct
- C、AFP 检测
- D、选择性腹腔动脉或肝动脉造影
- E、肝穿刺针吸细胞学检查

答案：D

肝动脉造影对直径<2.0cm 的微小肝癌,诊断符合率可达 90%;对血管丰富的肿瘤,可分辨直径>1.0 的肿瘤。

47、全麻病人术前准备中,预防其发生术中误吸的最主要措施是

- A、禁食禁水
- B、应用阿托品
- C、应用胃动力药
- D、灌肠
- E、放置胃管

答案：A

48、细菌性肝脓肿,细菌进入肝脏最常见的途径是

- A、外伤伤口
- B、淋巴系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/007053160123006156>