基护练习题附答案

1.各种注射法的定位哪项是正确的（ ） [单选题] *

A.皮内注射—前臂掌侧中段

B.臀大肌肌内注射—髂前上棘和尾骨连线的下1/3

C.臀中肌臀小肌肌内注射—髂前上棘外侧3横指处(正确答案)

D.股静脉注射—股三角区内上方

E.皮下注射—肩峰下2、3横指的三角肌处

2.同时注射数种药物时，应特别注意药物的（ ） [单选题] *

A.有无变质

B.酸碱度

C.刺激性

D.配伍禁忌(正确答案)

E.有效期

3.关于各种注射的目的，下述描述不正确的是（ ） [单选题] *

A.皮内注射:药物过敏试验

B.皮下注射:注射刺激性较强的药物(正确答案)

C.肌内注射:注射药量较大的药物

D.静脉注射:补充营养和水分

E.股静脉注射:抢救危重患者

4.肌内注射部位皮肤消毒范围直径应大于（ ） [单选题] *

A.7cm

B.6cm

C.5cm(正确答案)

D.4cm

E.3cm

5.静脉注射操作中错误的是（ ） [单选题] *

A.认真查对药液

B.抽吸药液，排尽空气

C.针头与皮肤呈90°角进针(正确答案)

D.见回血后松止血带、推药

E.药液不可溢出血管外

6.下列注射定位法哪项是对的（ ） [单选题] *

A.皮内注射:前臂掌侧上段

B.皮下注射:肩峰下2~3横指的三角肌处

C.臀大肌注射法:髂嵴和尾骨连线的外上1/3

D.股静脉注射:股三角区外上方

E.股外侧肌注射:大腿外侧,膝关节上10cm，髋关节下10cm(正确答案)

7.关于碘过敏试验，下述描述正确的是（ ） [单选题] *

A.口服后出现眩晕、心慌等表现即可判断为阳性(正确答案)

B.试验方法包括口服法、眼结膜试验法

C.皮内注射试验时皮丘直径超过2cm即可判断为阳性

D.过敏试验阴性者造影时不会发生过敏反应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/007056026011010011