

2024 年广东省龙门县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题真题题库附答案（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- B: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
- C: 需监测 INR
- D: 与食物和药物相互作用小

答案：C

2. 下尿路感染的最突出的表现是

- A: 肾区叩击痛
- B: 伴明显的腰痛
- C: 膀胱刺激征
- D: 发热

答案：C

3. 服用时不宜嚼碎的是

- A: 胃黏膜保护剂
- B: 抗酸药
- C: 质子泵抑制剂
- D: 解痉、镇痛药

答案：C

4. (2019 年真题) 患者向药师咨询，停用口服避孕药后多久可备孕。

下列答复中，正确的是

- A: 复方短效口服避孕药停药 3 个月后方可备孕
- B: 复方短效口服避孕药停药 6 个月后方可备孕
- C: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕
- D: 长效避孕药停药后即可备孕

答案：C

5. 口服普萘洛尔用于解救的是 ()

- A: 氯丙嗪中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 硝西泮中毒

答案：C

6. 患者正在使用的药物中，可使血尿酸水平升高的是 ()

- A: 氢氯噻嗪和辛伐他汀
- B: 美托洛尔和辛伐他汀
- C: 氢氯噻嗪和阿司匹林
- D: 美托洛尔和赖诺普利

答案：C

7. 在日常饮食因素中，对高血压患者用药疗效影响最大的是

- A: 饮茶
- B: 食盐
- C: 高糖
- D: 食醋

答案：B

8. 可引起眩晕或幻觉的药物是

- A: 氯苯那敏
- B: 东莨菪碱
- C: 阿米洛利
- D: 右美沙芬

答案: D

9. 以下不属于胃黏膜保护剂的是 ()

- A: 胶体果胶铋
- B: 硫糖铝
- C: 克拉霉素
- D: 米索前列醇

答案: C

10. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μmol / L(正常参考范围 45~84 μmol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

答案: A

11. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是 ()

- A: 软膏剂
- B: 含漱剂
- C: 滴眼剂
- D: 直肠栓剂

答案: D

12. 因不良反应很小，可在老年人群中使用的治疗失眠症药物为 ()

- A: 雷美尔通
- B: 米氮平
- C: 艾司唑仑
- D: 佐匹克隆

答案: A

13. 对于缺乏维生素 D 人群，应初始高剂量补充维生素 D₂ 或 D₃，待血清 25-OH-维生素 D₃ 水平达到一定值后，继而给予维持剂量。给予维持剂量的临床指标是血清 25-OH-维生素 D₃ 水平达到

- A: 90 μg/L (225nmol/L) 以上
- B: 10 μg/L (25nmol/L) 以上
- C: 30 μg/L (75nmol/L) 以上
- D: 3 μg/L (7.5nmol/L) 以上

答案: C

14. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 四环素

B: 华法林

C: 氯霉素

D: 磺胺药

答案：B

15. 隔日 1 次用药的外文规范缩写是

A: qd

B: qod

C: qn

D: qh

答案：B

16. 以下抗高血压药物中，属于利尿药的是（）

A: 缬沙坦

B: 阿米洛利

C: 维拉帕米

D: 氨氯地平

答案：B

17. 患者，女，22 岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛 1 天就诊。查体：体温 38.6℃，脉搏 90 次 / 分，呼吸 24 次 / 分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC 11×10^9 / L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后 2 天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 鲍曼不动杆菌

B: 铜绿假单胞菌

C: 肺炎链球菌

D: 副流感病毒

答案：C

18. 流行性腮腺炎

- A: 淋巴细胞增多
- B: 白细胞增多
- C: 红细胞沉降率减慢
- D: 白细胞减少

答案：A

19. 依据权威的专科诊疗指南是

- A: 药物治疗的有效性
- B: 药物治疗的规范性
- C: 药物治疗的方便性
- D: 药物治疗的安全性

答案：B

20. 下列药物中，可影响性功能的药物为

- A: 法莫替丁
- B: 西咪替丁
- C: 雷尼替丁
- D: 泮托拉唑

答案：B

21. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

- A: 昂丹司琼
- B: 雷尼替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 维生素 B6

答案：A

22. 结核病化学治疗的基本原则是（）

- A: 早期、单一、适量、规律、全程
- B: 早期、联合、足量、规律、全程
- C: 早期、单一、足量、规律、全程
- D: 早期、联合、适量、规律、全程

答案：D

23. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

- A: 肝脏疾病
- B: 肾脏疾病
- C: 血液疾病
- D: 心脏疾病

答案：B

24. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是：

- A: 福辛普利
- B: 地高辛
- C: 胺碘酮
- D: 美托洛尔

答案：C

25. 关于血清天冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 天冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能
- B: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT

C: 天冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝、肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中

D: 天冬氨酸氨基转移酶 (AST) 与丙氨酸氨基转移酶 (GPT) 是同一概念

答案：C

26. 患者，男，60 岁，因上臂出现湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是 ()

A: 利巴韦林软膏

B: 氢化可的松软膏

C: 10%樟脑软膏

D: 特比萘芬乳膏

答案：B

27. 患者，女，47 岁，出现一侧颜面部骤然发作性闪痛，诊断为三叉神经痛，应选用的药物是 ()

A: 布洛芬

B: 山莨菪碱

C: 麦角胺咖啡因

D: 卡马西平

答案：D

28. 可提示肝细胞性黄疸的是

A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

C: $>342 \mu\text{mol/L}$

D: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：B

29. 可用于治疗夜盲症的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 复合维生素 B
- B: 维生素
- C: 维生素 A
- D: 维生素 C

答案：C

30. 旅行者轻中度腹泻宜选用

- A: 胰酶
- B: 洛哌丁胺
- C: 双歧三联活菌制剂
- D: 山莨菪碱

答案：B

31. 下列药物中使用前无需皮试的是（）

- A: 紫杉醇注射剂
- B: 苄星青霉素注射剂
- C: 抑肽酶注射剂
- D: 抗狂犬病血清注射剂

答案：A

32. 药名词干为“-penem”的药品是

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

33. （2018 年真题）阿托伐他汀钙的日剂量范围是（）

- A: 10~20mg
- B: 10~80mg
- C: 40~200mg
- D: 5~20mg

答案：B

34. 可引起嗜睡的是

- A: 抗过敏药
- B: 右美沙芬
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案：A

35. 成人静脉血白细胞计数的正常范围值

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

答案：B

36. (2017 年真题) 过敏性皮炎常表现为 ()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 中性粒细胞增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 红细胞增多

答案：A

37. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物的代谢速度的是

- A: 食盐中的氯化钠
- B: 酒中的乙醇
- C: 茶叶中的鞣酸
- D: 食醋中的醋酸

答案：B

38. 可引起尿胆红素阳性的是

- A: 肺结核
- B: 肾小球肾炎
- C: 病毒性肝炎
- D: 再生障碍性贫血

答案：C

39. 肺结核的临床表现是

- A: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血
- B: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- C: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
- D: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

答案：C

40. 患者，女，8 岁，体重 22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在 2 天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3 天。在过去的 2 年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在 3 个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸 30 次 / 分、血压 110 / 83mmHg、心率 130 次 / 分、体温 37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO₂）90%。

- A: 雾化噻托溴铵
- B: 口服泼尼松龙，0.5~1.0mg/kg，持续 5~7 日
- C: 雾化大剂量布地奈德
- D: 口服福莫特罗

答案：D

41. 可单独用于轻度、早期高血压的是

- A: 甘露醇
- B: 阿米洛利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：C

42. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC15×10

- A: 急性膀胱炎
- B: 急性肾盂肾炎
- C: 急性肾小球肾炎
- D: 慢性肾盂肾炎

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

43. 膀胱炎约占尿路感染的 60%以上，致病菌多为（）

A: 白色念珠菌

- B: 奈瑟淋病双球菌
- C: 大肠埃希菌
- D: 金黄色葡萄球菌

答案：C

44. 适用于早期、轻度症状者的是

- A: 左旋多巴
- B: 恩托卡朋
- C: 苯海索
- D: 司来吉兰

答案：D

45. 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 控制体重
- B: 戒烟酒
- C: 餐中多饮水
- D: 避免高脂饮食

答案：C

46. 紧急避孕药的服药时间须在性行为之后的

- A: 72h 内
- B: 24h 内
- C: 48h 内
- D: 12h 内

答案：A

47. 门冬胰岛素归属

- A: B 级
- B: C 级
- C: X 级
- D: D 级

答案：A

48. 对缺铁性贫血者应选用的药物是

- A: 富马酸亚铁
- B: 叶酸+维生素 B12
- C: 维生素 B12
- D: 烟酸

答案：A

49. 发热的判断标准是指人体昼夜体温波动超过 1℃，腋下温度超过

- A: 37.6℃
- B: 37.3℃
- C: 36.7℃
- D: 37.0℃

答案：D

50. 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目为

- A: 抗-HBe(+)
- B: 抗-HBs(+)
- C: 抗-HBc(+)
- D: HBeAg(+)

答案：D

51. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，归属于

- A: 静脉药物配置
- B: 处方点评
- C: 治疗药物监测
- D: 处方审核

答案：B

52. 根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

- A: 96h 以内
- B: 108h 以内
- C: 72h 以内
- D: 48h 以内

答案：D

53. 适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

- A: 阿替洛尔
- B: 多沙唑嗪
- C: 阿利吉仑
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

54. 糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

- A: 病情尚未控制
- B: 生长激素分泌过度
- C: 胰岛素分泌过度

D: 伴甲状腺功能亢进

答案：A

55. 应用两种以上药物以增强与确保疗效

A: 适量

B: 联合

C: 早期

D: 规律

答案：B

56. 用量大时，会出现中毒症状，呼吸快而浅，血压上升等，严重时会出现呼吸麻痹而死亡

A: 利尿剂

B: 精神刺激剂

C: β -受体阻断剂

D: 蛋白同化激素

答案：B

57. 减少因人员不足引致忙乱无序而带来的调配差错，是针对药品调配环节防范措施中的

A: 环境整齐、安静

B: 保证足够的人力配备

C: 及时沟通

D: 规范操作、坚持核对

答案：B

58. 多黏菌素可能引起

A: 尿胆红素

- B: 尿液隐血
- C: 尿葡萄糖
- D: 尿蛋白

答案：D

59. 舒筋活络酒不宜联用的是

- A: 氢氧化铝
- B: 可待因
- C: 苯巴比妥
- D: 阿托品

答案：C

60. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿莫西林
- C: 头孢呋辛
- D: 阿奇霉素

答案：D

61. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 美托洛尔缓释片
- B: 氨氯地平片
- C: 阿司匹林肠溶片
- D: 贝那普利片

答案：D

62. 宜溶解于温开水中后服用

- A: 泡腾片
- B: 胶囊剂
- C: 粉剂
- D: 糖浆剂

答案：A

63. 环磷酰胺可引起

- A: 溶血性尿毒症
- B: 心脏毒性
- C: 末梢神经炎
- D: 出血性膀胱炎

答案：D

64. 可导致儿童昏迷及惊厥的药物是

- A: 抗组胺药
- B: 氯霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 维生素 A

答案：A

65. 服用维生素 B

- A: 食醋
- B: 酒
- C: 脂肪
- D: 食盐

答案：B

66. 在治疗蛔虫病的药物中，"排虫缓慢而可能发生蛔虫游走与穿孔"的是

- A: 噻苯达唑
- B: 枸橼酸哌嗪
- C: 噻嘧啶
- D: 阿苯达唑

答案：D

67. 我国高警示药品推荐目录(2015 版)中，新遴选列入的药品种类是

- A: 茶碱类药物(静脉途径)
- B: 中药注射剂
- C: 透皮贴剂
- D: 肠内营养制剂

答案：A

68. 在三级信息源中，世界上最著名的大型药物参考工具书是

- A: 药物事实与比较
- B: 中国药典
- C: 马丁代尔药物大典
- D: 美国药典药物信息

答案：C

69. 以最低的药物成本，实现最好的治疗效果体现

- A: 经济性
- B: 安全性
- C: 有效性
- D: 规范性

答案：A

70. 以下的论述哪项是错误的

- A: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全
- B: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应
- C: 普萘洛尔不可抑制肾素的分泌
- D: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

答案：D

71. 巴比妥类使口服避孕药效果降低属于()。

- A: 作用于同一受体的拮抗作用
- B: 与血浆蛋白结合
- C: 酶诱导作用
- D: 排泄

答案：C

72. 以下所述"处方调配规范四查"中，不正确的是

- A: 查药品
- B: 查适应证
- C: 查配伍禁忌
- D: 查处方

答案：B

73. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

- A: 依诺肝素钠
- B: 尿激酶
- C: 氯吡格雷
- D: 达比加群酯

答案：C

74. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

- A: 哌唑嗪口服
- B: 硝普钠静滴
- C: 卡托普利口服
- D: 硝苯地平口服

答案：B

75. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

- A: 硝酸甘油
- B: 呋塞米
- C: 维生素 E
- D: 阿司匹林

答案：D

76. （2018 年真题）患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 丙戊酸钠
- B: 地西泮
- C: 苯巴比妥

D: 卡马西平

答案: A

77. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

- A: 铅、铋中毒
- B: 过敏性疾病如荨麻疹
- C: 病毒感染性腹泻
- D: 感染性疾病如肺结核

答案: B

78. 心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是 ()

- A: β 受体阻断剂
- B: 阿托品
- C: 利尿剂
- D: 肾上腺素

答案: C

79. 关于现代药学的发展,以药品供应为中心阶段的特征是

- A: 以促进合理用药为主
- B: 以新药研制为中心
- C: 以药品工业化生产为中心
- D: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作

答案: D

80. 若需要 70% 的乙醇 1000ml, 现有 95% 的乙醇应如何配制

- A: 取 736.8ml 95% 的乙醇, 加 1000ml 水
- B: 取 263.2ml 95% 的乙醇, 加 1000ml 水
- C: 取 736.8ml 95% 的乙醇, 加水稀释至 1000ml

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 取 263.2ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml

答案：C

81. 急性肾盂肾炎常见

A: 蜡样管型

B: 细胞管型

C: 白细胞管型

D: 颗粒管型、透明管型

答案：C

82. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

A: 不宜与 MAOIs 类药物联合使用

B: 如以上药物治疗无效，可考虑更换为同类的其他药物

C: 药物治疗至少 2 周才会有显著的情绪反应

D: 从最大有效剂量开始，逐步递减剂量

答案：D

83. 属于妊娠 X 级毒性药品的是

A: 辛伐他汀

B: 氧氟沙星

C: 水溶性维生素

D: 青霉素、头孢哌酮一舒巴坦

答案：A

84. 庆大霉素可引起

A: 锥体外系反应

B: 听神经障碍

C: 癫痫发作

D: 再生障碍性贫血

答案: B

85. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg。药师为其推荐碳酸钙(0. 5g / 片)，该患者适宜的用法用量是

A: 6 片 qd

B: 4 片 qd

C: 1 片 tid

D: 2 片 tid

答案: C

86. 连续使用不应超过 10 日，并在使用期间定期测量眼压的滴眼液是

A: 泼尼松滴眼液

B: 阿昔洛韦滴眼液

C: 硫酸锌滴眼液

D: 磺胺醋酰钠滴眼液

答案: A

87. 患者，女，56 岁，身高 156m，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmo/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

A: 口服 α -糖苷酶抑制剂

B: 口服二甲双胍

C: 口服磺酰脲类降糖药

D: 饮食及运动治疗

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/007130106052010024>