

中西医结合科护士理论考试（五）您的姓名：  
[填空题] \*

01. 有关 Graves 病的病因，以下表达正确的选项是（） [单项选择题] \*与遗传、免疫均有关（正确答案）

A. 与遗传有关，与免疫无关与免疫有关，与遗传无关

B. 由病毒引起由手术引起

02. 正常成人颅内压值为（） [单项选择题] \*0.1 ~0.5 kPa

A. 0.5 - 1.0 kPa0.7 - 2.0 kPa（正确答案）

B. 2.0 ~ 2.5 kPa2.5 ~ 3.0 kPa

03. 积液呈黑色，常见于（） [单项选择题] \*尿毒症

A. 阿米巴脓肿破溃曲霉菌感染（正确答案）

B. 铜绿假单胞菌感染溶血性黄疸

04. 哪一种是良性肿瘤（） [单项选择题] \* $p_{aO_2} < 60\text{mmHg}$   $P_{aCO_2} > 50\text{mmHg}$

A.  $p_{aO_2} < 60\text{mmHg}$ ,  $P_{aCO_2} < 50\text{mmHg}$ （正确答案）  $P_{aO_2} > 70\text{mmHg}$ ,  $P_{aCO_2} < 55\text{mmHg}$

D  $P_{aO_2} < 60\text{mmHg}$ E.以上都不是

37. 代谢性酸中毒的临床表现为（） [单项选择题] \*呼吸快而浅

A. 呼吸慢而浅尿液呈碱性

B. 肌肉震颤呼吸深而快（正确答案）

38. 诊断呼吸衰竭最重要的血气分析指标是（） [单项选择题] \*A、动脉血氧分压低于 60 mmHg（正确答案）

B、动脉血二氧化碳分压高于 50mmHgC、pH 值低于 7.35

D、二氧化碳结合力高于 29mmol/L E、 $BE < -2.3\text{mmol/L}$

39. 某溃疡病并发幽门梗阻病人，因反复呕吐入院，血气分析结果为 pH7.49, PaCO<sub>2</sub>48mmhg, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>36mmol/L, 该病人应诊断为 ( ) [单项选择题] \*

A、呼吸性碱中毒 B、呼吸性酸中毒

C、代谢性酸中毒 D、代谢性碱中毒 (正确答案)

E、混合性酸碱中毒

40、胸腔冲洗时应取什么体位？（） [单项选择题] \*A、平卧

B、半坐卧位（正确答案） C、左侧卧位

D、右侧卧位为到达治疗效果，吸氧的浓度应不低于（） [单项选择题] \*

A. 35%-45%50%

B. 60%25%（正确答案）

C. 20%氧气筒距离明火至少（） [单项选择题] \*

A. 6m5m（正确答案）

B. 4m3m

C. 2m中心静脉导管培养标本采集血量为：（） [单项选择题] \*

A 成人每次 10-20ml,小儿每次 1-5ml（正确答案） B 成人每次 15-20ml,小儿每次 3-5ml

C 成人每次 10-15ml,小儿每次 1.3mlD 成人每次 5-10ml,小儿每次 1.5ml

E 成人小儿每次 3-10ml

41. 外周静脉血，导管血，导管尖端标本采集间隔时间不超过：（） [单项选择题] \*A 1 分钟

B3 分钟 C 5 分钟（正确答案）

D 10 分钟 E2分钟

42. 导管尖端标本采集应距导管尖端（）处用无菌尖剪剪断，标本置于无菌容器中。 [单项选择题] \*

A 10cmB 5cm E 正确答案)

C 8cmD 3cm

E 1cm应正确把握采集时间，哪项不正确：（） [单项选择题] \*

A 尽量使用抗菌药物之前 B 寒战发热患者初期时采血可提高阳性率

C 怀疑导管相关感染时尽早采集 D 已使用抗菌药物治疗的在下次用药前采集

E 高热寒战患者降温后采集 [正确答案) 导管血采集操作中不正确的选项是：（） [单项选择题] \*

A 常规消毒导管管道连接处，直接抽取 5ml 血液正确答案) B 采血后轻轻摇匀并在培养瓶上注明采部位

C 消毒穿刺点无菌纱布覆盖 D 采血完毕，选择生理盐水进行冲管和正压封管

E 血培养瓶瓶盖消毒后需带干关于肠内营养的护理措施，错误的选项是（） [单项选择题] \*

A. 保管养液无菌 B 保持管饲导营通畅

C. 保护鼻腔黏膜 D 那液温度应保在 20-22° C （正确答案）

E 胃内剩余量大于 150ml 应暂输注鼻饲营养液时辅以胃肠动力药如吗丁琳、莫沙必利，一般在（）由鼻饲管内注

入 [单项选择题] \*营养液前 30 分钟 （正确答案）

A. 营养液后 30 分钟营养液前 60 分钟

B. 营养液后 60 分钟营养液前 10 分钟

43. 鼻饲操作后嘱患者维持原卧位（）分钟，防止呕吐。 [单项选择题] \*40-50

A. 20-30:角答案) 30-60

B. 60-8080-120

44. 一氧化碳中毒病人宜输入（） [单项选择题] \*血浆

A. 白蛋白液

B. 新鲜血库血

C. 红细胞混悬液(正确答案) 目前引起下呼吸道医院感染最主要的病原体是 ( )  
[单项选择题] \*

A. 链球菌表皮葡萄球菌

B. 金黄色葡萄球菌铜绿假单胞菌 (正确答案)

C. 卡他球菌患者女性，已婚，停经 52 天，阴道少许出血 2 天，今日突发左下腹剧痛伴明显 肛门坠胀感。体检示：血压 75/50mmHg,脉率 116 次/分，下腹部压痛、反跳痛 明显，移动性浊音 (+ )；妇科检查示：宫颈举痛，左侧附件有压痛。为了明确诊断，应该 ( ) [单项选择题] \*

A. 测尿 hCG 超检查

B. 阴道后穹窿穿刺 (正确答案) 腹腔镜检查

C. 宫腔镜检查胎盘早剥 ( ) [单项选择题] \*

A. 少量阴道流血，伴轻微下腹痛，宫颈口未开阴道出血量和贫血程度不一致，伴腹痛:(正确答案)

B. 妊娠晚期或临产时无痛性反复阴道出血分娩阻滞，剧烈疼痛，宫缩停止，病情恶化

C. 妊娠产物完全排出，阴道流血停止

45. 关于前置胎盘病人的护理，以下表达错误的选项是（） [单项选择题] \*绝对卧床休息，左侧卧位

A. 间断或持续吸氧维持血容量

B. 可以肛查，禁止阴道检查（正确答案） 预防感染

46. 妊娠合并心脏病孕妇，最易发生心力衰竭的时间是（） [单项选择题] 妊娠 20 ~ 24 周

A. 妊娠 28 ~ 30 周妊娠 32-34 周，（正确答案）

B. 妊娠 36 ~ 38 周妊娠38周以上

47. 妊娠合并心脏病孕妇的分娩期处理，不正确的选项是（） [单项选择题] \*使用抗生素预防感染

A. 严密观察产妇的生命体征产后出血时，立即静脉注射麦角新碱（正确答案）

B. 不要让产妇屏气用力产程进展不顺利时，立即采用剖宫产术终止妊娠

48. 临产的主要标志为（） [单项选择题] \*阴道流血

A. 羊水早破不规则子宫收缩

B. 腹痛

C. 规那么子宫收缩**正确答案**) 肺气肿常见的病因是 ( ) [单项选择题] \*

A. 支气管扩张支气管哮喘

B. 尘肺肺纤维化

C. 慢性支气管炎 (**正确答案**) 最常见的诱发和加重心力衰竭的因素是 ( ) [单项选择题] \*

A. 劳累情绪激动

B. 心律失常呼吸道感染:**正确答案**)

C. 输液过多过快患者,28岁,低热咳嗽3月,近10天痰中带血。胸片示:右上第二前肋间以上有斑片状密影,其中见一圆形透亮区,直径2cm,左中肺野第3-4前肋间,有散在小斑片状模糊阴影。最可能的诊断是 (D) [单项选择题] \*

A. 慢性肺脓肿肺囊肿合并感染

B. 肺癌合并空洞浸润型肺结核 (**正确答案**)

C. 金葡菌肺炎患者女性,49岁。干咳两个月,近2周左侧胸痛、气急、胸闷。X线胸片示左上叶前段2cmx2.5cm块状阴影,边缘短毛刺,肺门增大,左侧胸腔积液。该患者最可能的诊断是0 [单项选择题] \*

A. 肺癌 (**正确答案**) 肺炎

B. 肺脓肿胸膜炎

C. 肺结核甲亢合并突眼见于 ( ) [单项选择题] \*

A. TSH分泌瘤毒性功能自主性甲状腺腺瘤

B. Graves病 (**正确答案**) 医源性甲亢

C. 亚急性甲状腺炎合并甲亢呼吸衰竭病人最早最突出的表现是 ( ) [单项选择题] \*

A. 发始呼吸困难:**正确答案**)

B. 心率加快血压下降

C. 精神反常某哮喘病人，呼吸极度困难，一口气不能说完一句话，伴发蛆、大汗淋漓。对

该病人首先必须 0 [单项选择题] \*专人护理，准备抢救用品 (正确答案)

- A. 加强巡视，防止情绪激动帮助口服平喘药物
- B. 防止进食可能诱发哮喘的食物采血做血气分析

49. 急性心肌梗死最常见的死亡原因是（） [单项选择题] \*心源性休克

A. 心力衰竭严重心律失常（正确答案）

B. 电解质紊乱发热

50. 消化道出血应用三腔气囊管压迫止血，放气的时间是术后（） [单项选择题] \*12 小时

A. 24 小时 I（正确答案） 48 小时

B. 72 小时 96 小时

51. 诊断原发性甲状腺功能减退最敏感的试验是（） [单项选择题] \*基础代谢率测定

A. 血清胆固醇测定红细胞三碘甲腺原氨酸摄取试验

B. 甲状腺摄  $^{131}\text{I}$  率测定 E 血清促甲状腺激素（TSH）测定（正确答案）

52. 三腔气囊管使用考前须知中，以下哪项不妥（） [单项选择题] \*充气量要适当

A. 牵引宜适度经常抽吸胃内容物

B. 拔管前宜服石蜡油

C. 出血停止后口服少量流质（**正确答案**）肝硬化腹水产生的机制不包括（） [单项选择题] \*

A. 门静脉内压增高血清白蛋白减少

B. 肾小球滤过减少醛固酮分泌增高

C. 脾功能亢进（**正确答案**）登革热的热型（） [单项选择题] \*

A. 稽留热弛张热

B. 间歇热回归热

C. 马鞍热（**正确答案**）以下哪项不是心绞痛的疼痛特点（） [单项选择题] \*

A. 阵发性前胸、胸骨后部痛劳动或情绪激动时易发作

B. 可放射至心前区与左上肢胸痛一般持续 3 ~ 5 分钟

C. 多数患者伴有心律不齐（**正确答案**）肝硬化出现腹水时，一般血浆白蛋白应低于（） [单项选择题] \*

A. 30g/L（**正确答案**） 25g/L

B. 50g/L

A. 白血病神经母细胞瘤

B. 葡萄胎〔正确答案〕无性细胞瘤

C. 骨髓瘤 05. 重度核左移指外周血白细胞分类计数时，杆状核中性粒细胞的比值（）  
[单项选择题]

\*>1%

A. >5%>10%

B. > 15%>25% (正确答案)

06. 颅脑外伤患者刺痛时睁眼，只能发音和屈肢，其 GCS 昏迷分级计分为（） [单项选择题] \*

A. 10 分 9 分

B. 8 分 7 分 (正确答案)

C. 6 分 07.病毒性肺炎时的特征性病变是（） [单项选择题] \*

A. 纤维素性肺炎化脓性肺炎

B. 出血性肺炎肺纤维化

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/007142046066006041>