

2024 年广东省信宜市《执业药师之西药学专业二》资格考试完整题库加答案解析

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

- A: 赖氨酸
- B: 精氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 复方氨基酸(18AA)

答案：B

2. 长期大量应用双嘧达莫治疗缺血性心脏病时,可能导致患者缺血加重,甚至病情恶化可能的原因是（）

- A: 治疗反应变异
- B: 抗血小板药物继发失效
- C: 双嘧达莫抵抗
- D: 冠状动脉窃血

答案：D

3. 以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

- A: 氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服
- B: 蛲虫病易自身重复感染,故在阿苯达唑治疗 2 周后应重复治疗一次
- C: 阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程,药片需用水吞服
- D: 左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服

答案：A

4. (2021 年真题) 有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是 ()

- A: 碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- B: 阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- C: 与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- D: 丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案：A

5. 可能导致耳蜗神经和肾损害的抗菌药物是

- A: 甲砜霉素
- B: 加替沙星
- C: 多西环素
- D: 庆大霉素

答案：D

6. 下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

- A: 抑制 Na^+ 内流和 K^+ 外流
- B: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用
- C: 可用于治疗心房扑动和心房颤动
- D: 可用于强心苷中毒

答案：D

7. 属于组胺 H_2 受体阻断剂是

- A: 多潘立酮
- B: 法莫替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 氯苯那敏

答案：B

8. (2017 年真题) 可杀灭疥虫的药物是 ()

- A: 阿苯达唑
- B: 甲苯达唑
- C: 维 A 酸
- D: 林旦

答案: D

9. 易致血糖异常的药物是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 加替沙星
- D: 红霉素

答案: C

10. 长期大量服用维生素 A 会出现

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大

答案: C

11. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 罗格列酮
- C: 瑞格列奈
- D: 艾塞那肽

答案: B

12. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

- A: 抑制胃壁细胞 H^+ , K^+ -ATP 酶
- B: 直接中和胃酸
- C: 竞争性拮抗 H_2 受体
- D: 竞争性拮抗 H_1 受体

答案: C

13. 不能用于隐球菌感染的抗真菌药是

- A: 伊曲康唑
- B: 伏立康唑
- C: 卡泊芬净
- D: 氟康唑

答案: C

14. 硫脲类药物用于

- A: 高血压
- B: 糖尿病
- C: 甲亢
- D: 精神病

答案: C

15. 下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

- A: 环丙沙星
- B: 氧氟沙星
- C: 氟罗沙星
- D: 诺氟沙星

答案: B

16. 与唑来膦酸合用可使颌骨坏死的发生率升高的药物是

- A: 高钙食品
- B: 萘普生
- C: 沙利度胺
- D: 抗血管生成药

答案：D

17. (2015 年真题) 具有心脏毒性的抗肿瘤药是 ()。

- A: 柔红霉素
- B: 长春新碱
- C: 紫杉醇
- D: 博来霉素

答案：A

18. 不宜与三环类抗抑郁药合用的是 ()

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 赛洛唑啉
- C: 麻黄碱
- D: 羟甲唑啉

答案：C

19. 可预防环磷酰胺所致泌尿系毒性的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 呋塞米
- C: 美司钠
- D: 维生素

答案：C

20. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是 ()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案: D

21. 阿司匹林的作用机制是

- A: 促进纤溶
- B: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进凝血因子合成

答案: C

22. 骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

- A: 服药后第 6 个月
- B: 服药后第 4 周
- C: 服药后第 3 个月
- D: 服药后第 2 周

答案: B

23. (2017 年真题) 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是 ()

- A: 阿格列汀
- B: 利拉鲁肽
- C: 那格列奈

D: 伏格列波糖

答案: B

24. 可阻断虫体对多种营养和葡萄糖的摄取，导致虫体糖原耗竭，致使寄生虫无法生存和繁殖的广谱驱虫药是

A: 左旋咪唑

B: 甲苯咪唑

C: 阿苯达唑

D: 哌嗪

答案: C

25. 氨基糖苷类作用机制

A: 抑制细菌糖代谢

B: 抑制细菌细胞壁合成

C: 抑制细菌蛋白质合成

D: 干扰细菌核酸代谢

答案: C

26. 属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体抑制剂的是

A: 替罗非班

B: 替格雷洛

C: 噻氯匹定

D: 氯吡格雷

答案: A

27. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

A: 收缩压<90mmHg 的严重低血压

B: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄

C: 急性前壁心肌梗死

D: 梗阻性肥厚型心肌病

答案: C

28. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是()

A: 及早足量抗生素应用

B: 抗生素加激素全身应用

C: 抗生素溶液滴耳

D: 2%酚甘油滴耳

答案: A

29. 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是()

A: 利福平

B: 链霉素

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案: B

30. 哌拉西林

A: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效

B: 对支原体有效

C: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

D: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效

答案: C

31. 与其他袢利尿药相比，不良反应更大，因此临床使用受到限制，主要用作对磺酰胺类药物过敏或不耐受患者替代药物的是

A: 托拉塞米

B: 布美他尼

C: 呋塞米

D: 依他尼酸

答案: D

32. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

A: 利妥昔单抗

B: 西妥昔单抗

C: 贝伐单抗

D: 曲妥珠单抗

答案: A

33. 丙磺舒可影响赛洛多辛的代谢，延长赛洛多辛在体内存在时间，这是因为丙磺舒抑制

A: 血浆蛋白

B: p-糖蛋白

C: UGT287

D: CYP3A4

答案: C

34. 主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后 2~28 日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为 146 小时的是

A: 唑来膦酸

B: 帕米膦酸二钠

C: 依替膦酸二钠

D: 阿仑膦酸钠

答案: A

35. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是 ()

- A: 山莨菪碱
- B: 酚妥拉明
- C: 多潘立酮
- D: 溴吡斯的明

答案: A

36. (2020 年真题) 与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

- A: 柔红霉素
- B: 右雷佐生
- C: 阿糖胞苷
- D: 甲氨蝶呤

答案: A

37. (2020 年真题) 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 万古霉素
- B: 米诺环素
- C: 阿奇霉素
- D: 利奈唑胺

答案: A

38. 主要降低血中胆固醇且具有首过效应的是

- A: 苯扎贝特
- B: 普萘洛尔
- C: 氯贝丁酯
- D: 洛伐他汀

答案：D

39. 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 头孢哌酮
- C: 二甲双胍
- D: 华法林

答案：B

40. 对念珠菌的抗菌活性高，且不易产生耐药性，因毒性大，不宜用作注射给药是

- A: 伊曲康唑
- B: 特比萘芬
- C: 制霉菌素
- D: 灰黄霉素

答案：C

41. 不易导致便秘或腹泻不良反应的药物是

- A: 三硅酸镁
- B: 铝碳酸镁
- C: 氢氧化铝
- D: 碳酸钙

答案：B

42. 为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 三苯双脒
- C: 吡喹酮

D: 甲硝唑

答案: D

43. 肺栓塞静脉溶栓更有效的是()

A: 华法林

B: 磺达肝癸钠

C: 肝素

D: 尿激酶

答案: D

44. 茶碱浓度 15-20ug/ml 时可出现

A: 为有效的治疗浓度

B: 恶心、呕吐、失眠

C: 心动过速、心律失常

D: 呼吸、心跳停止

答案: B

45. 可能导致牙龈出血的药物是

A: 普伐他汀

B: 依诺肝素

C: 拉西地平

D: 普萘洛尔

答案: B

46. 治疗勃起功能障碍药的是

A: 左炔诺孕酮

B: 氯地孕酮

C: 达那唑

D: 他达拉非

答案: D

47. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

A: 阿莫西林

B: 噻嗪类利尿剂

C: 氧化镁

D: 四环素类

答案: B

48. 选择性舒张脑血管的药物是

A: 维拉帕米

B: 氟桂利嗪

C: 硝苯地平

D: 地尔硫革

答案: B

49. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

B: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

C: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

D: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

答案: D

50. 可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

A: 异维 A 酸

B: 克拉霉素

C: 特比萘芬

D: 克罗米通

答案: A

51. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是()

A: 特拉唑嗪

B: 非那雄胺

C: 十一酸睾酮

D: 普适泰

答案: D

52. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A: 丙酸睾酮

B: 伐地那非

C: 坎利酮

D: 呋塞米

答案: B

53. 外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

A: 环磷酰胺

B: 阿霉素

C: 地屈孕酮

D: 聚甲酚磺醛

答案: D

54. β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是()

A: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

B: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

C: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

D: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

答案: B

55. 对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

A: 卡马西平

B: 乙琥胺

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案: C

56. (2016 年真题) 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

A: 维生素 B12

B: 维生素 B2

C: 维生素 B1

D: 依诺肝素

答案: D

57. 为快速杀菌药的抗菌药是()

A: 万古霉素和替考拉宁

B: 万古霉素和林可霉素

C: 万古霉素和氯霉素

D: 氯霉素和替考拉宁

答案: A

58. (2015 年真题) 易导致牙齿黄染的药品是 ()。

A: 多西环素

- B: 头孢哌酮
- C: 庆大霉素
- D: 加替沙星

答案：A

59. 糖皮质激素在临床上一般不用于

- A: 中毒性感染
- B: 全身性红斑狼疮
- C: 支气管哮喘
- D: 真菌感染

答案：D

60. 关于地西泮的叙述，错误的是

- A: 抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一
- B: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛
- C: 抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作
- D: 是一种长效镇静催眠药物

答案：C

61. 患者，男，55岁。1小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B型超声波检查：肾结石。

- A: 阿托品+哌替啶
- B: 吗啡
- C: 哌替啶
- D: 阿托品

答案：A

62. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

- A: 环磷酰胺
- B: 奥沙利铂
- C: 丝裂霉素
- D: 塞替派

答案：A

63. 弱效（使 LDL-ch 水平降低 $<30\%$ ）的他汀类调血脂药

- A: 大剂量阿托伐他汀
- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 小剂量阿托伐他汀

答案：B

64. 扎鲁司特属于

- A: β 肾上腺素受体激动剂
- B: M 胆碱受体阻断剂
- C: 白三烯调节剂
- D: 黄嘌呤类药物

答案：C

65. 用于抗乙肝病毒的药物是

- A: 西多福韦
- B: 扎那米韦
- C: 拉米夫定
- D: 阿昔洛韦

答案：C

66. (2019 年真题) 原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙 40mgqd” 静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是 ()

- A: 泼尼松片 20mgqd
- B: 地塞米松片 10mgqd
- C: 泼尼松片 50mgqd
- D: 泼尼松片 30mgqd

答案: C

67. 苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

- A: 25 $\mu\text{g} / \text{ml}$
- B: 20 $\mu\text{g} / \text{ml}$
- C: 10 $\mu\text{g} / \text{ml}$
- D: 15 $\mu\text{g} / \text{ml}$

答案: B

68. 普萘洛尔

- A: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- B: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- C: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- D: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

答案: D

69. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 对化疗所致的呕吐有效
- B: 对泌乳素的分泌无影响
- C: 无心脏不良反应
- D: 可作为术后预防呕吐的常规用药

答案：B

70. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌或对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的严重感染的抗生素为()

- A: 万古霉素
- B: 哌拉西林
- C: 氨曲南
- D: 阿莫西林

答案：A

71. 利伐沙班的药理作用是

- A: 阻止了 Xa 对凝血酶原的作用
- B: 抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶
- C: 抑制游离凝血酶
- D: 抑制血小板聚集

答案：A

72. 锥体外系疾病、亨廷顿病者禁用的药物是

- A: 吡拉西坦

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 吗氯贝胺

C: 文拉法辛

D: 氟西汀

答案：A

73. 通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

- A: 青蒿素
- B: 奎宁
- C: 乙胺嘧啶
- D: 吡喹酮

答案：A

74. （2016 年真题）属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 美托洛尔
- B: 索他洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 利多卡因

答案：D

75. 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A: 门冬氨酸钾镁注射液
- B: 葡萄糖注射液
- C: 乳酸钠注射液收售，
- D: 二磷酸果糖注射液

答案：D

76. 可减弱哌达帕胺降压作用的是

- A: 拟交感药
- B: 考来烯胺
- C: 多巴胺

D: 胺碘酮

答案: A

77. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 特异性针对房颤有效
- B: 对室上性和室性心动过速都有效
- C: 只对室性心动过速有效
- D: 只对室上性心动过速有效

答案: B

78. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

- A: 沙库巴曲缬沙坦
- B: 卡托普利
- C: 伊伐布雷定
- D: 美托洛尔

答案: A

79. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

- A: 1% 碘甘油
- B: 9% 硼酸冰片滴耳液
- C: 曲伏前列素
- D: 四环素

答案: C

80. 影响毛细血管通透性的促凝血药是

- A: 维生素 K
- B: 卡巴克络

C: 鱼精蛋白

D: 血凝酶

答案: B

81. 奎宁日剂量超过 1g/d 或连续长时间应用，可见耳鸣、头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称为

A: 吉海反应

B: 双硫仑样反应

C: 金鸡纳反应

D: 锥体外系反应

答案: C

82. 需要迅速抗血小板作用时，不能选用的二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

A: 替罗非班

B: 替格雷洛

C: 噻氯匹定

D: 氯吡格雷

答案: C

83. 艾达司珠单抗可用来解救

A: 华法林

B: 阿哌沙班

C: 达比加群

D: 肝素

答案: C

84. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 碳酸锂
- B: 卡比马唑
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 甲巯咪唑

答案：D

85. (2018 年真题) 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用，用于治疗痤疮的药物是 ()

- A: 阿达帕林
- B: 壬二酸
- C: 过氧苯甲酰
- D: 维 A 酸

答案：C

86. 地西泮用于

- A: 神经源性尿崩症
- B: 慢性脑功能不全
- C: 特发性震颤
- D: 早期帕金森病

答案：C

87. 对浅表和深部真菌感染都有效的抗真菌药物是

- A: 酮康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 特比萘芬

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 氟胞嘧啶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/007150101052010024>