

2024 河北省下花园区《执业药师之西药学专业二》资格考试题库大全附参考答案（培优 A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 复方氨基酸注射液出现发热、头痛、心悸、寒战等反应，主要是因为

- A: 患者的个体差异
- B: 含有过敏原
- C: 静脉滴注速度过快
- D: 含有的氨基酸种类太多

答案：C

2. 可用于吗啡中毒解救的药物是

- A: 阿托品
- B: 纳洛酮
- C: 苯甲酸钠咖啡因
- D: 氟马西尼

答案：B

3. 易导致血糖异常的药品是

- A: 头孢哌酮
- B: 庆大霉素
- C: 加替沙星
- D: 多西环素

答案：C

4. 叶酸与维生素 B12 联用治疗

- A: 巨幼细胞贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案：A

5. 止吐方案：每日化疗前，应用 5-HT

- A: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：D

6. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

- A: 拮抗胰岛高血糖素的作用
- B: 竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解
- C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- D: 增强胰岛素的作用

答案：B

7. 激动 β 受体，对慢性心力衰竭疗效较好()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 氨力农
- C: 地高辛
- D: 硝普钠

答案：A

8. 镇静作用明显的 H

- A: 阿司咪唑
- B: 苯海拉明
- C: 西咪替丁
- D: 组胺

答案：B

9. 作用于髓袢升支厚壁段皮质部和远曲小管的利尿剂是

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂
- C: 袢利尿剂
- D: 醛固酮受体阻断剂

答案：B

10. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

- A: 曲马多
- B: 秋水仙碱
- C: 吗啡
- D: 布洛芬

答案：A

11. 下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

- A: 长春新碱
- B: 依托泊苷
- C: 奥沙利铂
- D: 替尼泊苷

答案：B

12. 未确诊的腹痛、炎症性器质性肠病、肠梗阻、肠穿孔患者禁用()

- A: 甘油
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖
- D: 聚乙二醇 4000

答案: D

13. 普通感冒患者,有打喷嚏、流鼻涕的症状,宜选用的药物是()

- A: 茶碱缓释片
- B: 氯苯那敏片
- C: 对乙酰氨基酚滴剂
- D: 右美沙芬片

答案: B

14. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中,不正确的是()

- A: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用
- B: 克罗米通具有局部麻醉作用
- C: 林旦是杀灭疥虫的有效药物,但不能灭虱卵
- D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案: C

15. 单纯疱疹性或溃疡性角膜炎患者禁用()

- A: 利福平
- B: 四环素可的松
- C: 夫西地酸
- D: 氯霉素

答案: B

16. 属于甲状腺激素类药的是

- A: 左甲状腺素
- B: 甲巯咪唑
- C: 生长抑素
- D: 醋酸去氨加压素

答案：A

17. （2015 年真题）治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是（）。

- A: 碘苷滴眼液
- B: 四环素可的松滴眼液
- C: 更昔洛韦滴眼液
- D: 利巴韦林滴眼液

答案：B

18. 下列药物中，不属于雌激素的是

- A: 雌三醇
- B: 黄体酮
- C: 尼尔雌醇
- D: 雌二醇

答案：B

19. 下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

- A: 奥利司他
- B: 环孢素
- C: 米非司酮
- D: 黄体酮

答案：A

20. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

- A: 抑制磷酸二酯酶
- B: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张
- C: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高
- D: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高

答案：C

21. 布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

- A: 15 倍
- B: 25 倍
- C: 100 倍
- D: 40 倍

答案：B

22. （2016 年真题）与西地那非协同，可导致严重低血压的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 非那雄胺
- C: 丙酸睾酮
- D: 甲睾酮

答案：A

23. 为光学异构体的氟喹诺酮类药物是（）

- A: 呋喃妥因
- B: 左氧氟沙星
- C: 磺胺嘧啶
- D: 氯霉素

答案：B

24. 分泌氮皮质激素的是

- A: 球状带
- B: 束状带
- C: 束状带和网状带
- D: 网状带

答案: D

25. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 药物性肝炎
- B: 神经毒性
- C: 骨髓功能抑制
- D: 出血性膀胱炎

答案: C

26. 对于丝裂霉素注意事项的描述，错误的是

- A: 长期应用可抑制卵巢及睾丸功能，造成闭经或精子缺乏
- B: 只需要在用药期间密切监测血常规、肾功能
- C: 溶解后尽快使用，尽量避免同低 pH 的注射液配伍
- D: 老年患者及肾功能不全者慎用

答案: B

27. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

- A: 阿达帕林
- B: 过氧苯甲酰
- C: 维 A 酸
- D: 异维 A 酸

答案：D

28. 已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

- A: 注射用硫酸长春新碱
- B: 注射用柔红霉素
- C: 注射用盐酸博来霉素
- D: 紫杉醇注射液

答案：D

29. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

- A: 氨基己酸
- B: 卡巴洛克
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲苯酸

答案：C

30. 为碱性染料，能抑制革兰阳性菌和少数革兰阴性菌繁殖，对人无害、无刺激的消毒防腐药是

- A: 氯己定
- B: 过氧乙酸
- C: 依沙吖啶
- D: 聚维酮碘

答案：C

31. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 维生素 D

- B: 铁剂
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 钙剂

答案：D

32. (2020 年真题) 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防粒细胞缺乏
- B: 预防癌症复发
- C: 预防过敏反应
- D: 预防出血过多

答案：A

33. 抗酸作用较强、慢而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多的是

- A: 碳酸钙
- B: 氢氧化镁
- C: 三硅酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：A

34. 属于长效避孕药的是

- A: 氯地孕酮
- B: 壬苯醇醚
- C: 左炔诺孕酮
- D: 米非司酮

答案：A

35. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 血红蛋白测定
- B: 血清铁蛋白
- C: 网织红细胞计数
- D: 血小板数量

答案：D

36. 下述药物中属于减鼻充血药的是

- A: 链霉素溶剂
- B: 盐酸麻黄碱溶剂
- C: 色甘酸钠溶剂
- D: 复方薄荷樟脑溶剂

答案：B

37. 利血平与布洛芬合用

- A: 钠水潴留
- B: 口干、便秘、发热
- C: 降压效应减弱
- D: 首剂量低血压反应

答案：C

38. 人体主要的热能来源是

- A: 果糖
- B: 氨基酸
- C: 维生素

D: 葡萄糖

答案：D

39. 对革兰阳性菌作用强，而对革兰阴性菌作用弱的药物是

A: 第四代头孢菌素

B: 第一代头孢菌素

C: 第二代头孢菌素

D: 第三代头孢菌素

答案：B

40. 长期使用可引起维生素 B12 缺乏的药物是

A: 阿司匹林

B: 二甲双胍

C: 头孢哌酮

D: 华法林

答案：B

41. 阻断 M

A: 哌仑西平

B: 奥美拉唑

C: 雷尼替丁

D: 氢氧化铝

答案：A

42. 以下不属于强心苷的禁忌症的选项是

A: 梗阻性肥厚型心脏病

B: 室性心动过速、心室颤动

C: 预激综合征伴心房颤动或扑动

D: 慢性收缩性心力衰竭

答案: D

43. 下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是

A: 维生素类

B: 抗生素

C: 抗病毒药物

D: 糖皮质激素

答案: D

44. (2018 年真题) 肾病综合征患者长期使用泼尼松时，用法为隔日清晨给药一次，这种给药方法的原理是 ()

A: 利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理

B: 利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理

C: 利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

D: 利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

答案: D

45. 米索前列醇可以

A: 与前列腺素 E 受体结合，降低胃壁细胞的胃酸分泌

B: 在胃内直接中和胃酸

C: 竞争性的拮抗组胺与胃壁细胞上的 H 受体结合，抑制基础胃酸分泌及由组胺和食物刺激后引起的胃酸分泌

D: 抑制 H^+ ， K^+ -ATP 酶活性，使壁细胞内的 H^+ 不能转运到胃腔中，阻断了胃酸分泌的最后步骤

答案: A

46. 长期使用糖皮质激素不会导致

- A: 骨质疏松
- B: 高血压
- C: 高钾血症
- D: 糖尿病

答案: C

47. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

- A: 胰腺炎
- B: Cushing 综合征体型
- C: 青光眼
- D: 骨质疏松症

答案: B

48. 在应用螺内酯后应用哪种氨基酸可出现严重并可致命的高钾血症

- A: 色氨酸
- B: 谷氨酸
- C: 苯丙氨酸
- D: 精氨酸

答案: D

49. 克拉维酸与阿莫西林配伍使用是因前者可()

- A: 抑制 β -内酰胺酶
- B: 减少阿莫西林的不良反应
- C: 扩大阿莫西林的抗菌谱
- D: 延缓阿莫西林经肾小管的分泌

答案: A

50. (2017 年真题) 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 阿昔莫司
- C: 依折麦布
- D: 利血平

答案: A

51. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是 ()。

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 阿昔莫司

答案: B

52. 具有耳毒性的是 ()

- A: 氨苯蝶啶
- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案: D

53. 长期大量使用可导致肝功能异常

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 更昔洛韦

答案: A

54. 丙戊酸钠的严重毒性是

- A: 肝功能损害
- B: 再生障碍性贫血
- C: 抑制呼吸
- D: 口干、皮肤干燥

答案：A

55. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

- A: 格雷司琼
- B: 阿瑞吡坦
- C: 甲氧氯普胺
- D: 甲地孕酮

答案：A

56. 下列属于 β 受体阻断剂的是

- A: 螺内酯
- B: 美托洛尔
- C: 阿利吉仑
- D: 卡托普利

答案：B

57. 关于茶碱给药途径叙述不正确的是

- A: 进餐时或餐后服药，吸收较慢
- B: 空腹口服吸收快
- C: 灌肠吸收慢
- D: 肌注有刺激性

答案：C

58. 下列关于铁剂的叙述错误的是

- A: 口服铁剂主要在十二指肠和空肠上段吸收
- B: 最容易吸收的铁剂为三价铁
- C: 儿童缺铁可能影响其行为和学习能力
- D: 脂肪泻患者不建议使用

答案：B

59. (2015 年真题) 在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是 ()

。

- A: 别嘌醇
- B: 苯溴马隆
- C: 二氟尼柳
- D: 秋水仙碱

答案：D

60. 局部应用杀灭疥虫的药物中，疗效最佳的是 ()

- A: 克罗米通
- B: 林旦霜
- C: 硫黄软膏
- D: 苯甲酸苄酯

答案：B

61. 与氢氯噻嗪不存在交叉过敏反应的是

- A: 依他尼酸
- B: 磺胺类药
- C: 布美他尼
- D: 呋塞米

答案：A

62. 成人应用 0.1% 溶液，儿童应用 0.05% 溶液，这种药物是

- A: 羟甲唑啉滴鼻液
- B: 麻黄碱滴鼻液
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 赛洛唑啉滴鼻液

答案：D

63. 可能导致耳蜗神经和肾损害的抗菌药物是

- A: 甲砜霉素
- B: 加替沙星
- C: 多西环素
- D: 庆大霉素

答案：D

64. 心律失常发生的机制是

- A: 心肌兴奋过度导致异常
- B: 心肌兴奋冲动形成异常或传导异常
- C: 潜在起搏点搏动频率加快
- D: 心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常

答案：B

65. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 15mg/kg
- B: 40mg/kg

C: 5mg/kg

D: 60mg/kg

答案：B

66. 可引起致死性肺毒性和肝毒性的抗心律失常药物是

A: 维拉帕米

B: 普萘洛尔

C: 奎尼丁

D: 胺碘酮

答案：D

67. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年，心律失常病史 2 年，长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是 ()

A: 可掩盖低血糖症状 (如心悸、手抖)，但低血糖的其他症状 (如出汗) 仍然存在

B: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

C: 可致甲状腺功能减退，较为常见，发病隐匿

D: 可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案：A

68. 痛风首选

A: 非药物治疗

B: 外源性拉布立酶

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案：A

69.（2016 年真题）用于治疗低磷血症的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 葡萄糖
- C: 三磷酸腺苷
- D: 二磷酸果糖

答案：D

70. 复方氨基酸注射液（6AA）与等量 10%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

- A: 不超过 15 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分
- C: 滴速 20~30 滴 / 分
- D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案：B

71.（2020 年真题）患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 赖诺普利
- B: 吲达帕胺
- C: 氨氯地平
- D: 普萘洛尔

答案：D

72.（2017 年真题）属于 DPP-4 抑制剂的药物是（）

- A: 伏格列波糖
- B: 那格列奈

C: 利拉鲁肽

D: 阿格列汀

答案: D

73. 治疗钙缺乏症 ()

A: 阿仑膦酸钠

B: 葡萄糖酸钙

C: 依降钙素

D: 阿法骨化醇

答案: B

74. 可与强心苷类药物发生相互作用的是

A: 伐地那非

B: 丙酸睾酮

C: 呋塞米

D: 坎利酮

答案: C

75. 属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

A: 他莫昔芬

B: 氟他胺

C: 炔雌醇

D: 阿那曲唑

答案: D

76. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A: 高钠血症

B: 低钠血症

C: 低钾血症

D: 高钾血症

答案: D

77. 从植物中提取，具有促进白细胞增生、抗炎、降血压、抗肿瘤、抗心肌缺氧缺血、抗心律失常等作用的是

A: 鲨肝醇

B: 小檗胺

C: 维生素 B₄

D: 丙酸诺龙

答案: B

78. 与两性霉素 B 合用可减少复发率产生协同作用的药物是()

A: 阿昔洛韦

B: 氟胞嘧啶

C: 灰黄霉素

D: 酮康唑

答案: B

79. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

A: 预混胰岛素注射液

B: 精蛋白锌胰岛素注射液

C: 甘精胰岛素注射液

D: 普通胰岛素注射液

答案: D

80. 西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是

A: 抑制神经末梢突触前膜 α

- B: 抑制 5-羟色胺再摄取
- C: 抑制单胺氧化酶
- D: 抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取

答案：B

81. 抑制 H^+ ， K^+ -ATP 酶活性的药物是

- A: 氢氧化铝
- B: 哌仑西平
- C: 雷尼替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

82. 利福平与口服避孕药合用

- A: 不良反应叠加
- B: 药理作用拮抗
- C: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：D

83. 主要用于解热镇痛，抗炎作用较弱的是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

84. 卡马西平适用于

- A: 神经源性尿崩症

- B: 急慢性脑功能不全
- C: 原发性失眠
- D: 内分泌失调引起的失眠

答案：A

85. 使用氨基己酸可导致

- A: 高胆红素血症
- B: 支气管痉挛
- C: 血栓形成
- D: 肺动脉高压

答案：C

86. 属于 II 类抗心律失常药 ()

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 普萘洛尔

答案：D

87. 抑制血管平滑肌和心肌细胞 Ca

- A: 肼屈嗪
- B: 利血平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 硝苯地平

答案：D

88. (2017 年真题) 属于中枢和外周多巴胺 D₂ 受体阻断剂, 具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是 ()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/007152114046010024>