

福建省建瓯市完整版《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库附答案（满分必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2017 年真题）应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内，应监测的电解质是（）

- A: 钾
- B: 钙
- C: 钠
- D: 锂

答案：A

2. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

- A: 埃索美拉唑
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 阿莫西林
- D: 克拉霉素

答案：B

3. 患者，男，57 岁，肾功能正常，既往有动脉粥样硬化、高血压合并 2 型糖尿病，用下列药物后出现踝关节肿胀，到药房咨询，药师提示有可能引起该不良反应的药物是

- A: 硝苯地平缓释片
- B: 赖诺普利片

C: 阿司匹林肠溶片

D: 格列吡嗪肠溶片

答案：A

4. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

A: 噻托溴铵

B: 喷托维林

C: 氨溴索

D: 沙丁胺醇

答案：A

5. 以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

A: 可待因、吗啡、右美沙芬

B: 苯丙哌林、可待因、吗啡

C: 喷托维林、苯丙哌林、可待因

D: 喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林

答案：D

6. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

A: 氯化钠

B: 碳酸氢钠

C: 氯化铵

D: 乳酸钠

答案：B

7. 关于青霉素不良反应的说法不正确的是

A: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等

- B: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生
- C: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等
- D: 有明显的肾毒性和耳毒性

答案：D

8. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 噻氯匹定
- D: 尿激酶

答案：B

9. 右美沙芬与吗氯贝胺合用会出现

- A: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强
- B: 反射亢进，异常发热、昏睡
- C: 支气管平滑肌痉挛
- D: 精神症状

答案：B

10. (2015 年真题) 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是 ()

。

- A: 甲巯咪唑片
- B: 甲状腺片
- C: 卡比马唑片
- D: 复方碘口服液

答案：A

11. 下列药物中，能促进食物消化的是 ()

- A: 胶体果胶铋
- B: 乳酶生
- C: 雷尼替丁
- D: 兰索拉唑

答案：B

12. (2016 年真题) 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 B1
- D: 依诺肝素

答案：A

13. 下列关于胺碘酮的描述，错误的是

- A: 是广谱抗心律失常药
- B: 在肝中代谢
- C: 主要经肾脏排泄
- D: 脂溶性高，口服、静脉注射均可

答案：C

14. (2020 年真题) 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 米索前列醇
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 兰索拉唑
- D: 铝碳酸镁

答案：D

15. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时,适宜的服药时间是()

- A: 清晨或睡前
- B: 餐后 2h
- C: 餐中
- D: 餐前即刻

答案: C

16. 属于孕激素类的是

- A: 睾酮
- B: 己烯雌酚
- C: 甲地孕酮
- D: 他莫昔芬

答案: C

17. 卡马西平适用于

- A: 原发性失眠
- B: 内分泌失调引起的失眠
- C: 神经源性尿崩症
- D: 急慢性脑功能不全

答案: C

18. 可引起性欲减退的是

- A: 舍尼通
- B: 非那雄胺
- C: 多沙唑嗪
- D: 十一酸睾酮

答案: B

19. 利多卡因的电生理作用错误的是()

- A: 降低自律性
- B: 缩短 APD
- C: 显著减慢传导
- D: ERP 相对延长

答案：C

20. (2015 年真题) 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是 ()。

- A: 伯氯喹
- B: 氯喹
- C: 青蒿素
- D: 奎宁

答案：C

21. 患者，男，56 岁。有糖尿病病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl。

- A: 三碘甲状腺原氨酸
- B: 格列齐特
- C: 正规胰岛素
- D: 珠蛋白锌胰岛素

答案：C

22. 对择期手术者，且无需抗血小板治疗者，应于术前多久考虑停用抗血小板药、抗凝血药

- A: 1 天
- B: 5 天
- C: 1 周

D: 3 天

答案：C

23. 肾病综合征患者长期使用泼尼松时,用法为隔日清晨给药一次,这种给药方法的原理是()

A: 利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理利用糖皮质激素逐渐减量原理

B: 利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

C: 利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

D: 利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理

答案：C

24. 在虫体神经肌肉接头处发挥抗胆碱作用，阻断乙酰胆碱对蛔虫肌肉的兴奋作用，或改变虫体肌肉细胞膜对离子的通透性，影响神经自发冲动的传递；亦可抑制琥珀酸盐的产生，减少能量的供应，从而阻断神经肌肉接头处，使冲动不能下达，使蛔虫从寄生的部位脱开，随肠蠕动而排出体外的药物是

A: 哌嗪

B: 甲苯咪唑

C: 阿苯达唑

D: 左旋咪唑

答案：A

25. 属于必需磷脂类的保肝药是

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 联苯双酯

C: 还原型谷胱甘肽

D: 甘草酸二胺

答案：A

26.（2021 年真题）关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2（SLG-2）抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法，错误的是（）

- A: 适用于 1 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒
- B: 重度肾功能不全患者禁用
- C: 降糖作用不依赖于胰岛 B 细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性
- D: 降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响

答案：A

27.（2017 年真题）夜盲症可以使用的治疗药物是（）

- A: 维生素 A
- B: 维生素 D
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B2

答案：A

28. 以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是（）

- A: 瑞格列奈
- B: 利拉鲁肽
- C: 吡格列酮
- D: 二甲双胍

答案：C

29. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 阿卡波糖
- B: 贝那普利
- C: 罗格列酮
- D: 二甲双胍

答案：C

30. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

- A: 磺胺多辛
- B: 磺胺嘧啶
- C: 甲氧苄啶
- D: 复方新诺明

答案：B

31. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 硼酸
- B: 酚甘油
- C: 盐酸麻黄碱
- D: 过氧化氢

答案：C

32. 大剂量可导致 Q—T 间期延长的是

- A: 西沙必利
- B: 多潘立酮
- C: 甲氧氯普胺
- D: 莫沙必利

答案：A

33. 下列钙通道阻滞剂中可用于治疗心律失常的是

- A: 维拉帕米
- B: 拉西地平
- C: 硝苯地平
- D: 左旋氨氯地平

答案：A

34. 可与核糖体 30S 亚单位结合、而抑制细菌蛋白质合成的药物是

- A: 环丙沙星
- B: 多黏菌素
- C: 替加环素
- D: 庆大霉素

答案：C

35. （2021 年真题）一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 嗜酸乳杆菌
- B: 梭状芽孢杆菌
- C: 粪肠球菌
- D: 双歧杆菌

答案：B

36. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 顺铂
- C: 紫杉醇
- D: 来曲唑

答案：A

37. 以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是()

- A: 慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗
- B: 缓解支气管痉挛的急性症状
- C: 肺气肿伴气道痉挛的治疗
- D: 夜间哮喘的预防和维持治疗

答案：B

38. 配制静脉输液时，应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释，不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是()

- A: 卡泊芬净
- B: 伏立康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 氟康唑

答案：A

39. 中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

- A: 5-HT
- B: 奥美拉唑+口服地塞米松
- C: 5-HT
- D: 每日化疗前，应用 5-HT

答案：C

40. 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

- A: 环丙沙星
- B: 呋喃妥因

C: 青霉素 G

D: 阿奇霉素

答案: B

41. (2015 年真题) 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是 ()。

A: 阿米替林

B: 氟西汀

C: 文拉法辛

D: 吗氯贝胺

答案: C

42. 关于华法林的描述，错误的是

A: 用药期间进食富含维生素 K 食物应尽量稳定

B: 口服华法林真正起作用至少需 3 天

C: 应用过量易致出血

D: 长期服用可增加女性骨质疏松骨折的风险

答案: D

43. 通过促进组织对葡萄糖的摄取和利用发挥作用 ()

A: 二甲双胍

B: 格列本脲

C: 艾塞那肽

D: 阿卡波糖

答案: A

44. 对胰岛素产生耐受者选用

A: 胰岛素

B: 格列本脲

C: 二甲双胍

D: 丙硫氧嘧啶

答案：B

45. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次/日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次/日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次/日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次/日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次/日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次/日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次/日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次/日。

A: 克拉霉素

B: 埃索美拉唑钠

C: 阿莫西林

D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

46. 属于维生素 K 拮抗剂的抗血栓药是

A: 达比加群酯

B: 肝素

C: 华法林

D: 维生素 K

答案：C

47. 糖尿病酮症酸中毒患者选用()

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 格列本脲

答案：A

48. 西咪替丁的禁忌证是

- A: 急性胰腺炎
- B: 应激性溃疡
- C: 卓-艾综合征
- D: 胃食管反流病

答案：A

49. 强效（使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$ ）的他汀类调血脂药

- A: 依折麦布
- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 小剂量阿托伐他汀

答案：C

50. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 细胞内膜 PBP
- D: 核糖体的 30S 亚基

答案：C

51. (2021 年真题) 患者，男，54 岁。拟行膝关节置换术，围手术期宜选用的预防用抗菌药物 ()

- A: 头孢曲松
- B: 头孢噻肟
- C: 头孢唑林
- D: 头孢他啶

答案：C

52. 治疗钩虫病宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 氯喹
- C: 甲苯咪唑
- D: 吡喹酮

答案：C

53. 对抗香豆素过量引起的出血可选用 ()

- A: 垂体后叶素
- B: 维生素 K
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素

答案：B

54. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 更昔洛韦
- B: 阿德福韦酯
- C: 利巴韦林
- D: 拉米夫定

答案：C

55. 用于抗乙肝病毒的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 西多福韦
- C: 扎那米韦
- D: 拉米夫定

答案：D

56. 可使人体对维生素 B2 的需求增加的是

- A: 丙磺舒
- B: 雌激素
- C: 异烟肼
- D: 糖皮质激素

答案：A

57. 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖者首先得降糖药是

- A: 瑞格列奈
- B: 普萘洛尔
- C: 格列美脲
- D: 二甲双胍

答案：D

58. 属于第四代头孢菌素的药物的是()。

- A: 头孢拉定
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢氨苄

答案：B

59. 应用高剂量的 β_2 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

- A: 低镁血症
- B: 低钙血症
- C: 高钙血症
- D: 低钾血症

答案：D

60. 关于硫黄软膏治疗疥疮的用法，错误的是

- A: 对顽固患者必需 3 个疗程方能根治
- B: 儿童可使用 5% 的软膏
- C: 密切接触者应同时接受治疗
- D: 用药期间应勤用热水洗澡

答案：D

61. 糖皮质激素的抗炎作用是

- A: 提高中枢神经系统的兴奋性
- B: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- C: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- D: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案：C

62. 糖皮质激素用于某些慢性病的长期疗法中，采用隔日 1 次给药法，将 48 小时用量一次服用，合适的时间是

- A: 下午 3 时
- B: 上午 8 时
- C: 中午 12 时
- D: 下午 6 时

答案：B

63. 以下适应证与其他四个药物不同的是

- A: 联苯苄唑
- B: 克霉唑
- C: 制霉菌素
- D: 特比萘芬

答案：C

64. (2015 年真题) 属于胰岛素增敏剂的是 () 。

- A: 西格列汀
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 罗格列酮

答案：D

65. 蛔虫病和鞭虫病治疗首选

- A: 噻嘧啶
- B: 甲苯咪唑
- C: 吡喹酮
- D: 三苯双脒

答案：B

66. 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合形成低毒或无毒结合物排出体外,起到解毒和保护肝脏的作用,用于急、慢性肝炎治疗的药物是 ()

- A: 腺苷蛋氨酸
- B: 硫普罗宁
- C: 葡醛内酯

D: 异甘草酸镁

答案: C

67. 辛伐他汀用于心血管事件高危人群的初始剂量是

A: 10mg

B: 15mg

C: 20~40mg

D: 5mg

答案: C

68. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

A: 可诱发闭角型青光眼

B: 哺乳期慎用

C: 滴眼后不应压迫泪囊

D: 可给予拟胆碱类药物解毒

答案: C

69. 钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

A: 克林霉素

B: 青霉素

C: 两性霉素 B

D: 氯霉素

答案: B

70. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A: BUN

B: Hcy

C: CK

D: Cr

答案：C

71. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

A: 多西环素

B: 四环素

C: 氯霉素

D: 青霉素

答案：A

72. (2015 年真题) 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是()。

A: 多索茶碱

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 沙美特罗

答案：D

73. 长期使用可能导致血钾升高的降压药物是

A: 贝那普利

B: 氨氯地平

C: 硝普钠

D: 美托洛尔

答案：A

74. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是

- A: 维生素 K1
- B: 氨基己酸
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 鱼精蛋白

答案：B

75. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

- A: 衣原体
- B: 立克次体
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 支原体

答案：C

76. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓和房室传导阻滞的药物是

- A: 阿托品
- B: 利多卡因
- C: 哌替啶
- D: 洋地黄毒苷

答案：A

77. 布美他尼的利尿作用部位在()

- A: 集合管
- B: 肾小球
- C: 髓袢升支粗段
- D: 远曲小管初段

答案：C

78. 治疗膀胱过度活动症宜选用

- A: 坦洛新
- B: 利血平
- C: 尼莫地平
- D: 托特罗定

答案：D

79. 用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第 1 或第 2 天开始治疗的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 制霉菌素
- C: 奥司他韦
- D: 膦甲酸钠

答案：C

80. （2019 年真题）患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是（）

- A: 氨氯地平
- B: 硝普钠
- C: 贝那普利
- D: 美托洛尔

答案：D

81. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 链霉素
- B: 妥布霉素
- C: 新霉素
- D: 卡那霉素

答案：C

82. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 利奈唑胺
- B: 甲氧苄啶
- C: 磺胺甲唑
- D: 呋喃妥因

答案：B

83. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 阿莫西林
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: 四环素类
- D: 氧化镁

答案：B

84. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A: 缓解腹胀
- B: 治疗肝硬化
- C: 治疗胃溃疡
- D: 预防消化道出血

答案：C

85. 主要结构与雄激素颇为相似，但雄性化作用甚弱，蛋白同化作用很强，临床上可作为升白药物使用的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 丙酸诺龙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/008000041000007024>