2024年广西壮族自治区金秀瑶族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题内部题库【精选题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.高血压伴变异型心绞痛宜选用

A：普萘洛尔

B：硝苯地平

C：尼莫地平

D：利血平

答案：B

2.低精蛋白锌胰岛素是

A：长效类胰岛素

B：磺酰脲类

C：中效类胰岛素

D：α-葡萄糖苷酶抑制剂

答案：C

3.患者，男，58岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊，检查发现血糖高，诊断为2型糖尿病，轻度心功能不全，医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

A：须在进餐前即刻或餐中服用，服药后不进餐会引起低血糖

B：容易引发“继发失效”问题

C：不适用于Ⅰ型糖尿病

D：不良反应风险较高

答案：B

4.治疗立克次体感染选用

A: 庆大霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 红霉素

D: 多西环素

答案：D

5.增加维生素B

A: 红霉素

B: 异烟肼

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案：B

6.抑制DNA回旋酶，使DNA复制受阻，导致DNA降解而细菌死亡的药物是

A: 甲氧苄啶

B: 利福平

C: 诺氟沙星

D: 红霉素

答案：C

7.减少胃肠道对氢氯噻嗪的吸收，应在口服该药1小时前或4小时后服用氢氯噻嗪，该药是

A: 考来烯胺

B: 多巴胺

C：胺碘酮

D：拟交感药

答案：A

8.扎鲁司特属于

A：M胆碱受体阻断剂

B：β肾上腺素受体激动剂

C：黄嘌呤类药物

D：白三烯调节剂

答案：D

9.抗酸作用较强、较快，有导泻作用

A：三硅酸镁

B：氢氧化镁

C：碳酸钙

D：氢氧化铝

答案：B

10.属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

A：苯妥英钠

B：氯苯那敏

C：丙戊酸钠

D：唑吡坦

答案：A

11.最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

A：哌唑嗪

B：地高辛

C：卡托普利

D：氨氯地平

答案：C

12.李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

A：米氮平

B：阿司匹林

C：二甲双胍

D：辛伐他汀

答案：A

13.对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

A：去氧孕烯

B：维生素B6

C：炔雌醇

D：甲羟孕酮和炔雌醇

答案：D

14.对抗香豆素过量引起的出血可选用()

A：维生素K

B：维生素

C：垂体后叶素

D：鱼精蛋白

答案：A

15.属于α-葡萄糖苷酶抑制剂的是

A：瑞格列奈

B：阿卡波糖

C：罗格列酮

D：艾塞那肽

答案：B

16.异烟肼抗结核杆菌的机制是

A：抑制细菌分枝菌酸合成

B：抑制细菌细胞壁的合成

C：抑制细胞核酸代谢

D：抑制DNA螺旋酶

答案：A

17.（2019年真题）长期用药易发生低镁血症的药物是（）

A：胶体果胶铋

B：复方碳酸钙

C：奥美拉唑

D：替普瑞酮

答案：C

18.（2016年真题）减少钠离子内流而使神经细胞稳定，属于乙内酰脲类的是抗癫痫药

A：苯巴比妥

B：苯妥英钠

C：丙戊酸钠

D：卡马西平

答案：B

19.糖皮质激素诱发或加重感染的主要原因是()

A: 激素促使许多病原微生物繁殖

B: 患者对激素不敏感，未反映出相应的疗效

C: 抑制机体的免疫功能

D: 激素用量不足，无法控制症状

答案：C

20.辅助治疗不孕症的维生素是

A: 维生素E

B: 维生素B6

C: 烟酸

D: 维生素B2

答案：A

21.糖皮质激素禁用于严重高血压患者是因为

A: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

B: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解

C: 抑制蛋白质合成

D: 水钠潴留

答案：D

22.用于血氨升高所致精神症状的治疗

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 精氨酸

C: 复方氨基酸(18AA)

D: 赖氨酸

答案：B

23.患者，女，12岁，身高140cm，体重32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

A: 左氧氟沙星

B: 克林霉素

C: 替考拉宁

D: 万古霉素

答案：D

24.主要经胆汁排泄(仅有5%左右经肾排泄)，可用于肾功能轻中度不全患者的磺酰脲类药物是()

A: 格列吡嗪

B: 格列喹酮

C: 格列齐特

D: 格列美脲

答案：B

25.链激酶的作用机制是

A: 抑制维生素K在肝细胞合成凝血因子

B: 抑制血小板聚集

C: 加速抗凝血酶III的作用

D: 促进纤维蛋白溶解

答案：D

26.单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

A: 劳拉西泮

B: 帕洛诺司琼
C: 甲氧氯普胺
D: 氯丙嗪
答案：A

27.患者，男性，26岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。
A: 阿米卡星
B: 替考拉宁
C: 头孢哌酮
D: 头孢曲松
答案：B

28.患者女,孕8周,诊断为“甲状腺功能减退症”给予左甲状腺素钠片治疗对该患者的用药指导,错误的是（）
A: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降,应及时就诊
B: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服
C: 左甲状腺素钠极少通过胎盘治疗剂量下对胎儿无不良影响
D: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响,服药期间应监测甲功
答案：B

29.复方炔诺酮()
A: 抗着床
B: 促进蛋白质合成
C: 抑制排卵作用

D: 减少精子数目

答案：C

30.抑制H+，K+-ATP酶活性的药物是

A: 氢氧化铝

B: 奥美拉唑

C: 雷尼替丁

D: 哌仑西平

答案：B

31.关于镇咳药作用强度的比较，正确的是

A: 苯丙哌林>可待因>喷托维林

B: 苯丙哌林>喷托维林>可待因

C: 喷托维林>苯丙哌林>可待因

D: 可待因>苯丙哌林>喷托维林

答案：A

32.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

A: 伯氨喹

B: 替硝唑

C: 奎宁

D: 哌嗪

答案：A

33.地高辛最适合用于

A: 肺源性心脏病

B: 急性心力衰竭

C: 心律失常

D: 急、慢性心衰并房颤

答案：D

34.属于第一代喹诺酮类药物的是

A: 吡哌酸

B: 萘啶酸

C: 诺氟沙星

D: 莫西沙星

答案：B

35.在体内不经细胞色素P450酶代谢的药物是()

A: 氟伐他汀

B: 普伐他汀

C: 阿托伐他汀

D: 瑞舒伐他汀

答案：B

36.属于可供静脉注射的胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 普通胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 地特胰岛素

D: 预混胰岛素

答案：A

37.噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

A: Na+-Cl-共转运子

B: Na+-K+-2Cl-同向转运子

C: 磷酸二酯酶

D: 远曲小管近端

答案：C

38.关于噻嗪类利尿药的描述，错误的是

A: 可引起低钙血症

B: 糖尿病患者慎用

C: 痛风患者慎用

D: 肾功能不良者禁用

答案：A

39.精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

A: 谷维素

B: 氯美扎酮

C: 氟西泮

D: 夸西泮

答案：B

40.采用华法林钠治疗需短期缓解痛楚时，宜选用的药品是()

A: 维生素B2

B: 维生素B1

C: 对乙酰氨基酚

D: 维生素B12

答案：C

41.关于使用依折麦布的说法，错误的是

A: 可单独服用或与他汀类联合应用

B: 剂量超过10mg/d对降低LDL水平无增效作用

C: 成人剂量一次10mg。一日1次

D: 需空腹服用

答案：D

42.可抑制心肌重构，改善临床左室功能，进一步降低总死亡率、降低心脏猝死率，所有慢性收缩性心力衰竭、心功能Ⅰ～Ⅲ级的患者都必须使用的药物是

A: 伊伐布雷定

B: 美托洛尔

C: 沙库巴曲缬沙坦

D: 卡托普利

答案：B

43.用于低分子肝素过量时解救的药品是

A: 维生素K1

B: 氨甲环酸

C: 酚磺乙胺

D: 鱼精蛋白

答案：D

44.链霉素首选用于()

A: 鼠疫、土拉菌病

B: 钩端螺旋体病

C: 伤寒、副伤寒

D: 布鲁菌病

答案：A

45.（2017年真题）患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162mmHg，心率72次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A：氢氯噻嗪

B：双氯芬酸

C：特拉唑嗪

D：美托洛尔

答案：A

46.属于棘白菌素类的是

A：特比萘芬

B：制霉菌素

C：氟胞嘧啶

D：卡泊芬净

答案：D

47.（2017年真题）升高高密度脂蛋白胆固醇水平的（）

A：泛酸钙

B：维生素B2

C：烟酸

D：叶酸

答案：C

48.关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误是

A：可在身体同一部位给药

B：两类药不能混入同一容器内

C：治疗急性感染通常疗程不宜超过7～14日

D: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染

答案：A

49.氨基糖苷类抗菌药无效的是

A: 厌氧菌

B: 结核杆菌

C: 需氧革兰阴性菌

D: 铜绿假单胞菌

答案：A

50.患者,女52岁,因“闭经1年,潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊,临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为:戊酸雌二醇片,每日1次,每次1mg,醋酸甲羟孕酮片每日1次,每次2mg。

A: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

B: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状,但增加患糖尿病的风险

C: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定

D: 应在绝经后6年之内开始

答案：A

51.静脉滴注过快易发生红人综合征的是()

A: 万古霉素

B: 克林霉素

C: 阿奇霉素

D: 庆大霉素

答案：A

52.甲氧苄啶联用利福平使

A: 白细胞减少风险增加

B: 肾毒性增加

C: 抗凝作用增强

D: 半衰期缩短

答案：D

53.急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

A: 8小时内

B: 12小时内

C: 24小时内

D: 3小时内

答案：D

54.雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

A: 2

B: 6

C: 4

D: 8

答案：B

55.高血压伴有肾功能不全者最好选用

A: 卡托普利

B: 胍乙啶

C: 氢氯噻嗪

D: 利血平

答案：A

56.存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 吉西他滨

C: 泼尼松

D: 奥沙利铂

答案：A

57.主要用于糖尿病，特别是1型糖尿病的治疗的药物是()

A: 磺酰脲类

B: A和B均无效

C: 二甲双胍

D: 胰岛素

答案：D

58.以下不属于胰岛素不良反应的是

A: 高钾血症

B: 低血糖

C: 脂肪萎缩与肥厚

D: 皮下硬结

答案：A

59.属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

A: 炔雌醇

B: 他莫昔芬

C: 氟他胺

D: 阿那曲唑

答案：D

60.夜盲症患者应选用的维生素是

A: 维生素A

B: 维生素D

C: 维生素B

D: 维生素B

答案：A

61.下述药物中不可用于治疗疥疮的是

A: 硫黄软膏

B: 苯甲酸苄酯

C: 林旦霜

D: 过氧苯甲酰

答案：D

62.为避免引起大面积中毒性表皮坏死松解症，服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因（HLA-B*1502）检测的抗癫痫药是

A: 卡马西平

B: 氯硝西泮

C: 托吡酯

D: 丙戊酸钠

答案：A

63.属于促血小板生成药的是

A: 氨甲环酸

B: 艾曲泊帕乙醇胺

C: 酚磺乙胺

D: 甲萘氢醌

答案：B

64.用于降低眼内压的治疗方案是

A：一般采用50％葡萄糖注射液20～40ml，快速静脉注射

B：一般可给予10％～25％葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

C：应用高渗透压的25％-50％葡萄糖注射液滴注，常与20％甘露醇注射液联合应用

D：可予10％～25％葡萄糖注射液滴注，每日100g葡萄糖即可控制病情

答案：A

65.属于前列腺素FP受体激动剂的是

A：1%碘甘油

B：四环素

C：9%硼酸冰片滴耳液

D：曲伏前列素

答案：D

66.下列哪种疼痛不用吗啡治疗

A：癌性剧痛

B：神经压迫性疼痛

C：胆绞痛及肾绞痛

D：急性锐痛

答案：B

67.催眠药应()

A：睡前内服

B：定时内服

C：空腹内服

D：饭前内服

答案：A

68.缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

A：维生素C

B：维生素B12

C：铁剂

D：叶酸

答案：C

69.维生素K

A：抑制血小板聚集

B：促进四氢叶酸类辅酶的循环利用

C：促进纤溶

D：促进凝血因子合成

答案：D

70.属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A：左炔诺孕酮

B：黄体酮

C：米非司酮

D：甲地孕酮

答案：C

71.甲状腺素的合成需要()

A：蛋白水解酶

B：过氧化物酶

C：环氧化酶

D：碳酸酐酶

答案：B

72.具有双向作用，小剂时抑制骨吸收，大剂量时抑制骨形成的药物是()

A：阿仑膦酸钠

B：帕米膦酸二钠

C：氯屈膦酸二钠

D：依替膦酸二钠

答案：D

73.组胺H

A：西咪替丁＞雷尼替丁＞法莫替丁

B：雷尼替丁＞法莫替丁＞西咪替丁

C：法莫替丁＞雷尼替丁＞西咪替丁

D：雷尼替丁＞西咪替丁＞法莫替丁

答案：C

74.将乙胺丁醇与链霉素合用治疗结核病的目的是

A：阻止或延迟结核杆菌对链霉素产生耐药性

B：延长链霉素作用时间

C：延迟肾脏排泄链霉素

D：有利于药物进入结核感染病灶

答案：A

75.别嘌醇抗痛风的作用机制是

A：抑制粒细胞浸润和白细胞趋化

B：抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

C：抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸

D：可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素

答案：C

76.头孢唑林

A：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

C：用于非典型病原体感染

D：肾毒性较大

答案：D

77.三甲沙林属于

A：其他光敏剂

B：重金属元素及其化合物

C：补骨脂素及其衍生物

D：肾上腺皮质激类

答案：C

78.（2018年真题）阿哌沙班属于（）

A：环氧酶抑制剂

B：直接凝血酶抑制剂

C：维生素K拮抗剂

D：凝血因子X抑制剂

答案：D

79.患者，男，17岁。拔牙2天后出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈。12天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：T39℃，脉搏89次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音。实验室检查：WBC28×10

A：咳出的痰进行细胞培养

B：通过环甲膜穿刺吸取痰液，进行痰涂片和需氧、厌氧菌检查

C：痰细胞学检查

D：咳出的痰直接涂片

答案：B

80.NSAID镇痛抗炎的作用机制是

A：对抗前列腺素的作用

B：抑制MAO

C：减少前列腺素的释放

D：抑制环氧酶

答案：D

81.（2019年真题）易产生耐药性，极少单独用药，临床常与两性霉素B合用的抗真菌药物是（）

A：卡泊芬净

B：特比萘芬

C：氟胞嘧啶

D：氟康唑

答案：C

82.止吐方案：每日化疗前，联合应用5-HT

A：低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

B：微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

C：重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

D：中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：C

83.急性心梗死引起的急性室性心动过速可选用

A：美西律

B：利多卡因

C：阿托品

D：硝苯地平

答案：B

84.严重肝病时应减量慎用、肾功能减退时可按原治疗量使用的是

A：红霉素

B：氟胞嘧啶

C：异烟肼

D：青霉素

答案：A

85.细胞膜的重要组分，协调磷脂和细胞膜功能的是

A：异甘草酸镁

B：还原型谷胱甘肽

C：双环醇

D：多烯磷脂酰胆碱

答案：D

86.主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

A：利巴韦林

B：更昔洛韦

C：拉米夫定

D：阿德福韦酯

答案：A

87.属于抑酸药的是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/008073123045007022