

2022 年江西省成考（专升本）大学医学综合考试原题

一、单选题

1、二尖瓣关闭不全典型的体征是（）

- (A)心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音
- (B)胸骨左缘第 2 肋间闻及 GrahamStell 杂音
- (C)心尖部闻及舒张中期杂音
- (D)胸骨左缘第 3 肋间闻及收缩期粗糙杂音
- (E)胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性杂音

2、防止子宫脱垂的主要结构是()

- (A)子宫圆韧带
- (B)子宫主韧带
- (C)子宫阔韧带
- (D)子宫骶韧带

3、注入乳糜池的淋巴干是（）

- (A)左颈干
- (B)右锁骨下干
- (C)左锁骨下干
- (D)右颈干
- (E)肠干

4、动作电位到达神经末梢，引起的与末梢膜释放递质有关的离子流是【】

- (A) K^+ 内流
- (B) Cl^- 内流
- (C) Na^+ 内流

(D) Ca^{2+} 内流

(E) Mg^{2+} 外流

5、测量血压时舒张压的判定为 ()

(A) 听到声音变短促前的压力

(B) 听到柔和吹风样杂音时的压力

(C) 听到响亮拍击音时的压力

(D) 拍击音重新出现时的压力

(E) 声音消失时的压力

6、下列不属于急性上消化道出血临床表现的是 ()

(A) 上腹部压痛阳性

(B) 柏油便

(C) 呕吐咖啡样物质

(D) 听诊肠鸣音活跃

(E) 可出现头晕、心悸

7、可引起心率减慢的调节因素是 【】

(A) 迷走活动增强

(B) 交感活动增强

(C) 肾上腺素增多

(D) 甲状腺激素增多

(E) 血管紧张素增多

8、符合诊断急性呼吸窘迫综合征指标的是 ()

(A) $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200 \text{mmHg}$

(B) 一般吸氧治疗无效

(C)胸片显示有广泛点、片状阴影

(D)双肺可闻及湿啰音

(E)呼吸频率逐渐加快

9、上肢较为恒定的浅静脉有 ()

(A)桡静脉

(B)贵要静脉

(C)肱静脉

(D)头静脉

(E)尺静脉

10、住院病历中现病史的内容且包括 ()

(A)症状的性质

(B)诊治经过

(C)主要症状

(D)伴随症状

(E)诱发因素

11、下列属于内耳结构的是【】

(A) 鼓室

(B) 鼓膜

(C) 乳突小房

(D) 咽鼓管

(E) 耳蜗

12、第 2~4 手指不能内收与外展，可能损伤的神经是 ()

(A)肌皮神经

- (B)正中神经
- (C)尺神经
- (D)桡神经
- (E)腋神经

13、正常成年人代谢率最低的情况见于【】

- (A)清醒平卧
- (B)熟睡
- (C)闭目思考
- (D)深呼吸
- (E)餐前半小时

14、休克早期，中心静脉压和血压低的原因是【】

- (A)动静脉短路大量开放
- (B)心力衰竭
- (C)血容量不足
- (D)血容量相对过多
- (E)容量血管过度收缩

15、符合诊断急性呼吸窘迫综合征指标的是（）

- (A) $PaO_2/FiO_2 \leq 200$ mmHg
- (B)一般吸氧治疗无效
- (C)胸片显示有广泛点、片状阴影
- (D)双肺可闻及湿啰音
- (E)呼吸频率逐渐加快

16、可做向前和向后运动的关节是（）

- (A)踝关节
- (B)肘关节
- (C)桡腕关节
- (D)肩关节
- (E)颞下颌关节

17、运动时产热量最大的器官是（）

- (A)皮肤
- (B)骨骼肌
- (C)心脏
- (D)肝脏
- (E)大脑

18、下列属于肠系膜下动脉分支的是【】

- (A)回结肠动脉
- (B)右结肠动脉
- (C)左结肠动脉
- (D)中结肠动脉
- (E)空肠动脉

19、女，62岁。诊断为胃癌。查体：血压：150/100mmHg，消瘦，重度贫血。下列术前准备中，不必要的项目是()

- (A)纠正贫血
- (B)血压降至正常
- (C)检测肝功能
- (D)改善营养状态

20、与组织液中含量基本相同的血浆成分是（）

- (A)球蛋白
- (B)纤维蛋白原
- (C)清蛋白
- (D)透明质酸
- (E)电解质

21、卵巢动脉的起始部位是（）

- (A)髂内动脉
- (B)腹主动脉
- (C)髂外动脉
- (D)子宫动脉
- (E)肾动脉

22、不属于肝门静脉属支的是（）

- (A)肝静脉
- (B)肠系膜上静脉
- (C)胆囊静脉
- (D)脾静脉
- (E)附脐静脉

23、冠状动脉的起始部位是()

- (A)左心室
- (B)主动脉弓
- (C)胸主动脉
- (D)升主动脉

24、某患者误输异型血后无尿 3 天。测血压正常。最有效的治疗是【】

- (A) 输注地塞米松
- (B) 输注碳酸氢钠
- (C) 输注甘露醇
- (D) 血液透析
- (E) 输注速尿

25、腹部九分法脾的位置在()

- (A) 上腹部
- (B) 中腹部
- (C) 右季肋部
- (D) 左季肋部

26、女，32 岁。低热、盗汗、腹胀 2 个月。腹水检查结果：比重 1.018，蛋白 27g/L，

WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）

- (A) 结核性腹膜炎
- (B) 化脓性腹膜炎
- (C) 肝硬化腹水
- (D) 恶性腹水
- (E) 自发性细菌性腹膜炎

27、甲状腺癌患者检查最常见的是（）

- (A) 甲状腺肿大可触及震颤
- (B) 甲状腺多发结节伴触痛
- (C) 甲状腺包块伴波动感
- (D) 甲状腺包块不规则、质硬

(E) 甲状腺肿大并可触及颈动脉搏动

28、钠泵活动最重要的生理意义是【】

- (A) 储备势能
- (B) 调节 ATP 分解量
- (C) 维持完整细胞结构
- (D) 维持细胞外液高钾
- (E) 维持细胞外液高钙

29、可使氧解离曲线左移的情况是()

- (A) 血 pH 降低
- (B) 组织温度升高
- (C) 血二氧化碳分压降低
- (D) 2, 3-二磷酸甘油酸浓度升高

30、对糖、脂肪和蛋白质均有消化作用的消化液是（）

- (A) 小肠液
- (B) 胆汁
- (C) 胃液
- (D) 唾液
- (E) 胰液

31、属于腹膜内位器官的是()

- (A) 横结肠
- (B) 直肠
- (C) 降结肠
- (D) 升结肠

32、腭扁桃体所在的位置是()

- (A)鼻咽侧壁
- (B)喉咽侧壁
- (C)口咽侧壁
- (D)喉前庭侧壁

33、不属于机体内环境的体液是（）

- (A)淋巴液
- (B)组织液
- (C)血浆
- (D)脑脊液
- (E)细胞内液

34、有助于鉴别肾前性和肾后性急性肾衰竭的检查是（）

- (A)肾穿刺活检
- (B)血常规
- (C)血尿素氮和肌酐
- (D)磁共振水成像
- (E)每小时尿量

35、正常时激活膀胱壁牵张感受器的膀胱内尿量最小范围是（）

- (A)200~300mL
- (B)800~900mL
- (C)600~700mL
- (D)400~500mL

(E)1000~1100mL

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008125137051006050>