

2025 主治医师《整形外科》专业知识考试题与答案解析

第 1 题：

男性，55 岁。右腹股沟部有一球形包块 2 年余。近 2 个月以来包块逐渐增大，站立时即刻出现，平卧时自行消退。查体：右腹股沟部内侧及耻骨结节外上方有一球形包块，未进入阴囊，可用手还纳，咳嗽时有膨胀性冲击感，压迫内环试验阴性。

手术治疗的术式宜选择

- A. Bassini 法
- B. McVay 法
- C. Ferguson 法
- D. Shouldice 法
- E. 疝囊切除高位结扎术

【正确答案】： B

第 2 题：

男性，5 岁。双眼平视前方时上睑缘位于瞳孔上缘的稍下方。查体：上直肌功能正常，上睑缘上提的幅度为 6mm。

如手术治疗，时机应选择在

- A. 现在
- B. 7 岁
- C. 10 岁

D. 青春期

E. 成年后

【正确答案】： A

【试题解析】：

5. 正常睑缘在平视时应位于角膜上缘下 1cm，手术行上睑下垂矫正应轻度矫枉过正，位置稍高于正常睑缘平面，一般刚好位于角膜上缘与之平齐。这样术后睑缘轻度回落后可达到正常理想的水平。

第 3 题：

国际抗癌联盟(UICC)的肝癌 TNM 分期，下列不正确的是

A. IVB 期： T[1~4.gif]N[0~1.gif]M[1.gif]

B. I 期： T[1.gif]N[0.gif]M[0.gif]

C. IV[A.gif]期： T[3.gif]N[0.gif]M[0.gif]

D. II 期： T[2.gif]N[0.gif]M[0.gif]

E. III期： T[1.gif]N[1.gif]M[0.gif]，
T[2.gif]N[1.gif]M[0.gif]， T[3.gif]N[1~2.gif]M[0.gif]

【正确答案】： C

第 4 题：

下列检查，哪一项对上消化道大出血不具诊断意义

A. 三腔双囊管检查

B. CT 平扫检查

C. 选择性血管造影

D. X 线钡餐检查

E. 纤维内镜检查

【正确答案】： B

【试题解析】：

CT 平扫对上消化道大出血不具诊断价值，增强扫描可明确出血部位，特别是对胆道出血，

可明确出血的部位和病因。

第 5 题：

男性，30 岁。右前臂尺侧切割伤，右手呈爪状畸形。临床诊断尺神经损伤。有关尺神经损伤的诊断和治疗，错误的是

- A. 肘上部尺神经损伤者较肘下部损伤者爪状畸形重
- B. 拇指示指夹纸试验时需注意检查方法，有时因拇深屈肌腱的影响可出现阴性检查结果
- C. 尺神经中感觉与运动纤维相当，缝合时尤需准确对位，不可有旋转
- D. 为了获得足够长度以利吻合，可将尺神经移至肘前
- E. 若神经吻合后功能恢复不佳，可将中指及环指指浅屈肌腱转移重建骨间肌与蚓状肌功能

【正确答案】： A

【试题解析】：

肘上部尺神经受损者，由于环指及小指的指深屈肌同时瘫痪，指间关节不呈屈曲状，不能表现为典型的爪状。而在肘下部损伤者，指深屈肌尺侧半的功能正常，小指及环指呈现为掌指关节过伸，指间关节屈曲，不能在屈掌指关节的同时伸指间关节而呈典型的爪状，故 A 错误。

第 6 题：

男性，20 岁。右下睑睑腺炎感染破溃，自行愈合后导致右下睑轻度外翻，1 年后症状未见好转。可诊断为

- A. 痉挛性睑外翻
- B. 瘢痕性睑外翻
- C. 麻痹性睑外翻
- D. 老年性睑外翻
- E. 先天性睑外翻

【正确答案】： B

第 7 题：

划分甲状腺癌高危或低危的主要因素

- A. 肿瘤大小
- B. 病理类型
- C. 有无远处转移
- D. 年龄
- E. 有无颈淋巴结转移

【正确答案】： D

第 8 题：

男性，35 岁，体重 60kg。双上肢、躯干、双臀、会阴部被硫酸烧伤。 患者的烧伤面积为

- A. 60%
- B. 40%

C. 50%

D. 25%

E. 30%

【正确答案】： C

第 9 题：

男性，30 岁。车祸致右小腿胫腓骨骨折。入院行闭合复位石膏外固定，3 个月后去除外固定。复查 X 线片见骨折已经愈合。但经 4 周功能锻炼，膝关节功能恢复不佳。可能的原因是

A. 关节僵硬

B. 创伤性关节炎

C. 损伤性骨化

D. 缺血性骨坏死

E. 缺血性肌痉挛

【正确答案】： A

【试题解析】：

骨折后，邻近的关节经过长期固定，容易造成关节韧带、关节囊等软组织挛缩，关节僵硬，称为骨折病。

第 10 题：

小脑幕切迹疝出现患侧瞳孔散大，是由于患侧哪一支颅神经受压

A. 动眼神经

B. 外展神经

C. 滑车神经

D. 视神经

E. 三叉神经

【正确答案】： A

第 11 题：

以下外科情况中，不需要输血的是

A. 严重烧伤

B. 大手术出血

C. 出血性疾病

D. 体质消瘦

E. 脓毒血症

【正确答案】： D

第 12 题：

下列属于外科特异性感染的是

A. 金黄色葡萄球菌感染

B. 变形杆菌感染

C. 铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）感染

D. 链球菌感染

E. 破伤风杆菌感染

【正确答案】： E

【试题解析】：

外科按病菌种类和病变性质分为非特异性感染和特异性感染。非特异性感染又称化脓性感

染或一般感染，常见致病菌为葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌、

克雷伯菌、拟杆菌。特异性感染，如结核病、破伤风、气性坏疽，它们的致病菌、病程演

变和防治方法，都与非特异性感染不同。

第 13 题：

女性，45 岁。患十二指肠球部溃疡 5 年，近半个月来上腹胀痛，间断性呕吐。查体：上腹部膨隆，有振水

音。临床诊断十二指肠球部溃疡并幽门梗阻。目前，治疗措施宜采取

- A. 胃肠减压，补液
- B. 胃肠减压，补液，洗胃
- C. 急诊胃大部切除
- D. 胃肠减压，补液，洗胃，择期行胃大部切除术
- E. 胃肠减压，补液，洗胃，择期行胃空肠吻合术

【正确答案】： D

【试题解析】：

消化性溃疡并幽门梗阻的处理原则是先纠正体液代谢紊乱，洗胃使胃壁水肿减轻，择期施行胃大部切除术。

第 14 题：

下述哪些现象不是晚期乳腺癌的表现

- A. 乳房及周围有广泛的皮肤水肿
- B. 患侧手臂水肿
- C. 锁骨上淋巴结转移
- D. 患侧腋下多个淋巴结肿大
- E. 炎性癌

【正确答案】： D

【试题解析】：

乳房及周围有广泛的皮肤水肿，说明乳腺癌与皮肤广泛粘连，皮肤呈“橘皮样”改变，为晚

期乳腺癌的特征。患侧手臂水肿是由于癌细胞堵塞腋窝主要的淋巴管，引起该侧手臂淋巴

回流障碍。锁骨上淋巴结肿大，是晚期乳腺癌的表现。炎性癌恶性程度高，出现症状即为

晚期癌。

第 15 题：

对医学伦理学中不伤害原则的正确理解是

- A. 避免精神伤害
- B. 避免技术伤害
- C. 避免任何伤害
- D. 避免责任伤害

【正确答案】： C

第 16 题：

水、电解质和酸碱平衡失调临床处理的基本原则中，错误的是

- A. 充分掌握病史，详细检查患者体征
- B. 即刻实验室检查
- C. 确定水、电解质和酸碱平衡失调的类型及程度
- D. 积极治疗原发病的同时，制订纠正水、电解质和酸碱平衡失调的治疗方案
- E. 严格按照体液代谢失调相关计算公式计算出的需要量来进行治疗

【正确答案】： E

【试题解析】：

绝对依靠任何公式决定补充水、电解质和酸碱需要量的做法是不可取的，公式仅作为补充

安全剂量的估计，一般只输入计算量的 1 / 2，然后再根据临床表现和实验室复查结果酌情

进行调整。如果将计算的水、电解质和酸碱需要量全部输入，则可能导致不良后果。

第 17 题：

男性，20 岁。右上臂刀刺伤后出现右手对掌困难，拇指和示、中指屈曲功能障碍。

若神经功能恢复不良，远期右手可能表现的畸形是

- A. 猿手畸形
- B. 爪形手畸形
- C. 锅铲畸形

D. 锤状指畸形

E. 鹅颈畸形

【正确答案】： A

第 18 题：

在创伤诊断的注意事项中，下列错误的是

A. 发现危重情况应立即抢救，不能因检查而耽误时机

B. 问病史和体格检查可同时进行，步骤应简捷

C. 体格检查应程序化，做到全面而突出重点

D. 诊断不清者应严密观察，动态对伤情进行评估

E. 接收成批伤员时对大声呻吟者要特别关注

【正确答案】： E

【试题解析】：

接受批量伤员进行检伤分类时，往往大声呼喊、呻吟者可能伤情并不严重，而一些因窒

息、昏迷、休克而无法呼救的“沉默者”，则是需要我们优先采取紧急救治措施者。因此，

不可忽视不出声者。

第 19 题：

女性，28 岁。地震时被砖墙砸压致骨盆骨折，右下肢软组织广泛撕裂剥脱伤伴休克。救出后立即补液抗休

克并紧急施行清创术。术后对患者的监测中，最能反映休克治疗效果的指标是

A. 精神状态

B. 皮肤温度

C. 脉率

D. 血压

E. 尿量

【正确答案】： E

【试题解析】：

尿量是反映肾血流灌注情况的指标。尿少通常是休克复苏不完全的表现，应留置导尿管观

察每小时尿量。尿量 $<20\text{ml/h}$ 、比重增加者表明仍存在肾血管收缩和供血量不足；当尿量

维持在 30ml/h 以上时，表明休克已得到纠正；血压正常但尿量仍少且比重偏低者，提示

有急性肾衰竭可能。

第 20 题：

有关肌腱粘连松解术的叙述，下列哪项是错误的

A. 作锐性分离粘连，而不用肌腱剥离

B. 手术一周后开始练习指屈伸活动

C. 松解愈彻底愈好

D. 全部暴露前次手术区，彻底切除瘢痕

E. 一般在术后 3--6 个月再施探查

【正确答案】： B

第 21 题：

下列关于指（趾）甲缺损的治疗，不正确的是

- A. 指（趾）甲与其他表皮组织相同，具有可移植性
- B. 指（趾）甲移植可用于指甲缺损的修复
- C. 指（趾）甲的生长和增长源于甲床
- D. 甲床部发生毁损时，则指（趾）甲增长缓慢，凹凸不平，漂浮变形
- E. 当甲根部受到破坏时，指（趾）甲的生长停止

【正确答案】： C

第 22 题：

在第二次世界大战期间，德国纳粹和日本军国主义者强行用战俘、妇女、儿童和犹太人做医学试验。这一

行为正确的伦理判断是（ ）

- A. 该行为虽然偏离了医学科研的正确方向，但也为医学研究积累了一定的经验
- B. 该研究是当时战争时期的特殊需要
- C. 该行为违背了医学科研的根本目的
- D. 参加试验的医学工作者也是迫于无奈，不得已而为之
- E. 该研究是为了增进医学对人体的了解

【正确答案】： C

第 23 题：

最适合用包扎疗法的是

- A. 肉芽创面术前准备

- B. 四肢浅Ⅱ度烧伤
- C. 深度大面积烧伤
- D. 颜面部深Ⅱ度烧伤
- E. 以上都可以

【正确答案】： B

第 24 题：

男性，65 岁。右上腹痛伴发热 9 天。超声检查：肝右叶见一大小约 7cm?cm 的低回声区，边缘厚而不齐，

边界模糊，后方增强效应明显，膈肌运动减弱，右胸腔内见“新月状”无回声区。最可能的诊断是

- A. 肝包虫病
- B. 肝囊肿并出血
- C. 肝实质内血肿
- D. 肝结核
- E. 肝脓肿

【正确答案】： E

第 25 题：

结肠癌的 TNM 分期中，不正确的是

- A. T[1.gif]肿瘤侵及黏膜下层
- B. T[is.gif]和 Tx 早期癌和原发癌
- C. T[3.gif]肿瘤穿透肌层至浆膜下或侵及无腹膜覆盖的结肠或直肠周围组织

D. T[4. gif]肿瘤穿透脏层腹膜或直接侵犯其他脏器或组织

E. T 肿瘤侵及固有肌层

【正确答案】： B

第 26 题：

下列哪项不是正中神经低位损伤的体征

A. 不能握拳和内旋

B. 虎口不能张开，对掌功能障碍

C. 猿手畸形

D. 感觉障碍为整个小指及环指尺侧半

E. 大鱼际肌萎缩

【正确答案】： D

【试题解析】：

整个小指及环指尺侧半感觉障碍是尺神经损伤的表现。

第 27 题：

男性，20 岁，高空作业时不慎坠下，半空中左腰部受钢管阻拦后身体落地，查神清，面色苍白，四肢厥

冷，心率 130 次 / 分，血压 70/50mmHg，左腰部局部隆起，皮下见大片淤斑，插入尿管，尿色清，超声提

示左肾周围大量血凝块，诊断考虑

A. 肾挫伤

B. 肾部分裂伤

C. 肾全层裂伤

D. 肾蒂损伤

E. 皮下组织大面积损伤

【正确答案】： D

【试题解析】：

肾蒂损伤时血尿程度与出血程度不相符，因肾血管受损，伤肾无灌注，无尿生成，膀胱内

尿液为对侧肾产生，可无肉眼血尿，但出血很严重。

第 28 题：

急性化脓性感染在出现脓肿前需早期切开的是

A. 疖

B. 痈

C. 脓性指头炎

D. 急性蜂窝织炎

E. 丹毒

【正确答案】： C

第 29 题：

女性，44 岁。临床诊断慢性肾衰竭尿毒症期，拟行同种异体肾移植手术。经组织配型检查发现患者

PRA55%。

PRA 应降为多少后方适合肾移植术

A. 30%～40%

B. 20%～30%

C. <10%

D. 40%～50%

E. 10%～20%

【正确答案】： C

第 30 题：

骨肉瘤 X 线检查的影像学特征是

A. 可见于骨端

B. 可见于短管状骨

C. 可见“日光照射”现象

D. 可见膨胀性生长

E. 可见与正常组织界限清楚

【正确答案】： C

【试题解析】：

骨肉瘤的 X 线检查可有不同的特征性表现，主要表现为成骨性的骨硬化灶或溶骨性的破

坏，骨膜反应可见“Codman 三角”或呈“日光照射”现象。

第 31 题：

围手术期的术中处理，不包括

A. 术中可能发生意外的认识和防治

B. 无菌技术

C. 重要器官功能的监护

D. 特殊手术器械准备

E. 麻醉保障

【正确答案】： D

第 32 题：

男性，40 岁，不慎从高空坠地后出现呼吸困难、发绀、出冷汗。体格检查：心率 110 次 / 分，血压 9 / 6kPa

(68/45mmHg)，气管左偏，颈部广泛皮下气肿，右胸廓饱满，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。

在该病人疾病发展的病理生理改变中，不会出现

A. 右胸的压力超过 1.0132?0[~5. gif]Pa（1 大气压）

B. 低氧血症

C. 纵隔摆动

D. 休克

E. 心脏的静脉回流受阻

【正确答案】： C

第 33 题：

男性，53 岁，夏季开水烫伤右腿前侧为 7%浅 II 度和深 II 度。

创面清创时宜用

A. 1‰苯扎溴铵（新洁尔灭）液

B. 洁尔灭酊

C. 75%酒精

D. 2%碘酒

E. 1%碘伏

【正确答案】： A

第 34 题：

烧伤休克期微血管变化经过

A. 微血管收缩到痉挛到扩张

B. 微血管痉挛到扩张到痉挛

C. 微血管麻痹到扩张到痉挛

D. 微血管痉挛到扩张到麻痹

E. 微血管痉挛到变性到扩张

【正确答案】： D

【试题解析】：

一般情况下，烧伤后微血管变化可经过 3 个过程，即从微血管痉挛到微血管扩张到血管麻

痹。

第 35 题：

乳癌改良根治术中损伤了胸长神经，患侧肢体会出现

A. 胸大肌外侧萎缩

B. 上臂后内侧皮肤麻木

C. 前锯肌瘫痪，翼状肩胛

D. 前臂内旋、外展无力

E. 胸小肌萎缩

【正确答案】： C

第 36 题：

下列哪个间隙椎间盘突出能使跟腱反射改变

A. L[2. gif]～L[3. gif]

B. L[3. gif]～L[4. gif]

C. L[4. gif]～L[5. gif]

D. L[5. gif]～S[1. gif]

E. S[1. gif]～S[2. gif]

【正确答案】： D

【试题解析】：

跟腱反射受 S[1. gif]神经根支配，L[5. gif]S[1. gif]间盘突出压迫 S[1. gif]神经根，跟腱反射多改变。

第 37 题：

下列急性脓胸的治疗措施中， 错误的是

A. 抗生素治疗

B. 全身支持治疗

C. 胸膜腔穿刺抽脓

D. 闭式胸膜腔引流术

E. 脓胸开放引流

【正确答案】： E

【试题解析】：

急性脓胸时胸膜腔尚未粘连，纵隔尚不固定，此时开放引流可发生开放性气胸，出现呼

吸、循环功能紊乱。

第 38 题：

女性，45 岁，甲状腺肿大数年，检查发现甲状腺弥漫性肿大，表面颗粒状，质中偏硬。

假如病人因甲状腺肿大而出现呼吸困难时，选用哪一种治疗方法较好

- A. 气管插管
- B. 气管切开
- C. 鼻管氧吸入
- D. 两侧甲状腺大部切除
- E. 甲状腺峡部切除

【正确答案】： E

第 39 题：

下列急性肝衰竭的治疗措施，错误的是

- A. 输氨基酸和脂肪乳剂
- B. 输新鲜血、血浆和血清白蛋白
- C. 纠正体液代谢失调，有效控制感染
- D. 人工肝辅助治疗或肝移植口服乳果糖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015103344043012112>