

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 临床医学相关知识考试试题库与答案

1、在 CT 横断面上肝内门静脉与肝静脉的鉴别点，下述哪项是错误的（ ）

- A、肝静脉与门静脉走行相反
- B、肝静脉在肝叶间或段间走行，而肝门静脉分支则出现于叶内或段内
- C、门静脉属支多较直，而肝静脉分支多弯曲或具有多种形状
- D、肝静脉越近膈肌其口径越大
- E、门静脉越近肝门其口径越大

答案：C

2、下列抗凝剂使用方法中，正确的是（ ）

- A、血液分析使用枸橼酸钠溶液抗凝，抗凝剂与血液的比例为 1：4
- B、血细胞比容使用枸橼酸钠溶液抗凝，抗凝剂与血液的比例为 1：9
- C、血沉使用枸橼酸钠溶液抗凝，抗凝剂与血液的比例为 1：9
- D、血沉使用枸橼酸钠溶液抗凝，抗凝剂与血液的比例为 1：4
- E、血细胞比容使用枸橼酸钠溶液抗凝，抗凝剂与血液的比例为 1：4

答案：D

3、动脉导管未闭与室间隔缺损的鉴别诊断要点是（ ）

- A、左心室扩大
- B、右心室扩大
- C、左心房扩大
- D、肺血增加
- E、主动脉扩张

答案：E

4、急性化脓性骨髓炎的主要 X 线表现为（ ）

- A、骨膜增生
- B、骨质破坏
- C、死骨形成
- D、新生骨
- E、出现钙化

答案：B

5、骨骼的声速与下列最接近的是（ ）

- A、150m/s
- B、300m/s
- C、1500m/s
- D、2000m/s
- E、3000m/s

答案：E

6、动脉导管未闭的左向右分流，超声表现的特征是（ ）

- A、主动脉向降主动脉的收缩期分流
- B、降主动脉向主肺动脉的收缩期分流
- C、主动脉向肺动脉的双期分流，舒张期明显小于收缩期
- D、降主动脉向肺动脉的双期分流
- E、肺动脉向降主动脉的舒张期分流

答案：D

7、下列属于急性髓系白血病免疫标记的是（ ）

- A、CD19
- B、CD22
- C、CD3
- D、HLA-DR
- E、CD117

答案：E

8、妊娠期超声检查的适应证是：①诊断妊娠；②确定胎位；③预测胎龄；

④判断多胎、异位妊娠（ ）

- A、①③
- B、①②④
- C、①②③
- D、①②③④
- E、①③④

答案：D

9、关于腹膜后间隙及其结构，下列错误的是（ ）

- A、升、降结肠后壁在后腹膜内
- B、胰腺前缘较高回声线是后腹膜
- C、肾脏是位于腹膜后间隙的器官
- D、腰大肌前方的高回声线为后腹膜
- E、腹腔动脉及其相邻结构位于腹膜后

答案：A

10、下列关于先天性肾上腺皮质增生症的叙述正确的是（ ）

- A、不会遗传给下一代
- B、血 ACTH 减少
- C、多伴有肾上腺性激素分泌减少
- D、血 CRH 减少

E、多表现为性征异常

答案：E

11、正常肝脏超声表现，错误的是（ ）

- A、中等回声
- B、光点细小，分布均匀
- C、肝内门静脉、肝静脉显示清晰
- D、门静脉为离肝血流
- E、肝静脉为离肝血流

答案：D

12、关于阴囊解剖的描述，不正确的是（ ）

- A、阴囊为一囊袋状结构
- B、阴囊壁由皮肤、肉膜及肌肉等组成
- C、阴囊中隔将阴囊分成左、右两囊
- D、每侧阴囊内有睾丸、附睾等组成
- E、鞘膜腔内无液体

答案：E

13、对镜面反射体而言（ ）

- A、入射角等于反射角
- B、入射角大于反射角
- C、与声束的角度无关
- D、入射角等于透射角
- E、入射角大于折射角

答案：A

14、低浓度顺磁性造影剂对质子弛豫时间的影响为（ ）

- A、T1 缩短，T2 改变不大
- B、T1 缩短，T2 延长
- C、T1 延长，T2 缩短
- D、T1 缩短，T2 缩短
- E、T1 延长，T2 延长

答案：A

15、引起囊性结构后方回声增强的原因是（ ）

- A、囊性结构的圆形所致
- B、在实性组织和在囊液中声波衰减不同所致
- C、在实性组织和在囊液中声波速度不同所致
- D、囊壁的声波衰减极高所致

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015230124242011221>