

2024 年福建省寿宁县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题大全附参考答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 治疗 MRSA 的首选药物是

- A: 青霉素
- B: 万古霉素
- C: 林可霉素
- D: 四环素

答案：B

2. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

- A: 曲妥珠单抗
- B: 贝伐单抗
- C: 利妥昔单抗
- D: 西妥昔单抗

答案：C

3. 以上药物镇咳作用与可待因相当且没有镇痛作用的是

- A: 可待因
- B: 喷托维林
- C: 吗啡
- D: 右美沙芬

答案：D

4. (2018 年真题) 长期大剂量使用, 会降低阿司匹林对心血管的保护作用, 应避免合用的药物是 ()

- A: 布洛芬
- B: 贝那普利
- C: 格列齐特
- D: 阿托伐他汀

答案: A

5. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸 (18AA)
- C: 复方氨基酸注射液 (3AA)
- D: 精氨酸

答案: D

6. 使用环磷酰胺化疗, 以下检查结果可能升高的是

- A: 血小板计数
- B: 白细胞计数
- C: 血红蛋白
- D: 血尿酸

答案: D

7. (2015 年真题) 阿片类镇痛药与阿托品合用, 可抑制胃肠蠕动, 导致的不良反应是 ()。

- A: 躁狂
- B: 便秘
- C: 低血压
- D: 胆绞痛

答案：B

8. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 炔雌醇
- B: 甲羟孕酮和炔雌醇
- C: 去氧孕烯
- D: 维生素 B6

答案：B

9. 选择性舒张脑血管的药物是

- A: 氟桂利嗪
- B: 地尔硫革
- C: 维拉帕米
- D: 硝苯地平

答案：A

10. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

- A: 福尔可定
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 苯丙哌林

答案：D

11. 以下药物中，易被胃酸破坏的是

- A: 阿奇霉素
- B: 克拉霉素
- C: 罗红霉素

D: 红霉素

答案: D

12. 属于第四代喹诺酮类药物的是

A: 萘啶酸

B: 吡哌酸

C: 莫西沙星

D: 诺氟沙星

答案: C

13. (2018 年真题) 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是 ()

A: 拉坦前列素

B: 毛果芸香碱

C: 地匹福林

D: 噻吗洛尔

答案: C

14. 对铜绿假单胞菌感染无效的抗生素是

A: 头孢噻肟

B: 头孢他啶

C: 头孢克洛

D: 头孢曲松

答案: C

15. 良性前列腺增生药物治疗的短期目标是

A: 延缓疾病临床进展

B: 预防急性尿潴留

C: 缓解患者的上尿路症状

D: 缓解患者的下尿路症状

答案: D

16. 磷霉素最常见的不良反应是

A: 血小板减少

B: 黄疸

C: 腹部不适

D: 静脉炎

答案: C

17. 易引起刺激性干咳的抗高血压药是()

A: 卡托普利

B: 厄贝沙坦

C: 阿托伐他汀

D: 非洛地平

答案: A

18. 属于磷酸二酯酶抑制剂的是

A: 双嘧达莫

B: 替格瑞洛

C: 阿司匹林

D: 乙酰唑胺

答案: A

19. 使淋巴细胞溶解，致淋巴细胞耗竭

A: 地塞米松

B: 亚叶酸钙

C: 氟他胺

D: 昂丹司琼

答案: A

20. (2015 年真题) 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是 ()。

A: 更昔洛韦滴眼液

B: 四环素可的松滴眼液

C: 碘苷滴眼液

D: 利巴韦林滴眼液

答案: B

21. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是

A: 甲氨蝶呤

B: 巯嘌呤

C: 长春瑞滨

D: 吉西他滨

答案: B

22. 常作为根除幽门螺杆菌治疗的抗菌药物之一的是

A: 红霉素

B: 克拉霉素

C: 万古霉素

D: 克林霉素

答案: B

23. 患者,男,60 岁诊断为房性心律失常,医生给予胺碘酮治疗。近日,因胃溃疡开始用西咪替丁,出现窦性心动过缓症状。合用西咪替丁,出现窦性心动过缓,原因 ()

A: 西咪替丁抑制 CYP1A2, 升高胺碘酮血浆药物浓度

- B: 西咪替丁抑制 CYP3A4, 升高胺碘酮血浆药物浓度
- C: 西咪替丁诱导 CYP2C9, 升高胺碘酮血浆药物浓度
- D: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19, 减慢胺碘酮的代谢

答案: B

24. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

- A: 5-氟尿嘧啶
- B: 吉非替尼
- C: 多柔比星
- D: 环磷酰胺

答案: A

25. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐单抗
- C: 英夫利昔单抗
- D: 利妥昔单抗

答案: D

26. 依普黄酮可用于

- A: 儿童及青少年
- B: 绝经期超过 2 年以上的妇女
- C: 妊娠期及哺乳期妇女
- D: 低钙血症者

答案: B

27. 促进钙剂吸收可选用

- A: 依降钙素

B: 阿伦膦酸钠

C: 阿法骨化醇

D: 葡萄糖酸钙

答案: C

28. 服用异烟肼进行抗结核治疗的患者,为预防周围神经炎,应补充的维生素是 ()

A: 维生素 B2

B: 维生素 B6

C: 维生素 A

D: 维生素

答案: B

29. 作用于 γ -氨基丁酸受体的药物是

A: 苯妥英钠

B: 佐匹克隆

C: 苯巴比妥

D: 卡马西平

答案: B

30. (2016 年真题) 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

A: 二磷酸果糖

B: 三磷酸腺苷

C: 葡萄糖

D: 碳酸钙

答案: C

31. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为

- A: 阿托品
- B: 右旋糖酐
- C: 糖皮质激素
- D: 酚妥拉明

答案：C

32. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

- A: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量
- B: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量
- C: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药
- D: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量

答案：A

33. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

- A: 磺胺米隆
- B: 磺胺嘧啶
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺甲噁唑

答案：C

34. (2016 年真题) 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 阿昔莫司
- B: 阿托伐他汀
- C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案: C

35. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染宜首选的抗菌药物是()。

A: 头孢他啶

B: 头孢曲松

C: 罗红霉素

D: 利奈唑胺

答案: D

36. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A: 伐地那非

B: 丙酸睾酮

C: 坎利酮

D: 呋塞米

答案: A

37. (2020 年真题) 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不全者，宜选用的糖皮质激素是

A: 泼尼松

B: 可的松

C: 氟替卡松

D: 泼尼松龙

答案: D

38. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 老年高血压患者一般首选 β 受体阻断剂
- B: 长期应用者突然停药可发生反跳现象
- C: 作为一级预防，降低心肌梗死死亡率
- D: 糖脂代谢异常时首选 β 受体阻断剂

答案：B

39. 长期或大剂量使用质子泵抑制剂可导致的不良反应是

- A: 髌骨、腕骨骨折
- B: 呃逆、腹胀
- C: 血浆泌乳素升高
- D: 腹泻

答案：A

40. 关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

- A: 口服吸收很少
- B: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者
- C: 易导致低血糖
- D: 临床用于各型糖尿病

答案：C

41. 茶碱浓度 15-20ug/ml 时可出现

- A: 恶心、呕吐、失眠
- B: 呼吸、心跳停止
- C: 心动过速、心律失常
- D: 为有效的治疗浓度

答案：A

42. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

- A: 血氯
- B: 血钙
- C: 血钾
- D: 血钠

答案：C

43. 氨基苷类通过下列哪种屏障比较容易

- A: 血睾屏障
- B: 黏液屏障
- C: 胎盘屏障
- D: 血脑屏障

答案：C

44. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是()

- A: 典型不良反应为骨髓抑制和心脏毒性
- B: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- C: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- D: 属于蒽环类抗肿瘤药物

答案：C

45. 阿卡波糖是

- A: 长效类胰岛素
- B: 磺酰脲类

C: α -葡萄糖苷酶抑制剂

D: 中效类胰岛素

答案: C

46. 按作用时间分类，属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

A: 预混胰岛素

B: 地特胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案: B

47. 一般来讲，复方己酸羟孕酮注射液的注射时间与剂量是

A: 第一次于月经来潮后 10~12 日注射 2 支

B: 第二次及以后于月经来潮后 10~12 日每月注射 1 支

C: 第二次及以后于月经来潮第 5 日每月注射 1 支

D: 第一次于月经来潮第 5 日注射 1 支

答案: B

48. 以下哪项不是糖皮质激素的不良反应

A: 伤口愈合缓慢

B: 诱发癫痫

C: 心律失常

D: 电解质紊乱

答案: C

49. (2015 年真题) 属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的是 ()。

A: 替罗非班

B: 阿司匹林

C: 氯吡格雷

D: 奥扎格雷

答案: C

50. 对地高辛轻度中毒者可及时停药及使用

A: 苯妥英钠

B: 氯化钾、葡萄糖注射液

C: 利尿剂

D: 阿托品

答案: C

51. 患者，男，38 岁。因“发作性喘息”3 个月入院，发作时憋喘、全身大汗、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘，静脉滴注地塞米松。

A: 异丙托溴铵

B: 氨茶碱

C: 氟替卡松

D: 特布他林

答案: C

52. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

B: 抗肿瘤作用比紫杉醇强

C: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

D: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

答案：D

53. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

- A: 肝脏损害
- B: 白细胞减少
- C: 中枢神经系统毒性
- D: 眼部水肿

答案：C

54. 下述药物中长期使用易产生耐受性的药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: β
- C: M 受体拮抗剂
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：B

55. 大剂量对纯合子家族性高胆固醇血症有效的他汀类调血脂药是

- A: 普伐他汀
- B: 藻酸双酯钠
- C: 氟伐他汀
- D: 阿伐他汀

答案：D

56. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

- A: 利拉鲁肽
- B: 那格列奈
- C: 阿格列汀
- D: 伏格列波糖

答案：C

57. 对鞭虫无效的药物是()。

- A: 甲硝唑
- B: 阿苯达唑
- C: 吡喹酮
- D: 噻嘧啶

答案：D

58. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

- A: 兰索拉唑和阿莫西林
- B: 米索前列醇和四环素
- C: 哌仑西平和西咪替丁
- D: 阿莫西林和四环素

答案：A

59. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

- A: 血小板增多
- B: 高钾血症
- C: 低氯碱血症
- D: 低血糖

答案：B

60. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 吸入性糖皮质激素+短效 β
- B: 长效 β

C: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

D: 吸入性糖皮质激素+长效 β

答案：D

61. (2018 年真题) 围手术期为预防革兰阴性杆菌感染, 可选用 ()

A: 氨曲南

B: 头孢唑林

C: 青霉素 G

D: 万古霉素

答案：A

62. 治疗间日疟和三日疟首选的联合方案是

A: 氯喹+伯氨喹

B: 咯萘啶或甲氟喹

C: 乙胺嘧啶+磺胺药

D: 静脉滴注奎宁

答案：A

63. (2020 年真题) 用于散瞳的眼用药物是

A: 溴莫尼定

B: 复方托吡卡胺

C: 毛果芸香碱

D: 噻吗洛尔

答案：B

64. 下列哪种属于长效青霉素

A: 苄星青霉素

B: 苯唑西林

C: 青霉素 V

D: 阿莫西林

答案: A

65. 与胆汁酸结合而降血脂的药物是

A: 洛伐他汀

B: 烟酸

C: 考来烯胺

D: 氯贝丁酯

答案: C

66. 口服吸收少，用于肠道感染的是

A: 甲氧苄啶

B: 呋喃唑酮

C: 氧氟沙星

D: 磺胺嘧啶

答案: B

67. 静脉滴注过快易发生红人综合征的是()

A: 阿奇霉素

B: 克林霉素

C: 万古霉素

D: 庆大霉素

答案: C

68. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

A: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵

B: 克罗米通具有局部麻醉作用

C: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用

D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案: A

69. 用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A: 米非司酮

B: 黄体酮

C: 地塞米松

D: 雷洛昔分

答案: D

70. 患者，女，45 岁。因持续的烧心和反酸就诊，诊断为胃食管反流病，宜选用的抑酸药物是（）

A: 雷尼替丁

B: 米索前列醇

C: 吉法酯

D: 乳酶生

答案: A

71. 红霉素的抗菌作用机制

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性

C: 影响胞浆膜通透性

D: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

答案: A

72. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A: 其神经系统毒性与剂量大小无关
- B: 应给予预防性或治疗性的止吐用药
- C: 与氯化钠和碱性溶液(特别是氟尿嘧啶)之间存在配伍禁忌
- D: 直肠癌的首选药之一

答案：A

73. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

- A: 哌仑西平
- B: 雷尼替丁
- C: 氢氧化铝
- D: 甲氧氯普胺

答案：B

74. 氯霉素的抗菌作用机制()

- A: 影响胞浆膜通透性
- B: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶
- C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- D: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

答案：B

75. 早产儿、新生儿出血宜选用()

- A: 尿激酶
- B: 叶酸
- C: 维生素 K
- D: 肝素

答案：C

76. 螺内酯临床常用于()

- A: 急性肾衰竭
- B: 尿崩症
- C: 脑水肿
- D: 醛固酮升高引起的水肿

答案: D

77. 克罗米通乳膏用于治疗

- A: 体、股癣
- B: 疥疮
- C: 寻常痤疮
- D: 蛲虫感染

答案: B

78. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

- A: 心律失常
- B: 心肌梗死
- C: 充血性心力衰竭
- D: 高血压

答案: A

79. (2015 年真题) 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是 ()

。

- A: 甲状腺片
- B: 复方碘口服液
- C: 甲巯咪唑片
- D: 卡比马唑片

答案：C

80. (2017 年真题) 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是 ()

- A: 1%硫酸阿托品眼膏剂
- B: 2%后马托品眼膏剂
- C: 四环素可的松眼膏剂
- D: 10%去氧肾上腺素滴眼剂

答案：A

81. 口服呋喃妥因可用于治疗 ()

- A: 呼吸道感染
- B: 尿路感染
- C: 肺感染
- D: 肠道感染

答案：B

82. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 吡嗪酮
- B: 甲苯咪唑
- C: 甲硝唑
- D: 氯喹

答案：D

83. (2020 年真题) 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 舍曲林
- B: 阿米替林

C: 度洛西汀

D: 吗氯贝胺

答案: D

84. 可引起高钾血症，应避免与留钾利尿药联合应用的是()

A: 卡托普利

B: 呋噻嗪

C: 地高辛

D: 呋塞米

答案: A

85. (2016 年真题) 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是

A: 可待因

B: 右美沙芬

C: 氯化铵

D: 苯丙哌林

答案: D

86. 可杀灭疥虫的药物是

A: 林旦

B: 阿苯达唑

C: 甲苯达唑

D: 维 A 酸

答案: A

87. 格列齐特是

A: 中效类胰岛素

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: α -葡萄糖苷酶抑制剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/015303201120012033>