

中医外科(医学高级)-多器官功能衰竭

1、引起“肾前性肾功能衰竭”的病因（）

- A. 挤压综合征
- B. 感染性休克
- C. 广泛烧伤
- D. 盆腔手术误扎双侧输尿管
- E. 缺水，血容量减少

2、MODS 的共同病理生理变化是（）

- A. 微循环障碍
- B. 组织缺血一再灌注
- C. 血压下降
- D. DIC
- E. 大量血浆渗出

3、急性肾性肾功能衰竭主要病理损害形式是（）

- A. 急性肾小球坏死
- B. 急性肾小管坏死
- C. 急性肾皮质坏死
- D. 急性肾髓质坏死
- E. 急性肾缺血

4、急性肾功能衰竭少尿期，电解质紊乱的表现是（）

- A. 高钠血症
- B. 高钾血症
- C. 低钾血症
- D. 高钙血症
- E. 低镁血症

5、关于 ARDS 诊断依据，下列哪项正确。（）

- A. PaO_2/FiO_2 比 PaO_2 更能反应呼吸衰竭的程度
- B. 呼吸频率开始快，后来逐渐减慢
- C. 肺泡气与动脉氧分压差（ $PA-aDO_2$ ）及肺内分流量减少
- D. 早期 X 线片示两肺边缘模糊或斑片状阴影
- E. 呼吸频率由慢变快

6、急性肾功能衰竭病人少尿期或无尿期出现水中毒的常见原因是（）

- A. 钠中毒
- B. 酸中毒
- C. 未严格限制入水量
- D. 体内内生水过多
- E. 抗利尿激素增加

7、下列哪项是多器官功能不全综合征的病因。（）

- A. 慢性贫血
- B. 低蛋白血症
- C. 电解质平衡紊乱
- D. 低血容量休克
- E. 酸碱平衡紊乱

8、最有可能导致急性肾功能衰竭的损伤是（）

- A. 脊柱骨折伴截瘫
- B. 广泛 I 度烧伤
- C. 挤压综合征
- D. 股骨骨折
- E. 尺桡骨骨折

9、男，55 岁，因高热、神志模糊、休克送入 ICU 治疗，诊断为重症肺炎，经积极治疗后体温正常，血压 120/68mmHg，HR100bpm，呼吸 36 次/分，唇发绀，双肺无啰音，该病人最可能是（）

- A. 心力衰竭
- B. ARDS
- C. 气胸
- D. 脑膜炎
- E. 胸膜炎

10、急性肾功能衰竭无尿是指 24 小时尿量为 ()

A. 不足 100ml

B. 0ml

C. <150ml

D. <400ml

E. <500ml

11、女，45 岁，因交通事故，双股骨干粉碎骨折第 2 天。其 24 小时尿量 200ml，下列化验结果不符合急性肾功能衰竭的是 ()

A. 血钾 5mmol/L

B. 尿素氮 14.2mmol/L

C. 血镁 1.4mmol/L

D. 血磷 0.89mmol/L，血钙 2.96mmol/L

E. 血浆肌酐 106mmol/L

12、最常引起无尿的是 ()

A. 肾前性肾衰

B. 肾后性肾衰

C. 急性肾性肾衰

D. 前列腺增生症

E. 膀胱肿瘤

13、男性，42岁，患急性重症胰腺炎并发休克36小时，经抗休克治疗后行胰腺和其周围坏死组织清除、腹腔引流术。术后心率106次/分，血压96/60mmHg（12.8/8kPa），中心静脉压10cmH₂O（9.8kPa）。呼吸频率22次/分，动脉血氧分压66mmHg（11.5kPa），尿量10ml/h，尿比重1.002。此病人目前最紧急的并发症是（）

- A. 心功能不全
- B. 肺功能衰竭
- C. 肾功能衰竭
- D. 血容量不足
- E. 体内抗利尿激素分泌过多

14、诊断急性呼吸窘迫综合征最重要的依据是（）

- A. X线片有广泛点、片状阴影
- B. 肺部听诊有啰音
- C. 血气分析为低氧血症
- D. 一般吸氧治疗无效
- E. 呼吸频率逐渐加快

15、男，60岁，急性肾功能衰竭病人，血钾5.6mmol/L，下列治疗措施有原则性错误的是（）

- A. 10%氯化钾20ml 静脉滴注

- B. 口服钠型树脂 15g，每日 3 次
- C. 山梨醇 5g，每 2 小时口服一次
- D. 5%碳酸氢钠溶液 100ml，缓慢静脉滴注
- E. 25%葡萄糖溶液加胰岛素（3～5U）200ml，缓慢静脉滴注

16、急性肾功能衰竭少尿或无尿期常见的致死原因是（）

- A. 高磷血症与低钙血症
- B. 低钠血症
- C. 低氯血症
- D. 高镁血症
- E. 高钾血症

17、ARDS 病人呼吸频率一般均超过（）

- A. 15 次/分
- B. 20 次/分
- C. 25 次/分
- D. 30 次/分
- E. 35 次/分

18、急性肾衰早期，最常见的表现是（）

- A. 少尿、尿相对密度低
- B. 水中毒、电解质紊乱

- C. 代谢性酸中毒、抽搐
- D. 血尿素氮升高
- E. 意识障碍、呼吸困难

19、急性肾衰竭少尿期的主要死亡原因（）

- A. 低血钠
- B. 酸中毒
- C. 心力衰竭
- D. 感染
- E. 高钾血症

20、男性，50 岁，急性肾衰少尿期，患者突然呼吸困难，头痛、头晕，软瘫，心律不齐，心动过缓，腹胀，应考虑（）

- A. 高血钾症
- B. 低血钾症
- C. 水中毒
- D. 酸中毒
- E. 尿毒症

21、少尿期的补液原则及入水量为（）

- A. 高于每日排出量的 1 倍
- B. 补液不加限制

- C. 量出为入，每天补液量=显性失水+不显性失水-内生水
- D. 排出量的 $1/2 \sim 1/3$
- E. 等于每日排出量

22、弥散性血管内凝血最早的临床表现是（）

- A. 取血时不易抽出、血易凝
- B. 皮肤黏膜下出血
- C. 注射部位易出血
- D. 伤口易出血
- E. 咯血

23、急性肾衰病人由少尿期进入多尿期，变化根据是（）

- A. 尿量增加到 800ml/24 小时
- B. 尿量增加到 700ml/24 小时
- C. 尿量增加到 500ml/24 小时
- D. 尿量增加到 400ml/24 小时
- E. 尿量增加到 300ml/24 小时

24、为预防急性肾功能衰竭，哪种外伤的病人应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液（）

- A. 头皮撕脱伤
- B. 肋骨骨折

- C. 大腿挤压伤
- D. 肾挫伤
- E. 前臂裂伤

25、急性肾功能衰竭少尿期患者，第一天尿量为 250ml，算出当日的补液量（）

- A. 800ml
- B. 550ml
- C. 1100ml
- D. 750ml

26、大面积烧伤病人抗休克治疗常用的胶体液是（）

- A. 平衡盐溶液
- B. 碳酸氢钠等渗盐水
- C. 中分子右旋糖酐
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 血浆

27、病人出现弥散性血管内凝血的早期征兆是（）

- A. 血液不易抽出
- B. 易出鼻血
- C. 皮肤出现出血点

D. 便血

E. 咯血

28、ARDS 病人使用人工呼吸机纠正低氧血症最常用的通气方式是（）

A. 持续鼻导管吸氧

B. 呼气终末正压通气

C. 间歇性鼻导管吸氧

D. 持续气道正压通气

29、急性肾衰病人由少尿期进入多尿期标志是 24 小时尿量增加至（）

A. 300ml

B. 400ml

C. 500ml

D. 700ml

E. 800ml

30、急性肾功能衰竭少尿期营养供给以下哪项是错误的（）

A. 高蛋白饮食

B. 限制含钾的食物

C. 以糖为主

D. 充足的维生素

31、呼吸机治疗 ARDS 使用 PEEP 最佳值是 ()

- A. 0.5~1.0kPa
- B. 0.5~1.5kPa
- C. 0.5~2.0kPa
- D. 1.0~1.5kPa
- E. 1.0~2.0kPa

32、严重挤压伤时要观察病人的尿量及颜色，主要目的是 ()

- A. 预防休克
- B. 了解液体是否足够
- C. 了解是否发生肾衰竭
- D. 了解有无泌尿系损伤

33、急性肾功能衰竭少尿是指成人 24 小时尿量小于 ()

- A. 200ml
- B. 300ml
- C. 400ml
- D. 500ml
- E. 600ml

34、在严重损伤引起的系统或器官功能障碍中，最先累及的是 ()

- A. 脑

- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 心

35、急性肾功能衰竭少尿期病人需要紧急处理的电解质紊乱是（）

- A. 低钠血症
- B. 低氯血症
- C. 高钾血症
- D. 低钙血症
- E. 高磷血症

36、DIC 病人初期的症状是（）

- A. 胃肠道出血
- B. 皮肤淤斑
- C. 抽血困难，粘稠易凝
- D. 齿龈出血

37、急性肾功能衰竭少尿期病人常见的死亡原因是（）

- A. 低钠血症
- B. 高钾血症
- C. 酸中毒

D. 低钙血症

E. 高磷血症

38、急性肾衰少尿或无尿期控制血钾升高应除外（）

A. 严格限制含钾食物

B. 可以输入库存血

C. 严格限制含钾药物

D. 彻底清创

E. 控制感染

39、DIC 病人作抗凝治疗时，哪种药物不能使用（）

A. 肝素

B. 阿司匹林

C. 潘生丁

D. 止血芳酸

40、多系统器官衰竭首先受损害的器官为（）

A. 脑

B. 肾脏

C. 肝脏

D. 肺

41、哪种疾病输液时应考虑内生水的问题（）

- A. 急性肠梗阻
- B. 大面积烧伤
- C. 急性肾功能衰竭
- D. 酸碱平衡紊乱

42、急性肾功能衰竭少尿期病人的饮食要求为（）

- A. 高蛋白、高糖、多维生素
- B. 高脂、高糖、高蛋白
- C. 低蛋白、高脂、低维生素
- D. 低蛋白、低糖、多维生素
- E. 低蛋白、高糖、多维生素

43、烧伤病人发生多器官系统功能衰竭的最主要原因是（）

- A. 创面感染
- B. 急性肺功能衰竭
- C. 呼吸道烧伤
- D. 烧伤休克
- E. 水、电解质酸碱平衡紊乱

44、某急性肾衰竭病人，测定血钾 7mmol/L 出现心律不齐，应先采取的措施是（）

- A. 10%葡萄糖酸钙静脉注射
- B. 高渗葡萄糖胰岛素静脉滴注
- C. 乳酸钠静脉滴注
- D. 苯丙酸诺龙肌内注射
- E. 5%碳酸氢钠静脉滴注

45、男性，30岁，双下肢及胸腹部烧伤6小时，血压70/50mmHg，中心静脉压3cmH₂O，尿量15ml/L，表明该病人存在（）

- A. 血容量严重不足
- B. 心功能不全
- C. 血容量过多
- D. 毛细血管过度收缩
- E. 肾功能不全

46、最容易引起急性肾功能衰竭的外伤是（）

- A. 关节扭伤
- B. 严重挤压伤
- C. 创伤性窒息
- D. 严重头皮裂伤
- E. 严重头皮撕脱伤

47、女性，32岁，因车祸撞伤左上腹，出现腹痛，面色苍白，出冷

汗，脉细速，血压下降。最可能损伤的脏器是（）

- A. 胃
- B. 肺
- C. 脾
- D. 大肠
- E. 小肠

48、急性肾衰竭病人的饮食护理，哪项错误（）

- A. 高蛋白
- B. 高热量
- C. 充足维生素
- D. 忌含钾丰富的食物
- E. 控制入水量

49、多系统器官功能衰竭，多数情况下，首先受累的器官是（）

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脑

50、多系统器官衰竭中第一个受累的器官往往是（）

- A. 心
- B. 肾
- C. 脑
- D. 肝
- E. 肺

51、急性肾功能衰竭少尿期后期容易出现的水电解质酸碱失衡是（）

- A. 水中毒
- B. 酸中毒
- C. 低氯血症
- D. 低钾血症
- E. 高钙血症

52、急性肾衰竭少尿期饮食哪项是错误的（）

- A. 高钾、高钠饮食
- B. 热量供应以糖为主
- C. 脂肪适量
- D. 补充多种维生素
- E. 禁食蛋白质

53、关于 ARDS 病人呼吸变化的描述，错误的是（）

- A. 初期呼吸突然加快，有呼吸窘迫感

- B. 早期一般吸氧症状常得到缓解
- C. 进展期明显呼吸困难、发绀
- D. 末期呼吸极度困难、深度昏迷
- E. 晚期吸氧很难有效

54、急性肾衰竭少尿期日补液量应等于（）

- A. 尿量
- B. 显性失水量
- C. 显性失水量+不显性失水量+内生水
- D. 显性失水量+不显性失水量-内生水
- E. 显性失水量+不显性失水量

55、急性肾衰竭少尿期电解质紊乱错误的是（）

- A. 高磷
- B. 低钾
- C. 高镁
- D. 低钠
- E. 低钙

56、正常动脉血 CO₂ 分压参考值是（）

- A. 5.0kPa
- B. 5.1kPa

C. 5. 2kPa

D. 5. 3kPa

E. 5. 4kPa

57、急性肾功能衰竭进入多尿期的标志是成人 24h 尿量多于（）

A. 100ml

B. 200ml

C. 300ml

D. 400ml

E. 500ml

58、库欣(Cushing)溃疡是指（）

A. 重度烧伤后继发胃、十二指肠溃疡

B. 脑外伤后继发胃、十二指肠溃疡

C. 重度休克后继发胃、十二指肠溃疡

D. 脓毒血症继发胃、十二指肠溃疡

E. 服用阿司匹林、吲哚美辛（消炎痛）继发胃、十二指肠溃疡

59、以下哪项不属 MODS 的高危因素（）

A. 创伤与大手术

B. 坏死性胰腺炎

C. 脓毒血症

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015334011022012003>