

2024 年安徽省舒城县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库附参考答案（夺分金卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者，不宜选用的药物是

- A: 非那雄胺
- B: 多沙唑嗪
- C: 奥昔布宁
- D: 坦索罗辛

答案：C

2. 下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

- A: $(4.3 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案：B

3. “美国心脏病学院与美国心脏协会 2014 年颁布了《2013 版成人降胆固醇治疗降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险指南》，强调他汀类药物在降低急性冠脉综合征风险方面的获益”表明循证医学实践能够

- A: 列为医药卫生行政决策的依据
- B: 改变降脂治疗观念
- C: 有助于个体化给药
- D: 有利于诊断特殊疾患

答案：B

4. 患者，女，54 岁，诊断为类风湿关节炎 2 年。目前服用甲氨蝶呤 (15mg, qw) 和塞来昔布 (200mg, qd)。患者因担心药物不良反应，用药不规律，时断时续。近几日出现腕关节肿胀和疼痛加重，晨僵明显，加用泼尼松 10mg, qd。

- A: 早期治疗. 遵医嘱规律用药
- B: 多晒太阳. 适量补充钙剂、维生
- C: 定期就诊, 评估病情, 调整治疗方案
- D: 预防骨质疏松

答案：C

5. 男性红细胞沉降率的正常范围值

- A: 0~20mm/h
- B: 0~5mm/h
- C: 0~15mm/h
- D: 0~10mm/h

答案：C

6. 65 岁及以上老年人用于骨质疏松症防治时，维生素 D 剂量可为

- A: 8001200IU (20~30 μ g) / d
- B: 400IU (10 μ g) / d
- C: 600IU (15 μ g) / d
- D: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d

答案：A

7. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 过度治疗用药

- B: 有禁忌证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 无适应证用药

答案：D

8. 主要不良反应有高血压、肝肾毒性的 DMARDs 是

- A: 硫唑嘌呤
- B: 利妥昔单抗
- C: 环孢素
- D: 氯喹

答案：C

9. 注意个体化用药体现

- A: 规范性
- B: 经济性
- C: 安全性
- D: 有效性

答案：A

10. 以下用于治疗寻常痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 阿达帕林
- B: 维胺酯
- C: 异维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

11. 下列药品中易发生水解反应的是

- A: 维生素

B: 盐酸氯丙嗪

C: 头孢氨苄

D: 肾上腺素

答案：C

12. 可用于治疗沙眼的处方药是

A: 酞丁安滴眼剂

B: 红霉素眼膏

C: 磺胺醋酰钠

D: 硫酸锌

答案：C

13. 关于儿童药动学和药效学特点的说法，错误的是（）

A: 和成人相比，婴儿胃液 PH 低，对酸不稳定的药物易被破坏

B: 儿童内分泌系统不够稳定，长期使用糖皮质激素易导致发育迟缓

C: 婴幼儿血浆白蛋白与药物的结合能力低于成人，血中游离药物浓度较高

D: 儿童血脑屏障不完善，多种药物均能通过，有可能引发不良反应

答案：A

14. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 1%氯化钠

B: 3%过氧化氢

C: 1%硫酸铜

D: 1%硫酸镁

答案：D

15. 包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

- A: 二级信息源资料
- B: 期刊论文
- C: 三级信息源资料
- D: 网站信息

答案：A

16. 患者女.80 岁高血压病史 28 年近日自觉憋气昨夜出现呼吸困难,不能平躺喘憋咳粉红色泡沫样痰诊断为心力衰竭应选用的药物是 ()

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 呋塞米
- C: 氟桂利嗪
- D: 胺碘酮

答案：B

17. 既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 丙咪嗪
- B: 帕罗西汀
- C: 氟伏沙明
- D: 阿米替林

答案：C

18. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 氨氯地平片可于早上服用
- B: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎
- C: 若需减量，阿司匹林肠溶片可掰开减量服用
- D: 阿司匹林肠溶片于晚上服用

答案：C

19. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 A 级的是

- A: 美托洛尔
- B: 氯化钾
- C: 青霉素
- D: 环丙沙星

答案：B

20. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

- A: 药品适应证
- B: 自我保健
- C: 新药信息
- D: 治疗药物监测

答案：A

21. 稚嫩、柔弱，喹诺酮类药物可致关节痛及关节肿胀、软骨损害

- A: 水盐代谢
- B: 血液系统
- C: 运动系统
- D: 内分泌系统

答案：C

22. 病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的

- A: 1 级证据

B: 4 级证据

C: 2 级证据

D: 3 级证据

答案: B

23. 可诊断女性高尿酸血症的是

A: 血尿酸为 $420\ \mu\text{mol/L}$

B: 血尿酸为 $270\ \mu\text{mol/L}$

C: 血尿酸为 $380\ \mu\text{mol/L}$

D: 血尿酸为 $200\ \mu\text{mol/L}$

答案: C

24. 可用 1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

A: 三唑仑中毒

B: 磷化锌中毒

C: 丙米嗪中毒

D: 丙戊酸钠中毒

答案: B

25. 伪膜性肠炎

A: 白细胞增多

B: 上皮细胞

C: 真菌

D: 红细胞

答案: B

26. 下列不属于尿液检查项的是

A: PRO

B: BL

C: LEU

D: ALT

答案：D

27. 咳嗽较弱者宜选用的药物是

A: 喷托维林

B: 苯丙哌林

C: 氨溴索

D: 右美沙芬

答案：A

28. 一般含服 5 分钟左右；用药后 30 分钟内不宜吃东西或饮水的是

A: 咀嚼片

B: 阴道栓剂

C: 含漱剂

D: 舌下片

答案：D

29. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

A: 异戊巴比妥

B: 巴比妥

C: 苯巴比妥

D: 硫喷妥钠

答案：A

30. 氯霉素的禁用范围是

- A: 1 岁以下婴儿
- B: 3 岁以下幼儿
- C: 新生儿
- D: 婴幼儿

答案：C

31. (2015 年真题) 静脉注射青霉素的适宜溶媒是 ()。

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 0.9 氯化钠注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：B

32. 急性期

- A: 2 周
- B: 1 个月内
- C: 1~6 个月
- D: 1~3 个月

答案：B

33. 患者女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38℃中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$,血清淀粉酶 1993U/L,血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是 ()

- A: 急性胆囊炎
- B: 急性胰腺炎
- C: 急性阑尾炎
- D: 急性胃炎

答案：B

34. 药师应告知医师"血药浓度监测是提高治疗效果的重要措施"的事例是

- A: 地高辛用于肾功不全者须监测血药浓度
- B: 阿昔洛韦致急性肾衰竭
- C: 利巴韦林致畸与肿瘤
- D: 替加色罗存在心绞痛

答案：A

35. 患者，男，58 岁，高血压病史 5 年；吸烟史 40 年，日均 40 支。2 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅 CT 检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

- A: 阿司匹林肠溶片 100mgqdpo
- B: 华法林片 3mgqdpo
- C: 氯吡格雷片 75mgqdpo
- D: 阿司匹林肠溶片 300mgqdpo

答案：A

36. 具有变形运动和吞噬功能，可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

- A: 嗜碱性粒细胞
- B: 中性粒细胞
- C: 淋巴细胞
- D: 嗜酸性粒细胞

答案：D

37. 主要通过肝脏清除的药物的代谢速度和程度降低，是指

- A: 药物排泄
- B: 药物吸收
- C: 药物代谢
- D: 药物分布

答案：C

38. 制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都参考循证医学的研究结果表明

- A: 有助个体化给药
- B: 改变降脂治疗观念
- C: 列为行政决策的依据
- D: 有利诊断特殊疾患

答案：C

39. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，1~2 小时后缓解，以冬春季多发。

- A: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁
- C: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂
- D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

答案：D

40. 患者女 57 岁 BM312 诊断为 2 型糖尿病经生活方式干预，未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是（）

- A: 二甲双胍
- B: 格列齐特
- C: 吡格列酮
- D: 阿卡波糖

答案：A

41. 属于 PH 依耐性药物的是

- A: 多黏菌素
- B: 美沙拉秦肠溶片
- C: 林可霉素
- D: 青霉素

答案：B

42. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 激素替代剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 促进骨矿化剂

答案：C

43. 治疗真菌性阴道炎可选用

- A: 克霉唑栓
- B: 复方角菜酸酯栓
- C: 阿达帕林凝胶
- D: 复方苯甲酸酊

答案：A

44. 在治疗沙眼的药物中，对沙眼衣原体有强大的抑制作用的是

- A: 红霉素眼膏
- B: 金霉素眼膏
- C: 酞丁安滴眼剂
- D: 硫酸锌滴眼剂

答案：C

45. (2021 年真题) 患者,男,52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片 20mgq

A: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是 ()

B: 骨质疏松

C: 低血压

D: 消化性溃疡

答案：A

46. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分,并在处方右上角以文字注明。

A: 中药处方印刷用纸为白色,右上角标注"中"

B: 儿科处方印刷用纸为淡黄色、右上角标注"儿科"

C: 麻醉药品处方印刷用纸为淡红色、右上角标注"麻醉"

D: 二类精神药品处方印刷用纸为白色,右上角标注"精二"

答案：D

47. 患者,男,69 岁,BMI27.8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后,再次出现膝关节疼痛,患者热敷后疼痛未缓解,前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 肾损害

B: 共济失调

C: 口干

D: 便秘

答案：A

48. 解救有机磷中毒的是（）

- A: 单价抗毒血清
- B: 二巯丁二钠
- C: 盐酸戊乙奎醚
- D: 亚硝酸钠

答案：C

49. 真菌引起阴道炎（）

- A: 咪康唑
- B: 庆大霉素
- C: 聚甲酚磺醛
- D: 甲硝唑

答案：A

50. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

- A: 不良生活方式
- B: 药物制剂因素
- C: 药物的使用
- D: 生理因素

答案：C

51. 服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

- A: 抗利尿药
- B: 利胆药
- C: 利尿结石药
- D: 苦味健胃药

答案：A

52. (2017 年真题) 细菌性尿路感染最常见的致病菌是 ()

- A: 大肠埃希菌
- B: 克雷伯杆菌
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 肠球菌

答案：A

53. 以下关于调剂资格的叙述正确的是

- A: 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂
- B: 具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- C: 具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂
- D: 具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

答案：A

54. 告知"培高利特致心脏瓣膜病风险已经撤市"属于

- A: 禁忌证
- B: 药品不良反应
- C: 合理用药信息
- D: 药物相互作用

答案：B

55. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.38
- B: 0.13
- C: 0.5

D: 0.68

答案：B

56. 以下联合用药中，依据"作用相加或增加疗效"机制的是

A: 阿托品联用解磷定

B: 普萘洛尔联用硝苯地平

C: 阿托品联用吗啡

D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：A

57. I 期新药临床试验样本数要求查看材料

A: 主要病种 ≥ 300 例

B: 常见病 ≥ 12000 例

C: ≥ 300 例

D: 20~30 例

答案：D

58. 患者，男性，55 岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示 Hb72g / L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

A: 心脏相关风险

B: 胃肠道反应

C: 肾毒性

D: 肝毒性

答案：B

59. 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释 OS. 是指

- A: 左眼
- B: 立即
- C: 适量
- D: 右眼

答案：A

60. 1 级高血压标准是

- A: 收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$
- B: 收缩压 $120\sim 139\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $80\sim 89\text{mmHg}$
- C: 收缩压 $160\sim 179\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $100\sim 109\text{mmHg}$
- D: 收缩压 $140\sim 159\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $90\sim 99\text{mmHg}$

答案：D

61. 服药期间宜多喝水的药物

- A: 苯溴马隆
- B: 苯妥英钠
- C: 左旋多巴
- D: 琥珀酸亚铁

答案：A

62. 导致心脑血管事件的是

- A: 己烯雌酚
- B: 阿托伐他汀
- C: 罗非昔布
- D: 加替沙星

答案：C

63. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是 ()。

- A: 乙酰胺
- B: 毒扁豆碱
- C: 卡马西平
- D: 阿托品

答案：A

64. 抗高血压药物中，噻嗪类利尿药的主要不良反应为()。

- A: 房室传导阻滞，心功能抑制
- B: 血钾增高
- C: 直立性低血压
- D: 血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

答案：D

65. 在药学信息咨询服务中，应用二级信息资料的最突出优势是

- A: 对一个具体问题所提供的信息简明扼要
- B: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识
- C: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响
- D: 可以很方便地对所需要的一级文献信息进行筛选

答案：D

66. 大剂量或连续使用顺铂可导致药源性肾病的机制是

- A: 不可逆性肾小管坏死
- B: 肾间质纤维化
- C: 阻塞肾小管、肾小球
- D: 前列腺素合成障碍

答案：A

67. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 特拉唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 前列康
- D: 黄酮哌酯

答案：A

68. 作为多重用药的管理策略，“用药列表”的作用最可能见效的是
- A: 可判断治疗疾病的主要药物、辅助治疗药物，甚至是不必要的药物
 - B: 减少联合用药的药物种类
 - C: 有助于指出不适合患者服用的、相互作用存在潜在危险性的药物
 - D: 有助于指出需特别监测、必要时应停服的药物

答案：B

69. 医院获得性肺炎无感染高危因素患者的最常见病原体为
- A: 大肠杆菌
 - B: 金黄色葡萄球菌
 - C: 流感嗜血杆菌
 - D: 肺炎链球菌

答案：D

70. 成人血小板计数正常参考区间是
- A: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$
 - B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$
 - C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$
 - D: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

答案：A

71. 白天咳嗽宜选用的药品是

- A: 苯丙哌林
- B: 羧甲司坦
- C: 可待因
- D: 右美沙芬

答案：A

72. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为

- A: 胃黏膜血流减少
- B: Hp 感染
- C: 胃黏膜屏障的完整性
- D: 胃酸

答案：D

73. 乙醇、对乙酰氨基酚等血浆药物浓度升高，地西洋、利多卡因分布容积增大、消除缓慢，是由于

- A: 胆汁分泌缺乏
- B: 肾功能随年龄增长而减退
- C: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- D: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

答案：C

74. 在患者药物治疗的每一个不同阶段（入院、转科或出院时），药师通过与患者沟通或复核，了解其在医疗交接前后的整体用药情况是否一致，与医疗团队一起对不适当的用药方案进行调整，并做详细全面的记录，从而预防医疗过程中的药物不良事件，保证患者用药安全的过程。这一深入开展的药学服务属于

- A: 处方审核
- B: 药物评价

C: 药物重整

D: 药学干预

答案：C

75. 剧烈频繁干咳宜选用的药物是

A: 多奈哌齐

B: 可待因

C: 阿司匹林

D: 吗啡

答案：B

76. (2019 年真题) 患者，男，56 岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体：舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降，下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是

A: 奥美拉唑

B: 二甲双胍

C: 对氨基水杨酸

D: 氨氯地平

答案：D

77. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“必要时”用药的缩写是()

A: qd

B: qn

C: qid

D: prn

答案：D

78. 某患者，男，78 岁，既往有动脉粥样硬化史，因尿频、尿急就诊。体征和实验室检查结果：血压 166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原(PAS)正常。在控制患者血压的同时，应联合选用

- A: 泼尼松龙
- B: 非那雄胺
- C: 吲达帕胺
- D: 丙酸睾酮

答案：B

79. 重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

- A: 中度
- B: 重度
- C: 弱轻度
- D: 轻度

答案：B

80. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛患者的首选处方药是

- A: 山莨菪碱
- B: 卡马西平
- C: 地西泮
- D: 苯噻啶

答案：B

81. 成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 3.1~5.7mmol / L
- B: 2.1~3.1mmol / L
- C: 0.56~1.70mmol / L
- D: 1.03~2.07mmol / L

答案：B

82. 流行性出血性结膜炎可选用

- A: 0.1%碘苷滴眼剂
- B: 2%色甘酸钠滴眼剂
- C: 四环素眼膏
- D: 0.1%羟苄唑滴眼剂

答案：D

83. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 异丙托溴铵
- D: 沙丁胺醇

答案：A

84. 观察人体对新药的耐受程度和药动力学评价阶段是

- A: IV期临床试验
- B: III期临床试验
- C: II期临床试验
- D: I期临床试验

答案：D

85. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

- A: 叶酸拮抗剂
- B: 雌激素、孕激素、雄激素
- C: 苯巴比妥
- D: 沙利度胺

答案：D

86. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 头孢克洛干混悬剂
- B: 维生素 C 片
- C: 葡萄糖酸锌口服液
- D: 感冒清热冲剂

答案：A

87. 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管的药物是

- A: 磷酸可待因糖浆
- B: 非洛地平缓释片
- C: 吲哚美辛胶囊
- D: 聚乙二醇粉剂

答案：D

88. 属于非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是 ()

- A: 阿巴卡韦
- B: 洛匹那韦
- C: 多替拉韦
- D: 奈韦拉平

答案：D

89. 亚硝酸钠可用于解救

- A: 吗啡中毒

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 氰化物中毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/016000044102011030>