

## 妇幼保健知识竞赛《妇幼保健知识竞赛在线测试》考试题

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、问答题：儿童主要健康行为有哪些？
- 2、名词解释母婴保健技术服务主要包括哪些事项？
- 3、单项选择题：大于多少岁生育者，应在孕中期做胎儿细胞染色体检查以排除染色体异常儿（ ）。  
A. 大于 30 岁  
B. 大于 35 岁  
C. 大于 40 岁  
D. 大于 45 岁  
E. 大于 38 岁
- 4、填空题：使用干燥无菌持物钳和容器时，应每几小时更换 1 次。（ ）
- 5、判断题：孕产妇保健覆盖率到 2010 年农村要达 85%，城市达 95%。
- 6、单项选择题：临产的征兆为：出现规律、伴有疼痛且逐渐增强的子宫收缩，每次持续 30 秒或以上，间隔（ ）。A. 2—3 分钟  
B. 3—4 分钟  
C. 5—6 分钟  
D. 4—5 分钟
- 7、问答题：孕期健康教育的主要形式有哪些？
- 8、多项选择题：下列哪种方法可以预防人禽流感（ ）  
A、保持室内通风  
B、减少人禽接触  
C、体育锻炼  
D、食用高温烹饪后的禽肉、蛋
- 9、填空题：活产是指妊娠满 28 周，胎儿娩出后有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）4 项生命指标之一者
- 10、填空题：骨盆入口前后径正常值：（ ）cm，中骨盆横径正常值：（ ）cm，骨盆出口横径正常值：8—9.5cm。
- 11、判断题：胎儿娩出后 24h 内，阴道流血超过 500ml 称产后出血。
- 12、单项选择题：临产的征兆为：出现规律、伴有疼痛且逐渐增强的子宫收缩，每次持续 30 秒或以上，间隔（ ）。A. 2—3 分钟  
B. 3—4 分钟  
C. 5—6 分钟

D. 4—5 分钟

- 13、问答题：如何统计孕妇产前筛查人数、孕妇产前筛查高危人数？
- 14、单项选择题：关于宫颈癌的病因，下列哪项是错误的：（ ）
- A、早产、多产、多育
  - B、病毒感染
  - C、激素替代治疗
  - D、性生活紊乱
- 15、单项选择题：抢救新生儿窒息的程序应是（ ）。A. 清理呼吸道、建立呼吸、建立正常循环、用药
- B. 建立呼吸、清理呼吸道、建立正常循环、用药
  - C. 清理呼吸道、用药、建立呼吸、建立正常循环
  - D. 清理呼吸道、建立正常循环、建立呼吸、用药
  - E. 用药、清理呼吸道、建立呼吸、建立正常循环
- 16、单项选择题：孕妇应当保证合理膳食，均衡营养，在医生指导下适量补充（ ）等营养素。A. 叶酸
- B. 铁、钙
  - C. 鱼肝油
- 17、填空题：艾滋病母婴传播是可以通过综合的干预措施阻断的，联合高效的（ ）治疗、选择安全的分娩方式及（ ）喂养等综合措施是母婴阻断成功的保障。
- 18、单项选择题：妊娠早期淋菌感染可引起（ ）A. 感染性流产或流产后感染
- B. 胎儿畸形
  - C. 胎位异常
  - D. 胎儿巨大
- 19、单项选择题：糖尿病对孕妇的影响，下述哪项不正确？（ ）A. 孕妇白细胞吞噬作用增强
- B. 妊娠期高血压疾病发病率较普通孕妇女高 4~8 倍
  - C. 羊水过多发生率较普通孕妇女增加 10 倍
  - D. 手术产发生率同正常孕妇
  - E. 易发生霉菌性阴道炎
- 20、单项选择题：乳腺检查的常用手段？（ ）
- A、彩超
  - B、钼靶
  - C、均是
  - D、均不是
- 21、单项选择题：如果发现乳房肿块应该怎么办？（ ）A. 观察
- B. 热敷
  - C. 医院就诊
  - D. 自行按摩
- 22、判断题：孕产妇死亡的漏报调查主要在医院的妇产科进行，其他科室可以不去。
- 23、判断题：怀孕后去医院建立围产保健册最适宜的时间是孕 13 周前。
- 24、单项选择题：一般在妊娠多少周后发现臀位可采用膝胸卧位纠正（ ）。A. 20 周后
- B. 24 周后
  - C. 28 周后
  - D. 38 周后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/016152105242010121>