

2024 年广西壮族自治区金城江区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题大全（含答案）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是：

- A: 骨骼发育不良或骨软化
- B: 骨质疏松症或骨桥
- C: 间质性胃炎或肾结石
- D: 横纹肌溶解或肌痛

答案：C

2. 下列药品中，与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

- A: 地西洋
- B: 巴比妥
- C: 碳酸钙
- D: 维生素 C

答案：A

3. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，×线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 由于增加不良反应，不提倡联合用药
- B: 定期随诊，监测血常规和肝肾功能
- C: 肺结核属于传染病，患者咳嗽、打喷嚏和高声讲话时不能直向旁人

D: 应全程督导服药，提高用药的依从性

答案：A

4. (2018 年真题) 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用 ()

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 七叶洋地黄双苷滴眼液

D: 玻璃酸钠滴眼液

答案：A

5. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 左眼

A: NS

B: DOL

C: LD

D: O

答案：B

6. 成年人血清中三酰甘油含量是

A: 2.1~3.1mmol / L

B: 1.03~2.07mmol / L

C: 0.56~1.70mmol / L

D: 3.1~5.7mmol / L

答案：C

7. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A: 右美沙芬

B: 苯海拉明

C: 愈创木酚甘油醚

D: 伪麻黄碱

答案: B

8. 属于 β 受体激动剂的是

A: 异丙托溴铵

B: 美托洛尔

C: 乙酰胆碱

D: 福莫特罗

答案: D

9. I 期临床试验

A: 以患者为给药对象

B: 以健康志愿者为给药对象

C: 以特殊人群为给药对象

D: 以目标适应证患者为给药对象

答案: B

10. 具有肝毒性和性功能障碍不良反应，与其他药物同服时容易影响后者的血药浓度，不应成为该类药物首选的是

A: 西咪替丁

B: 埃索美拉唑

C: 莫沙必利

D: 硫糖铝

答案: A

11. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选

A: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物

- B: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
- C: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物
- D: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物

答案：A

12. 妊娠早期妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 甲氨蝶呤
- C: 苯妥英钠
- D: 辛伐他汀

答案：A

13. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

- A: 25~50mg/d
- B: 25~75mg/d
- C: 150~300mg/d
- D: 75~150mg/d

答案：D

14. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

- A: 糖化血红蛋白
- B: 血红蛋白
- C: 餐后 2 小时血糖
- D: 空腹血糖

答案：A

15. 以下所列治疗咳嗽的药物中，属于处方药物的是

- A: 喷托维林
- B: 美酚伪麻
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：C

16. 作用于 DNA 化学结构的药物

- A: 依托泊苷
- B: 顺铂
- C: 培美曲塞
- D: 放线菌

答案：B

17. 队列研究试验结果属于循证医学证据级别

- A: 2 级证据
- B: 3 级证据
- C: 1 级证据
- D: 4 级证据

答案：A

18. 用于紧急避孕的药物是

- A: 左炔诺孕酮
- B: X 睾酮
- C: 黄体酮
- D: 罗格列酮

答案：A

19.（2021 年真题）在一定范围内,其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是（）

- A: LDL-C
- B: HbA1c
- C: HDL-C
- D: TG

答案：C

20. 香豆素类抗凝血药

- A: 华法林
- B: 氯吡格雷
- C: 利伐沙班
- D: 肝素

答案：A

21.（2017 年真题）患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防,宜选用的抗血小板药物是（）

- A: 华法林
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

22. 属于药物信息服务的最重要的部分的是

- A: 确立有效的检索方法、查阅文献
- B: 对文献进行评价、分析和整理
- C: 对问题进行确定并归类

D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案: D

23. 某患者需要注射维生素 B

A: 1/2 支

B: 3/2 支

C: 1 支

D: 3/4 支

答案: A

24. 可卡因属于

A: β 受体阻断剂

B: 精神刺激剂

C: 利尿剂

D: 麻醉药品

答案: B

25. 从事药学服务的药师应具备沟通能力，此项要求的重要性不包括

A: 是药师实施药学服务的基本技能

B: 可提高患者用药的依从性和满意度

C: 可杜绝投诉事件

D: 可使患者获得有关的用药指导

答案: C

26. 属于整合酶抑制剂(II)进入抑制剂的是

A: 扎西他滨

B: 沙奎那韦

C: 奈韦拉平

D: 恩夫韦替

答案: D

27. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

A: 睡前

B: 清晨

C: 餐前

D: 餐后

答案: D

28. 下列药物不良事件中,属于假、劣药品事件的是

A: “康泰克 PPA 事件”

B: “亮菌甲素事件”

C: “万络(罗非昔布)事件”

D: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”

答案: B

29. 用于氰化物中毒解救的药物是

A: 亚甲蓝

B: 碘解磷定

C: 阿托品

D: 毛果芸香碱

答案: A

30. 《中国药学文摘》属于

A: 一级信息源

- B: 原始信息源
- C: 三级信息源
- D: 二级信息源

答案：D

31. (2018 年真题) 患者, 男, 69 岁, 因高血压长期服用抗高血压药, 近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是 ()

- A: 多沙唑嗪
- B: 非洛地平
- C: 普萘洛尔
- D: 卡托普利

答案：B

32. 黄体酮用于排石, 属于

- A: 超适应证用药
- B: 无适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 不合理联合用药

答案：A

33. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分, 并在处方右上角以文字注明。

- A: 淡橙色
- B: 淡黄色
- C: 淡绿色
- D: 淡红色

答案：B

34. 鲜血便主要见于（）

- A: 小肠炎症
- B: 霍乱
- C: 下消化道出血
- D: 慢性菌痢

答案：C

35. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 硝苯地平
- B: 硝普钠
- C: 西地兰
- D: 多索茶碱

答案：C

36. 下列口腔溃疡治疗药物可降低毛细血管的通透性，减少炎症的渗出的是

- A: 冰硼散
- B: 维生素 C
- C: 地塞米松黏贴片
- D: 甲硝唑含漱剂

答案：C

37. 吸烟后延缓胃溃疡的愈合，而加重出的药物是

- A: 呋塞米
- B: 西咪替丁
- C: 氯丙嗪
- D: 胰岛素

答案：B

38. (2016 年真题) 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

- A: 氯吡格雷片
- B: 华法林片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 双嘧达莫片

答案：A

39. 与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

- A: 阿司匹林
- B: 铝碳酸镁
- C: 伏立康唑
- D: 维生素 B

答案：A

40. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

- A: 部分确认的信号
- B: 驳倒的信号
- C: 尚不确定的信号
- D: 确认的信号

答案：D

41. (2015 年真题) 下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是 ()。

- A: 消渴丸+格列本脲片
- B: 新癬片+吲哚美辛胶囊
- C: 脉君安片+氢氯噻嗪片
- D: 曲克芦丁片+维生素 C 片

答案: D

42. 延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 头孢哌酮 / 舒巴坦复方制剂
- B: 磷霉素联用其他抗菌药物
- C: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- D: 硫酸阿托品联用吗啡

答案: B

43. 餐中服用，可以减少对胃肠道刺激的药品是

- A: 复方铝酸铋片
- B: 甲氧氯普胺片
- C: 瑞舒伐他汀片
- D: 二甲双胍片

答案: D

44. 药物对孕妇的不良影响中，甲氨蝶呤可引起 ()。

- A: 死胎
- B: 畸形
- C: 溶血
- D: 流产

答案: B

45. 结核病、水痘、麻疹、百日咳、流行性腮腺炎等传染病可呈现

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 中性粒细胞增多
- C: 淋巴细胞增多
- D: 单核细胞增多

答案：C

46. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

- A: 维生素 B6
- B: 维生素 K1
- C: 阿托品
- D: 乙酰胺

答案：B

47. 可用于强心苷类中毒后快速型心律失常的药物是

- A: 利多卡因
- B: 阿托品
- C: 异丙肾上腺素
- D: 胺碘酮

答案：A

48. 某患者，女性，57 岁，高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 阿托品
- B: 肾上腺素

C: 利多卡因

D: 苯妥英钠

答案：A

49. 滴虫性阴道炎宜选用

A: 庆大霉素

B: 甲硝唑

C: 林可霉素

D: 制霉菌素

答案：B

50. 依据“处方”的含义及其重要意义，属于处方范畴的医疗文书是

A: 药品出库单

B: 病区领药单

C: 病区用药医嘱单

D: 临床诊断书

答案：C

51. (2018 年真题) 患儿，男，50 天，体重 5kg，时值夏季，体温 37.9℃，出现烦躁，哭闹不安，无其他症状。其家人到药店询购买退热药，药师应推荐 ()

A: 阿苯片，半片，研碎后溶于少量温开水服

B: 对乙酰基酚片 (500mg) 1/10 片，溶于少量温开水服用

C: 阿司匹林泡腾片 (500mg) 1/10 片，溶于少量温开水服用

D: 减少衣被，可物理降温或必要时就诊

答案：D

52. 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 依那普利
- C: 氨氯地平
- D: 美托洛尔

答案：A

53. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可以选用的止吐药是

- A: 昂丹司琼
- B: 维生素 B6
- C: 奥美拉唑
- D: 雷尼替丁

答案：A

54. 服用磺胺甲噁唑不宜同食

- A: 咖啡
- B: 食醋
- C: 高蛋白食物
- D: 葡萄柚汁

答案：B

55. 服药饮酒可致使低血糖、呼吸抑制的是

- A: 普萘洛尔
- B: 吲哚美辛
- C: 甲氨蝶呤
- D: 格列本脲

答案：D

56. 《中国国家处方集》编写的主要方法是

- A: 以病带药
- B: 以药带病
- C: 中西医结合
- D: 中西药结合

答案：A

57. 用于轻度内痔属风热及湿热下注所致的少量便血、肛门肿痛、下坠感的药物是

- A: 痔康片
- B: 九味痔疮胶囊
- C: 草木犀流浸液片
- D: 金玄痔科熏洗散

答案：A

58. (2018 年真题) 患者, 男, 40 岁, 因感冒所致鼻塞到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 萘甲唑啉滴鼻液
- B: 氯苯那敏片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 酚麻美敏片

答案：A

59. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂, 遇到 ADR 时, 需要进行因果关系评价。患者, 男, 45 岁, 因男性乙型肝炎给予干扰素治疗, 治疗 1 个月后, 患者出现脱发, 停用干扰素后, 脱发症状好转, 再次给予干扰素治疗, 患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是 ()

- A: 很可能

- B: 肯定
- C: 可能无关
- D: 可能

答案：B

60. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 普通胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 预混胰岛素

答案：A

61. 患者，女，55 岁，患骨质疏松症伴食管裂孔疝，该患者避免使用的治疗药是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 特立帕肽
- C: 雷洛昔芬
- D: 鲑鱼降钙素

答案：A

62. 患者，男，60 岁。因面部出现慢性湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 10%樟脑软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 他克莫司软膏
- D: 利巴韦林软膏

答案：C

63. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 格列本脲
- B: 泼尼松
- C: 硫酸亚铁
- D: 西咪替丁

答案：A

64. 适用于已切除子宫的妇女()

- A: 单纯孕激素补充治疗
- B: 雌孕激素连续联合用药
- C: 雌孕激素序贯用药
- D: 单纯雌激素补充治疗

答案：D

65. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 利伐沙班
- B: 阿司匹林
- C: 肝素
- D: 氯吡格雷

答案：B

66. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 卡托普利
- B: 硝普钠

C: 毛花苷丙

D: 阿替洛尔

答案: C

67. (2016 年真题) 荨麻疹患者常出现 ()。

A: 血红蛋白减少

B: 中性粒细胞增多

C: 血小板计数增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案: D

68. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体: 体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果: 白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断: 社区获得性肺炎。

A: 哌拉西林他唑巴坦

B: 头孢哌酮舒巴坦

C: 莫西沙星

D: 阿奇霉素

答案: C

69. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

A: 二甲双胍

B: 罗格列酮

C: 格列喹酮

D: 阿卡波糖

答案: A

70. 评价肾功能的可靠指标是

- A: 尿素氮
- B: 尿液肌酐
- C: 血清肌酐
- D: 尿液酸碱度

答案：C

71. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体：体温 38℃，中上及左上腹有压痛。化验结果：白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶 1993U/L，血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是

- A: 急性胆囊炎
- B: 急性胃炎
- C: 急性胰腺炎
- D: 急性阑尾炎

答案：C

72. 不可随意间断用药、停药、换药

- A: 适量
- B: 规律
- C: 联合
- D: 早期

答案：B

73. (用药与尿液检查异常) 氨丁三醇可能引起

- A: 尿蛋白
- B: 尿液隐血

C: 尿胆红素

D: 尿液 pH 增高

答案：D

74. 可以杀伤结核分枝杆菌，最大限度地降低传染性的早期杀菌活性药是

A: 乙胺丁醇

B: 莫西沙星

C: 氧氟沙星

D: 氨苄西林

答案：A

75. 含有马兜铃酸的中药，可引起典型药源性疾病是

A: 消化性溃疡

B: 溶血性贫血

C: 慢性肾衰竭

D: 粒细胞减少症

答案：C

76. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

A: 红细胞丢失过多

B: 红细胞生成过多

C: 红细胞生成减少

D: 血红蛋白生成减少

答案：C

77. 作用于核酸转录的药物是

A: 依托泊苷

B: 培美曲塞

C: 放线菌

D: 顺铂

答案: C

78. 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h，已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是()

A: 50 滴

B: 7 滴

C: 25 滴

D: 15 滴

答案: C

79. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

A: 尿沉渣结晶

B: 尿血红蛋白

C: 尿酮体

D: 尿肌酐

答案: B

80. 患者，男性，35 岁，因间断上腹痛 5 年、加重 1 周来诊。患者自 5 年前开始间断出现上腹胀痛，空腹时明显，进食后可自行缓解，有时夜间痛醒，无放射痛，有暖气和反酸，常因进食不当或生气时诱发，每年冬春季节易发病。1 周前因吃凉白薯后病情再犯，腹痛较前加重。发病以来无恶心、呕吐和呕血，饮食尚可，二便正常，无便血和黑便，体重无明显变化。既往体健，无肝肾疾病及胆囊炎和胆石症病史，无手术、外伤和药物过敏史，无烟酒嗜好。

A: 化学物质的刺激

B: 胃窦部幽门螺杆菌感染

C: 吸烟

D: 遗传因素

答案：B

81. 对缺铁性贫血者应选用

A: 甲磺酸去铁胺

B: 叶酸+维生素 B

C: 富马酸亚铁

D: 维生素 K

答案：C

82. 妊娠中、晚期妇女禁用的药品是

A: 硫糖铝

B: 乳酸菌素

C: 沙利度胺

D: 阿司匹林

答案：D

83. 肾脏功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体液容量和成分，维持机体内环境（血压、内分泌）的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害，均可影响肾功能。

A: $18\sim 35\ \mu\text{mol/L}$

B: $53\sim 97\ \mu\text{mol/L}$

C: $18\sim 62\ \mu\text{mol/L}$

D: $45\sim 84\ \mu\text{mol/L}$

答案：A

84. 解救有机磷中毒的是

- A: 二巯丁二钠
- B: 盐酸戊乙奎醚
- C: 单价抗毒血清
- D: 亚硝酸异戊酯

答案：B

85. 下列情况的首选药物是高 TC 血症（）

- A: 胆酸螯合剂+贝特类
- B: 他汀类
- C: 贝特类
- D: 弹性酶

答案：B

86. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 浓茶
- B: 烟
- C: 咖啡
- D: 酒

答案：D

87. 降低痰液黏度，使痰液易于排出的药品是

- A: 可待因
- B: 羧甲司坦
- C: 右美沙芬
- D: 苯丙哌林

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/017113200052010024>