

2024 年广东省龙门县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试真题题库【轻巧夺冠】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 膀胱炎占尿路感染的 60%以上，致病菌多为

- A: 大肠埃希菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: 淋病奈瑟菌
- D: 白假丝酵母菌

答案：A

2. 不易产生耐受性，对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群，推荐长期维持治疗的抑酸剂是

- A: 伊托必利
- B: 法莫替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 泮托拉唑

答案：D

3. （2019 年真题）患者，男，56 岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体：舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降，下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是

- A: 氨氯地平
- B: 奥美拉唑
- C: 对氨基水杨酸

D: 二甲双胍

答案：A

4. 可引起性功能障碍的药物是

A: 沙美特罗

B: 度洛西汀

C: 西地那非

D: 维生素 E

答案：B

5. 以下患者中，最适宜口服给药的是

A: 病情危重的患者

B: 吞咽困难的老人

C: 胃肠反应大的患者

D: 慢性病或轻症患者

答案：D

6. 与黄连上清丸不宜联用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 氨茶碱

C: 乳酶生

D: 氢氧化铝

答案：C

7. 解救汞中毒的是 ()

A: 二巯丙醇

B: 单价抗毒血清

C: 盐酸戊乙奎醚

D: 依地酸钙钠

答案：A

8. 处方中“溶液”的规范书写是

A: Mist

B: Dos

C: Liq

D: Dil

答案：C

9. 可用于强心苷类中毒后快速型心律失常的药物是

A: 胺碘酮

B: 异丙肾上腺素

C: 利多卡因

D: 阿托品

答案：C

10. 患者，女，58岁，罹患肺癌，术后化疗3次，半年后复发，决定使用安罗替尼12mgqd 靶向治疗，既往有乙型肝炎病史，患者用药期间应密切监视的特殊不良反应是

A: 乙型肝炎复发

B: 腹泻

C: 出血

D: Q—T 间期延长

答案：C

11. 控制被经济利益驱动的过度药物治疗体现

A: 安全性

- B: 经济性
- C: 有效性
- D: 规范性

答案：B

12. 以下对各类处方的描述中，不正确的是

- A: 普通处方印刷用纸为白色，右上角无标注
- B: 第二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注“精二”
- C: 儿科处方印刷用纸颜色为淡绿色、右上角标注“儿科”
- D: 麻醉药品处方印刷用纸颜色为淡红色、右上角标注“麻醉”

答案：D

13. 患者，女，57 岁，患骨质疏松症伴 Paget 病，该患者避免使用的治疗药是

- A: 特立帕肽
- B: 鲑鱼降钙素
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 雷洛昔芬

答案：A

14. 属于脂溶性维生素的是

- A: 维生素
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 B1
- D: 维生素

答案：D

15. (2016 年真题) 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd，患者用药期间应定期监测的生化指标是 ()。

- A: ALT
- B: RBC
- C: BUN
- D: Hb

答案：A

16. 所有的 UA/NSTEMI 患者均应尽早使用阿司匹林，首次服用剂量为 ()

- A: 100mg
- B: 75mg
- C: 300mg
- D: 150mg

答案：C

17. 异环磷酰胺的主要毒副作用是 ()

- A: 溶血性尿毒症
- B: 肺纤维化
- C: 出血性膀胱炎
- D: 心脏毒性

答案：C

18. 减少不良反应的配伍用药是

- A: 纳洛酮用于解救吗啡中毒
- B: 阿托品联用吗啡镇痛
- C: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性
- D: 应用地高辛与氢氯噻嗪

答案：B

19. 急性肾盂肾炎常见

- A: 细胞管型
- B: 白细胞管型
- C: 颗粒管型、透明管型
- D: 蜡样管型

答案：B

20. 患儿，女，5岁，误服香豆素类杀鼠药。可选用的解救药物是

- A: 维生素 K
- B: 亚甲蓝
- C: 纳洛酮
- D: 二巯丙醇

答案：A

21. 轻度贫血，Hb 为（）

- A: 90~120g/L
- B: 小于 60g/L
- C: 60~90g/L
- D: 60~120g/L

答案：A

22. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

- A: 利巴韦林可致畸与肿瘤

- B: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- C: 地高辛用于肾功能不全患者
- D: 替加色罗存在心绞痛风险

答案：C

23. 口服给药方便、安全、经济，以下患者中，最适宜口服给药的是

- A: 吞咽困难的老年人
- B: 慢性病或轻症患者
- C: 病情危重的患者
- D: 胃肠反应大的患者

答案：B

24. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 肌病
- B: 神经系统疾病
- C: 血液系统疾病
- D: 胃肠道反应

答案：B

25. 杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: 浅表性胃炎？
- B: 萎缩性胃炎？
- C: 胃溃疡？
- D: 十二指肠溃疡？

答案：D

26. 流行性结膜炎可选用

- A: 0.1%羟苄唑滴眼剂
- B: 四环素眼膏
- C: 2%色甘酸钠滴眼剂
- D: 0.1%碘苷滴眼剂

答案：D

27. 治疗缺铁性贫血的首选药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 维生素 B12
- C: 叶酸
- D: 维生素 C

答案：A

28. 下列药品中，与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

- A: 碳酸钙
- B: 地西泮
- C: 巴比妥
- D: 维生素 C

答案：B

29. 氟马西尼用于解救的是（）

- A: 三唑仑中毒
- B: 有机磷中毒
- C: 氰化物中毒
- D: 汞中毒

答案：A

30. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

- A: 50~120 $\mu\text{g}/\text{d}$
- B: 50~100 $\mu\text{g}/\text{d}$
- C: 30~120 $\mu\text{g}/\text{d}$
- D: 30~100 $\mu\text{g}/\text{d}$

答案：A

31. 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是()

- A: 选用 ^{131}I 治疗
- B: 甲状腺次全切除手术
- C: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- D: 碘化钾治疗，定期复查

答案：C

32. 关于药物作用相加或增加疗效的举例，克拉维酸钾、舒巴坦为 β -内酰胺酶抑制剂，使青霉素类、头孢菌素类等 β -内酰胺类抗生素免受开环破坏，抗菌疗效增强。是属于

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 保护药品免受破坏
- C: 作用于不同的靶位
- D: 促进机体的吸收利用

答案：B

33. 利大于弊才有实际意义体现

- A: 安全性

- B: 有效性
- C: 经济性
- D: 规范性

答案：B

34. 在药物信息咨询服中，二级信息资料最突出的优势是

- A: 对某一个具体问题提供的信息全面、详实
- B: 能够很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选
- C: 提供的信息最新
- D: 读者能够自己评价信息，免受他人观点影响

答案：B

35. 重度哮喘的处理不包括

- A: 吸氧
- B: 注射毛花苷 C（西地兰）
- C: 补液
- D: 给予糖皮质激素

答案：B

36. 属于渗透性泻药，成人起始剂量每日 30ml，早餐时一次性服用，糖尿病患者应慎用的是

- A: 比沙可啶
- B: 乳果糖
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 欧车前

答案：B

37. (2021 年真题) 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲巯咪唑
- D: 阿托伐他汀

答案：D

38. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

- A: 甲氧氯普胺注射液
- B: 尼莫地平注射液
- C: 硫酸镁注射液
- D: 葡萄糖酸钙注射液

答案：C

39. (2018 年真题) 患者，女，30 岁，因感冒所致发热（体温 38.5℃）并伴有头痛、全身酸痛到药店购药，药师应推荐的药品是 ()

- A: 酚麻美敏片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 氯苯那敏片
- D: 萘甲唑啉滴鼻液

答案：B

40. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 WBC15X10⁹ / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 首选针对革兰阳性菌的药物

B: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

C: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

D: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

答案：A

41. 患者，男，54 岁，患冠心病 3 年，长期服用阿司匹林，近几天肢体多处出现瘀斑，故前来就诊。实验室检查：PLT $70 \times 10^9 / L$ 。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

A: 阿司匹林

B: 碳酸锂

C: 磺胺异噁唑

D: 氯霉素

答案：B

42. 患者，女，48 岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是()

A: 甲氧氯普胺片

B: 多潘立酮片

C: 酵母片

D: 乳酶生片

答案：D

43. 利尿降压药的常见不良反应是

A: 体位性低血压

B: 咳嗽

C: 首剂现象

D: 水、电解质紊乱

答案：D

44. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 雌孕激素
- C: 氮芥类
- D: 沙立度胺

答案: D

45. 皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

- A: 20~30min
- B: 5~10min
- C: 10~20min
- D: 15~30min

答案: D

46. 孕妇过量服用可诱发新生儿坏血病的药物是

- A: 维生素 AD
- B: 维生素
- C: 复合维生素 B
- D: 葡萄糖酸钙

答案: B

47. 不可逆地抑制环氧化酶，可以用于降低心肌梗死、脑卒中和心血管死亡的发生风险的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 美托洛尔
- C: 硝酸甘油

D: 阿司匹林

答案: D

48. 隔日一次用药的外文规范缩写的是

A: q. n

B: q. o. d

C: q. d

D: q. h

答案: B

49. 胆酸螯合剂

A: 辛伐他汀

B: 吉非贝齐

C: 考来烯胺

D: 阿昔莫司

答案: C

50. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

A: 维生素

B: 格列本脲

C: 西咪替丁

D: 硫酸亚铁

答案: B

51. 无并发症的普通感冒一般几天后可痊愈

A: 5~10 日

B: 5~7 日

C: 3~4 日

D: 2~3 日

答案: B

52. 患者，女，55 岁，因家庭变故，情绪低落，晨起后较严重，近三个月有自杀倾向就诊，诊断为抑郁症，患者既往有高血压、冠心病史 5 年，目前服用卡托普利片、硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙片。本次就诊，医师处方文拉法辛缓释片 150mgqdp0，谷维素片 10mg tidpo 治疗，患者用药后出现血压升高，可能导致该患者血压升高的药物是

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 卡托普利片
- C: 谷维素片
- D: 文拉法辛缓释片

答案: D

53. 根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为 (??)

- A: 2000—4000mg
- B: 100mg
- C: 500—600mg
- D: 50mg

答案: C

54. 可引起血清尿素氮增高的是

- A: 肾衰竭
- B: 胃溃疡
- C: 严重肝病
- D: 急性胰腺炎

答案: A

55. 由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物

- A: 须谨慎使用，必要时减量给药
- B: 一般无须调整剂量
- C: 必须减量应用
- D: 尽可能避免使用

答案：A

56. 酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

- A: 血压升高
- B: 血糖不降
- C: 低血糖反应
- D: 过敏反应

答案：C

57. 下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

- A: 需要重新选择药品或调整用药方案者
- B: 肝肾功能不全者
- C: 药物治疗窗窄、需要做监测者
- D: 应用特殊剂型者

答案：B

58. 与环丙沙星有相互作用，合并使用时应做血药浓度监测的药物是

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 茶碱片

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案: B

59. 患者 12 岁，近 1 周夜间持续咳嗽宜首选

A: 盐酸吗啡？

B: 苯丙哌林？

C: 右美沙芬？

D: 羧甲司坦？

答案: C

60. 患者，男，50 岁，主诉咳嗽，症状持续 8 天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期末患其他疾病。患者 14 岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温 37.1℃、心率 70 次 / 分、血压 130 / 70mmHg、呼吸 18 次 / 分，动脉血氧饱和度为 98%，肺部可闻及喘鸣音。

A: 桉柠蒎肠溶软胶囊 300mg / 次 qd

B: 氨溴索片 30mg / 次 tid

C: 阿奇霉素片 500mgqd

D: 右美沙芬片 30mg tid

答案: B

61. 因可提高血液携氧量，被长跑运动员用于提高成绩，因而被列为兴奋剂管理的药物是()

A: 可卡因

B: 甲睾酮

C: 哌替啶

D: 人促红素

答案: D

62. 心力衰竭伴心绞痛应首选的药物是

A: 硝酸甘油

B: 美托洛尔

C: 单硝酸异山梨酯

D: 氨氯地平

答案: B

63. 患者因阴道瘙痒和阴道分泌物增多 3 天，自行到药店咨询和购买治疗药物。药师询问患者病史，了解患者阴道分泌物多且呈豆腐渣样，既往未出现过类似分泌物，无其他不适。经验治疗方案首选

A: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日

B: 克霉唑制剂，1 粒（500mg），单次用药

C: 2%克林霉素软膏 5g，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日

D: 甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日

答案: B

64. 代表乙型肝炎病毒核心抗体的是

A: HBcAb

B: HBeAg

C: HBsAb

D: HBeAb

答案: A

65. “以快速、准确地获得问询问题答案”的咨询服务方法步骤是

- A: 对文献进行评价、分析和整理
- B: 确立有效的检索方法、查阅文献
- C: 对问题进行确定并归类
- D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：A

66. 体操运动员使用后，可减慢心率、减少心肌耗氧量，消除比赛前紧张心理，因此被列入兴奋剂管理的药物是

- A: 阿替洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依那普利
- D: 利血平

答案：A

67. 流行性感冒发病后 48 小时内使用效果最好的抗病毒药是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 奥司他韦
- C: 布洛芬
- D: 金刚烷胺

答案：B

68. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素

。

- A: 药理作用
- B: 药物制剂因素
- C: 药动学相互作用

D: 药物的使用

答案：B

69. 审核处方的合法性、规范性与用药的适宜性

A: 处方点评

B: 静脉药物配置

C: 处方审核

D: 治疗药物监测

答案：C

70. (2018 年真题) 婴幼儿腹泻,服用地衣芽孢杆菌活菌制剂,正确的使用方法是 ()

A: 用温水调服

B: 清晨服用

C: 舌下含服

D: 应同时碱化尿液

答案：A

71. 检查注射剂的澄明度与口服溶液剂的色泽和澄清度属于

A: 触觉试验

B: 听觉试验

C: 视觉试验

D: 嗅觉试验

答案：C

72. 前记

A: 临床诊断、费别

B: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

C: 主要实验室数据

D: 医师签名、药品金额

答案: A

73. 可提供摘要、引文、索引及目录的信息属于

A: 四级信息

B: 三级信息

C: 二级信息

D: 一级信息

答案: C

74. 下述“质子泵抑制剂的合理应用与治疗监护点”中，不正确的是（
）

A: 妊娠及哺乳期妇女、儿童禁用

B: 肝功能障碍患者慎用

C: 高龄患者慎用

D: 多数为肠溶制剂，服药时不宜嚼碎

答案: A

75. FBG 较高者宜选用作用快且强的药物是

A: 格列吡嗪控释片

B: 格列本脲

C: 甲苯磺丁脲

D: 格列喹酮

答案: B

76. 患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 多潘立酮片
- B: 甲氧氯普胺片
- C: 干酵母片
- D: 乳酶生片

答案：C

77. 应贮存在凉暗处的药物是

- A: 硫酸亚铁片
- B: 头孢拉定
- C: 托烷司琼注射剂
- D: 重组人促红细胞生成素

答案：C

78. 能使人长时间忍受肌肉疼痛的是

- A: 利尿剂
- B: 肽类激素
- C: 蛋白同化激素
- D: 麻醉药品

答案：D

79. 下列高血压的降压目标普通高血压患者

- A: $<130/80\text{mmHg}$
- B: $<140/90\text{mmHg}$
- C: $<120/80\text{mmHg}$
- D: $<150/80\text{mmHg}$

答案：B

80. 给失眠患者开具地西泮，医师应采用的处方纸是

- A: 淡黄色处方纸
- B: 白色、右上角有标识处方纸
- C: 淡绿色处方纸
- D: 白色、右上角无标识处方纸

答案：B

81. 服用左旋多巴不宜同食

- A: 咖啡
- B: 葡萄柚汁
- C: 食醋
- D: 高蛋白食物

答案：D

82. 白天咳嗽宜选用的药品是

- A: 苯丙哌林
- B: 羧甲司坦
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：A

83. 可致体重增加的抗癫痫药为（）

- A: 苯妥英钠
- B: 丙戊酸钠
- C: 左乙拉西坦
- D: 苯巴比妥

答案：B

84. 结肠癌

- A: 白细胞增多
- B: 红细胞
- C: 真菌
- D: 上皮细胞

答案：B

85. (2019 年真题) 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 莫沙必利片
- B: 头孢辛酯片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 伊马替尼片

答案：A

86. 下列关于抗失眠药物治疗策略的说法，正确的是

- A: 焦虑障碍患者存在失眠时，以抗失眠药物治疗为主
- B: 失眠继发于或伴发于其他疾病时，应同时治疗原发或伴发疾病
- C: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮革类抗失眠药
- D: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

答案：B

87. 可引起尿肌酐减少的是

- A: 病毒性肝炎
- B: 再生障碍性贫血
- C: 肾小球肾炎
- D: 肺结核

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/017130133052010024>