

练习题

姓名：_____ 部门：_____ 成绩：_____

- 1、日本、澳大利亚等国的社区卫生服务的运行机制是
 - A、全民免费的国家医疗保健服务
 - B、社会医疗保险为主的医疗保障制度
 - C、商业医疗保险为主的医疗保障制度
 - D、全民自费的医疗保健服务
 - E、以上都不正确
- 2、对于一种危害严重的疾病,采取针对病因的措施后,评价其预防效果的指标是
 - A、死亡率
 - B、病死率
 - C、发病率
 - D、患病率
 - E、续发率
- 3、疾病流行是指
 - A、疾病在短时间发病率陡然上升,随即下降到以往水平
 - B、发病率较低,但经常在某人群存在
 - C、疾病的发生,明显地超过当地人群的一般发病水平
 - D、暴发过程的延续
 - E、以上均不正确
- 4、新时期医改工作的三大原则是
 - A、以人为本

B、保基本

C、强基层

D、建机制

E、B+C+D

5、以下哪项不属于儿童常规免疫疫苗

A、卡介苗

B、丙肝疫苗

C、乙脑疫苗

D、麻风疫苗

E、脊髓灰质炎疫苗

6、关于学校健康促进的特征的表述，哪项是错误的

A、通过学生家长和社会的共同参与、合作，可创造支持性环境

B、通过改善物质环境促进学生的健康状况

C、强调学生主动参与正规健康课程，以发展健康知识和技能

D、开展以教师为主导的健康教育

E、应用身体心理社会和环境等多方面完整一体的健康模式

7、根据国家卫生计生委规定,具有中级或中级以上专业技术职务的技术人员每年

都应参加继续医学教育活动,取得多少学分

A、10 学分

B、15 学分

C、20 学分

D、25 学分

E、30 学分

8、安静时血压未能很好控制或超过()mmHg 的高血压病人应暂时禁止中度及以上强度的运动

A、130/85

B、140/90

C、160/100

D、180/110

E、120/90

9、以病人为中心的接诊模式包括

A、站在病人的角度倾听

B、向病人和家属解释对健康问题的诊断

C、与病人进行讨论和沟通

D、与病人共同制订诊疗计划

E、以上都是

10、医生应具备的信息素质内涵为

A、信息意识

B、信息检索能力

C、信息评价和有效利用

D、信息道德

E、以上都对

11、住院高血糖诊断标准为

A、病人住院期间任意时点的血浆葡萄糖水平>11mmol/L

- B、病人住院期间空腹血浆葡萄糖水平>6.1mmol/L
- C、病人住院期间任意时点的血浆葡萄糖水平>7.8mmol/L
- D、病人住院期间任意时点的血浆葡萄糖水平>6.1mmol/L
- E、以上都不是

12、下列哪项生活方式或生活环境不是骨质疏松的危险因素

- A、长期卧床
- B、酗酒
- C、体力活动过少
- D、充足日照
- E、吸烟

13、上消化道大出血最常见病因是

- A、消化性溃疡
- B、食管胃底静脉曲张破裂
- C、急性糜烂出血性胃炎
- D、胃癌
- E、食管贲门黏膜撕裂伤

14、吸烟可引起多种致死性疾病，不包括

- A、慢阻肺
- B、结核
- C、肺癌
- D、脑血管疾病
- E、缺血性心肌病

15、孟鲁司特不用于下列哪项治疗

- A、轻度哮喘 ICS 的替代治疗
- B、单独治疗重度哮喘
- C、阿司匹林哮喘
- D、伴有过敏性鼻炎哮喘
- E、运动性哮喘

16、超声检查肝脏最常用的体位是

- A、左侧卧位
- B、右侧卧位
- C、坐位
- D、仰卧位
- E、半坐位

17、急性痛风发作，多久后会达到最大强度

- A、1~2 天
- B、8~12 小时
- C、12--24 小时
- D、1~2 小时
- E、以上都不是

18、Murphy 征阳性见于

- A、急性胰腺炎
- B、急性阑尾炎
- C、急性胆囊炎

D、消化性溃疡

E、急性肝炎

19、关于巨细胞动脉炎的诊断,不正确的是

A、颞动脉病理检查提示血管炎

B、颞动脉有压痛,搏动增强

C、明显头痛

D、血沉增快

E、多发生于 50 岁以上

20、扩张型心肌病的主要表现是

A、心尖部收缩期杂音

B、心脏扩大,搏动弥漫性减弱

C、第三心音或第四心音

D、心音减弱

E、下肢水肿

21、尿道损伤最常见的症状是

A、疼痛

B、尿道出血

C、排尿困难

D、尿潴留

E、尿外渗

22、人体的运动功能位置在前中央回的排列是

A、头面在上部,下肢在下部

- B、躯体在上部，头面在下部
- C、下肢在上部，头面在下部
- D、头面在上部.上肢在下部
- E、上述排列均不对

23、哪项不是引起肾前性急性肾损伤的原因

- A、创伤、术或出血
- B、剧烈呕吐，腹泻或过度利尿
- C、心力衰竭
- D、大量应用血管扩张剂
- E、双侧尿路梗阻或孤立肾单侧尿路梗阻

24、可诊断骨质破坏的 X 线表现是

- A、骨密度减低
- B、骨小梁模糊
- C、骨小梁变细
- D、骨结构紊乱
- E、骨结构消失

25、重度宫颈糜烂病人,宫颈刮片为巴氏III级，下一步处理应是

- A、3 个月后复查宫颈刮片
- B、激光治疗
- C、宫颈锥形切除
- D、重复刮片并取宫颈活体组织送检
- E、无须处理

26、脑干病变的最特征性临床表现是

- A、意识障碍
- B、常有剧烈面痛
- C、瞳孔孔常散大
- D、上下肢瘫痪在面瘫的对侧
- E、三偏综合征

27、有关腹痛的叙述，哪项是错误的

- A、空腔脏器的痉挛或者扩张可引起腹痛
- B、右上腹的化学刺激可引起腹痛
- C、腹腔内血管阻塞可引起缺血性腹痛
- D、腹痛均因腹腔内脏病变所致
- E、腹痛原因未明确之前不宜用止痛药

28、下列哪项对缓解老年人便秘不利

- A、多摄入新鲜蔬菜水果
- B、适当户外运动
- C、避免久坐
- D、食物精细
- E、养成定期排便习惯

29、原发性支气管肺癌的发病有关因素，不包括

- A、吸烟
- B、B.噪音
- C、C.空气污染

D、电离辐射

E、饮食与营养

30、胆总管是由下列哪项汇合而成

A、左右肝管

B、Hering 管和小叶间胆管

C、左肝管与胆囊管

D、右肝管与胆囊管

E、肝总管与胆囊管

31、人体达到峰值骨量的年龄大约是

A、20 岁

B、30 岁

C、40 岁

D、50 岁

E、60 岁

32、下列哪项不适合内镜下黏膜切除术

A、高分化的早期胃癌

B、中分化的早期胃癌

C、直径小于 2cm 的早期胃癌

D、无淋巴转移的早期胃癌

E、溃疡型胃癌

33、下列哪项不是新生儿窒息 Apgar 评分的内容

A、皮肤颜色

- B、心率
- C、呼吸
- D、肌张力
- E、拥抱反射

34、美国食品药品监督管理局(FDA)裁定，以下哪种药物必须在说明书中对其在某些人群中的卒中和心肌梗死风险进行警示

- A、用于男性的睾酮替代产品
- B、某些减肥药
- C、用于女性的激素替代治疗(HRT)产品
- D、用于 2 型糖尿病的 SGLT-2 抑制剂
- E、以上都是

35、自体输血禁忌证中,哪项是错误的

- A、可能患败血症或正在使用抗生素者
- B、曾在献血中或献血后 48 小时内发生虚脱可或意识丧失者
- C、肝、肾功能异常或有严重心肺疾病者
- D、贫血、出血和血压偏低者
- E、采血可能诱发自身疾病发作或加重者

36、腹部平片检查最常用于诊断

- A、胃溃疡
- B、肠梗阻
- C、十二指肠憩室
- D、结肠癌

E、食管癌

37、关于糖皮质激素的应用，下列说法错误的是

A、治疗风湿性关节炎小剂量即可，一般不高于泼尼松 10mg/d

B、需要合并使用改善病情的抗风湿药

C、可以在关节炎急性期应用起到搭桥作用

D、对 NSAIDS 药物无效的病人，能迅速缓解关节症状

E、关节腔内注射作用小，可以反复进行

38、慢性阻塞性肺病稳定期的治疗,不包括

A、抗生素治疗

B、支气管扩张剂

C、糖皮质激素

D、祛痰药

E、教育和劝导病人戒烟，脱离污染环境

39、巨大十二指肠球部溃疡发生部位常在

A、后壁

B、前壁

C、上壁

D、下壁

E、均可

40、关于新生儿常见的几种生理状态，哪项是错误的

A、生理性黄疸

B、马牙

C、乳腺肿大

D、红臀

E、假月经

41、下列哪项不符合尿道综合征

A、常见于女性

B、有尿频、尿急、尿痛

C、有排尿不适

D、可为衣原体感染

E、尿细菌培养阳性

42、原发性三叉神经痛病人

A、面部痛觉减退

B、咀嚼肌萎缩

C、角膜反射减弱

D、张口下颌偏斜

E、有疼痛触发点

43、首次发生的急性肾盂肾炎

A、致病菌 80% 为大肠埃希菌

B、均需静脉给药

C、不必留取尿细菌检查标本可立即开始治疗

D、首选青霉素类抗生素

E、72 小时显效者需按药敏结果更改抗生素

44、预防碘缺乏病的首选方法是

A、碘盐

B、碘油

C、碘钙营养片

D、碘

E、

45、新生儿保健的重点应放在

A、生后第 1 周

B、生后 10 天内

C、生后第 2 周

D、生后第 3 周

E、生后第 4 周

46、可引起类癌综合征的肺癌是

A、大细胞癌

B、腺癌

C、鳞癌

D、中间型小细胞肺癌

E、腺鳞癌

47、Felty 综合征不包括

A、血小板减少

B、脾大

C、中性粒细胞增加

D、类风湿关节炎

E、以上都不是

48、动脉导管未闭的特征性体征是

A、心室增大

B、外周血压脉压增宽

C、胸骨左缘听到收缩期和舒张期杂音二音亢进

D、胸骨左缘听到连续性杂音

E、肺动脉瓣区第二音增强

49、特发性血小板减少性紫癜的骨髓象表现是

A、巨核细胞发育成熟障碍

B、红系及粒、巨系病态造血

C、巨核细胞减少

D、有核细胞增生活跃

E、幼稚巨核细胞减少

50、肥厚型梗阻性心肌病的药物治疗首选

A、硝苯地平

B、异山梨酯

C、 β 受体阻滞剂或维拉帕米、地尔硫卓

D、硝普钠

E、地高辛

51、发生动脉粥样硬化最多的动脉是

A、肾动脉

B、冠状动脉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018025037076006036>