

2024 年海南省保亭黎族苗族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题内部题库汇编

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 抑制 H^+ ， K^+ -ATP 酶活性的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 哌仑西平
- C: 氢氧化铝
- D: 雷尼替丁

答案：A

2. 四环素联用麦角生物碱

- A: 口服吸收减少
- B: 肝毒性增加
- C: 增加麦角中毒的风险
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案：C

3. 格列本脲的作用特点是

- A: 抑制胰高血糖素的分泌
- B: 直接抑制肝糖原分解和糖原异生
- C: 增强胰岛素的作用
- D: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

答案：B

4. 可增加维生素 B6 经肾排出量的药物是

- A: 红霉素
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：B

5. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是（）。

- A: 利奈唑胺
- B: 罗红霉素
- C: 头孢曲松
- D: 头孢他啶

答案：D

6. （2021 年真题）渗透性强，可透过甲板，属于吡啶酮类的抗真菌药物是（）

- A: 克霉唑
- B: 特比萘芬
- C: 米卡芬净
- D: 环吡酮胺

答案：D

7. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：C

8. 下述属于第三代 α

A: 十一酸睾酮

B: 哌唑嗪

C: 酚苄明

D: 坦洛新

答案: D

9. 常见体位性低血压的是

A: 十一酸睾酮

B: 非那雄胺

C: 多沙唑嗪

D: 舍尼通

答案: C

10. 已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

A: 注射用柔红霉素

B: 注射用硫酸长春新碱

C: 注射用盐酸博来霉素

D: 紫杉醇注射液

答案: D

11. 可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

A: 羧甲司坦

B: 溴己新

C: 氨溴索

D: 乙酰半胱氨酸

答案: D

12. 他昔莫芬为前药，主要在肝脏经肝药酶代谢，该肝药酶是

A: CYP2C19

B: CYP286

C: CYP2D6

D: CYP3A4

答案: C

13. 可待因与阿片受体阻断剂合用，会出现

A: 戒断症状

B: 依赖性

C: 耐受性

D: 成瘾性

答案: A

14. 以下关于去羟肌苷使用的叙述，错误的是

A: 用药过量无已知的解毒药，但可以通过腹膜透析排出

B: 酮康唑和伊曲康唑需至少在服用本品前两小时服用

C: 同时服用含镁和铝的抗酸药物会加重不良反应

D: 注意外周神经病变，待神经中毒症状消退后患者仍能耐受减量的本品治疗

答案: A

15. 分解痰液中的黏液成分如黏多糖和黏蛋白，使黏痰液化，痰液黏度降低而易于咳出的祛痰药是

A: 氨溴索

B: 氯化铵

C: 表面活性剂

D: 碘化钾

答案：A

16. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是 ()

A: 呋塞米

B: 依他尼酸

C: 托拉塞米

D: 布美他尼

答案：B

17. 伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

A: 更昔洛韦

B: 阿昔洛韦

C: 喷昔洛韦

D: 西多福韦

答案：B

18. 羟孕酮与戊酸雌二醇配伍作长效注射避孕药，每月需肌肉注射次数

A: 2 次

B: 1 次

C: 4 次

D: 3 次

答案：B

19. 适用于轻、中度心力衰竭及左、右心室充盈量高的患者的是

- A: 氯沙坦
- B: 米力农
- C: 氢氯噻嗪
- D: 卡维地洛

答案：C

20. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- B: 定期监测血清维生素 B12 水平
- C: 服药通常需 3-4 周的治疗才达降糖疗效
- D: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

答案：C

21. 以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期只有 7～12min 的药物是

- A: 催乳素
- B: 促肾上腺皮质激素
- C: 促性腺激素
- D: 醋酸去氨加压素

答案：B

22. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次 1 分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

- A: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- B: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服
- C: 硝酸甘油片已经过期
- D: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足

答案：A

23. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

- A: 青蒿素
- B: 氯喹
- C: 噻嘧啶
- D: 哌嗪

答案：D

24. 渗透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

- A: 壬二酸
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 维 A 酸

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

25. (2016 年真题) 会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性 (感觉障碍、痉挛) 的行为是

A: 冷水浴

B: 接触塑料制品

C: 饮用热饮

D: 日光浴

答案: A

26. 伐更昔洛韦口服后在肠道和肝脏中水解为

A: 喷昔洛韦

B: 更昔洛韦

C: 阿昔洛韦

D: 西多福韦

答案: B

27. 螺内酯临床常用于

A: 急性肾功能衰竭

B: 脑水肿

C: 尿崩症

D: 醛固酮升高引起的水肿

答案: D

28. 可致色觉异常的药物是

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 地高辛

D: 硝酸甘油

答案: C

29. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

A: 100mg

B: 80mg

C: 20mg

D: 40mg

答案：B

30. 与多柔比星合用或配伍可增加肝毒性的药物是

A: 阿糖胞苷

B: β 受体阻断剂

C: 甲氨蝶呤

D: 利福平

答案：D

31. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

A: 骨化三醇

B: 葡萄糖酸钙

C: 瑞格列奈

D: 利拉鲁肽

答案：C

32. 红霉素的作用机制是()

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

B: 与核糖体 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

D: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

答案：A

33. 噻托溴铵平喘的主要机制是 ABCDE

A: 抑制白三烯受体

B: 拮抗 M 胆碱受体

C: 阻断腺苷受体

D: 激动肾上腺素 β_2 受体

答案：B

34. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A: 氯喹

B: 替硝唑

C: 喹碘仿

D: 依米丁

答案：A

35. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的主要作用靶点是

A: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

B: Na^+-Cl^- 共转运子

C: 远曲小管近端

D: 磷酸二酯酶

答案：B

36. 属于叶酸类抗代谢类药物的是

A: 吉西他滨

B: 甲氨蝶呤

C: 长春瑞滨

D: 巯嘌呤

答案：B

37. 下列属于钾离子竞争性酸抑制剂的药物是

A: 米索前列醇

- B: 奥美拉唑
- C: 沃诺拉赞
- D: 法莫替丁

答案: C

38. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 ()。

- A: 氢化可的松
- B: 地塞米松
- C: 卤米松
- D: 曲安奈德

答案: C

39. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的药物是

- A: 利拉鲁肽
- B: 阿格列汀
- C: 伏格列波糖
- D: 那格列奈

答案: C

40. 可能导致跟腱断裂和血糖异常的抗菌药物是

- A: 加替沙星
- B: 甲砒霉素
- C: 庆大霉素
- D: 多西环素

答案: A

41. 长期大量服用维生素 B6 会出现

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

- B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：B

42. 患者，女，72 岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

- A: 华法林
- B: 双氯芬酸
- C: 奥美拉唑
- D: 氯吡格雷

答案：A

43. 戒断症状是 5-HT 再摄取抑制剂较常见的不良反应，产生的原因是

- A: 长期服用药物对 5-HT 受体无亲和力
- B: 长期服用致 5-HT、NE、DA 分解增加
- C: 长期服用使脑内 5-HT 受体敏感性下调
- D: 长期服用脑内 5-HT 受体数目减少

答案：C

44. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 上腹胀
- B: 头晕

C: 烧心

D: 上腹痛

答案: B

45. 糖皮质激素的免疫抑制作用是

A: 提高机体对细菌内毒素的耐受力

B: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

C: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

D: 提高中枢神经系统的兴奋性

答案: B

46. 属于 I c 类抗心律失常药的是()

A: 普罗帕酮

B: 胺碘酮

C: 普鲁卡因胺

D: 奎尼丁

答案: A

47. 多柔比星用药后 1~2 日可出现

A: 绿色尿

B: 黄色尿

C: 红色尿

D: 橙色尿

答案: C

48. 与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

A: 螺内酯

B: 氨苯蝶啶

C: 甘露醇

D: 乙酰唑胺

答案：A

49. 可致细胞膜通透性增加，细菌膨胀、溶解死亡的药物是

A: 庆大霉素

B: 替加环素

C: 环丙沙星

D: 多黏菌素

答案：D

50. 兰索拉唑用于治疗胃及十二指肠溃疡的机制是

A: 中和胃酸，升高胃内 pH

B: 保护胃黏膜

C: 抑制 H^+ ， K^+ -ATP 酶

D: 阻断 H_2 受体

答案：C

51. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

A: 淡绿色

B: 红棕色

C: 蓝绿色

D: 深蓝色

答案：B

52. 硝酸甘油含服时应尽量采取的姿势为

A: 侧卧位

B: 坐位

C: 平卧位

D: 立位

答案: B

53. 成人应用 0. 1% 溶液，儿童应用 0. 05% 溶液，这种药物是

A: 赛洛唑啉滴鼻液

B: 羟甲唑啉滴鼻液

C: 酚甘油滴耳液

D: 麻黄碱滴鼻液

答案: A

54. 属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

A: 奥司他韦

B: 恩替卡韦

C: 司他夫定

D: 阿昔洛韦

答案: B

55. (2021 年真题) 属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 ()

A: 艾司西酞普兰

B: 文拉法辛

C: 马普替林

D: 吗氯贝胺

答案: B

56. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素

- A: 慢性胃炎
- B: 骨髓功能抑制者
- C: 心肝肾功能严重障碍者
- D: 妊娠期妇女

答案：A

57. 用药期间应注意监测血气和酸碱平衡的是

- A: 精氨酸
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 复方氨基酸注射液(18AA)

答案：A

58. (2017 年真题) 属于外周多巴胺受体阻断剂, 直接阻断胃肠道多巴胺 D₂ 受体的促胃肠动力药是 ()

- A: 多潘立酮
- B: 昂丹司琼
- C: 莫沙必利
- D: 甲氧氯普胺

答案：A

59. 以下药物治疗高血压时, 给药次数为一日 2 次给药的是

- A: 氨氯地平片
- B: 硝苯地平缓释片
- C: 非洛地平缓释片
- D: 硝苯地平控释片

答案：B

60. 复方氨基酸注射液出现发热、头痛、心悸、寒战等反应，主要是因为

- A: 含有过敏原
- B: 患者的个体差异
- C: 含有的氨基酸种类太多
- D: 静脉滴注速度过快

答案：D

61. 口服不可嚼碎，否则易引起严重口腔溃疡的助消化药物是

- A: 西咪替丁
- B: 氢氧化铝
- C: 胰酶
- D: 乳酸菌素

答案：C

62. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的药物是

- A: 卡托普利
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 地高辛

答案：A

63. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 在体内维持时间短，不代谢
- B: 口服吸收缓慢
- C: 在血中以游离状态存在
- D: 不与血浆蛋白结合

答案：B

64. 硝酸甘油抗心绞痛的机制主要是

- A: 选择性扩张冠脉，增加心肌供血
- B: 阻断 β 受体，降低心肌耗氧量
- C: 减慢心率，降低心肌耗氧量
- D: 扩张静脉，降低前负荷；扩张动脉，降低心肌耗氧

答案：D

65. （2018 年真题）可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化,用于痛风急性发作的药物是（）

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 非布索坦

答案：B

66. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

- A: 利巴韦林
- B: 更昔洛韦
- C: 碘苷
- D: 拉米夫定

答案：A

67. 服用后可能导致口中有氨味，舌苔和大便呈灰黑色的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 硫糖铝
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 西咪替丁

答案：C

68. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 晚餐前
- B: 中午 12 时左右
- C: 下午 4 时左右
- D: 上午 8 时左右

答案：D

69. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 鱼精蛋白
- B: 酚磺乙胺
- C: 氨甲环酸
- D: 甲苯氢醌

答案：B

70. 以上药物镇咳作用最弱的是

- A: 喷托维林
- B: 吗啡
- C: 可待因
- D: 右美沙芬

答案：A

71. 多巴胺受体阻断药的代表药物为()

- A: 托烷司琼
- B: 格雷司琼
- C: 甲氧氯普胺

D: 昂丹司琼

答案: C

72. 属于雌激素类退乳药的是()

A: 他莫昔芬

B: 睾酮

C: 甲羟孕酮

D: 己烯雌酚

答案: D

73. 人体内缺乏维生素 E 时会导致()

A: 脚气病

B: 不孕症

C: 佝偻病

D: 夜盲症

答案: B

74. 可导致"类流感样"反应的药物是()

A: 阿仑膦酸钠

B: 依替膦酸二钠

C: 帕米膦酸二钠

D: 氯屈膦酸二钠

答案: A

75. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

A: 促心率失常反应少

B: 对室上性和室性心律失常均有效

C: 适用于合并器质性心脏病的心率失常

D: 可以用于窦房传导阻滞

答案: D

76. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

A: 竞争性拮抗 H₂ 受体

B: 竞争性拮抗 H₁ 受体

C: 直接中和胃酸

D: 抑制胃壁细胞 H⁺, K⁺-ATP 酶

答案: A

77. 双香豆素与维生素 K

A: 与其竞争结合血浆蛋白

B: 产生协同作用

C: 竞争性对抗

D: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

答案: C

78. 临床常用的以原型药从尿液中排出的中效强心苷类药是

A: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

B: 毛花苷丙（西地兰 C）

C: 地高辛

D: 洋地黄毒苷

答案: C

79. 通过抑制 α -葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

A: 艾塞那肽

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 格列本脲

答案：C

80. 用于抗结核杆菌的药物是

A: 妥布霉素

B: 异烟肼

C: 庆大霉素

D: 新霉素

答案：B

81. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

A: 阿托普利

B: 硝普钠

C: 氨氯地平

D: 阿利克仑（阿利吉仑）

答案：A

82. 甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

A: 大剂量碘

B: 甲巯咪唑

C: 小剂量碘

D: 甲状腺素

答案：B

83. 胆绞痛最好选用

A: 阿托品+哌替啶

B: 阿司匹林

C: 吗啡

D: 阿托品

答案：A

84. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

A: 特拉唑嗪

B: 乙酰唑胺

C: 酚苄明

D: 坦洛新

答案：D

85. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

A: 曲妥珠单抗

B: 利妥昔单抗

C: 西妥昔单抗

D: 贝伐单抗

答案：B

86. 可用于习惯性流产的药品是()

A: 依普黄酮

B: 地屈孕酮

C: 戊酸雌二醇

D: 他莫昔芬

答案：B

87. 法莫替丁可用于治疗

A: 心肌梗死

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 十二指肠溃疡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/018034047044007022>