

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、“熊猫眼征”提示)

- A、颅中窝骨折
- B、颅后窝骨折
- C、颅前窝骨折
- D、颅盖骨折
- E、颅盖线性骨折

【答案】： C

2、2015 心肺复苏指南中胸外按压的频率为 0

- A、至少 80-100 次/分
- B、至少 100 次/分
- C、至少 120 次/分
- D、至少 60-80 次/分
- E、至少 110 次/分

【答案】： B

3、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

- A、食物中毒 3 小时内
- B、食物中毒 4 小时内
- C、食物中毒 6 小时内
- D、食物中毒 8 小时内
- E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

4、下面措施中，最能有效改善早期肺气肿症状的是 0

- A、促进痰液排出
- B、保证睡眠质量
- C、去除外界刺激因素
- D、呼吸功能锻炼
- E、处理并发症

【答案】： D

5、男，50岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳

出为粉红色泡沫样血痰，可能疾病为 0

- A、大叶性肺炎
- B、急性左心衰
- C、右心衰竭
- D、支气管扩张
- E、自发性气胸

【答案】： B

6、脑出血患者降低颅内压，控制脑水肿时应使用 0

- A、复方氯化钠
- B、碳酸氢钠
- C、甘露醇
- D、葡萄糖
- E、氯化钠

【答案】： C

7、患者男性，自感心慌、头晕。查体；心率 84 次\分，脉搏 52 次\分，心律不规则，

心率快慢不一，心音强弱不等，该患者可能出现了 0

- A、二联律
- B、三联律
- C、脉搏短绌

D、 心动过缓

E、 脉搏异常

【答案】： C

8、在灾难现场通常以黑颜色醒目的卡片或胶带表示患者的分类是 0

- A、死亡
- B、重伤
- C、危重伤
- D、中重伤
- E、致命伤

【答案】： E

9、下列哪项是多发伤初级评估的目的 0

- A、明确诊断
- B、判定处理伤员的优先次序
- C、确认是否需要手术
- D、明确收治的科室
- E、决定后续的治疗方案及优先次序

【答案】： B

10、高血压分为几级 0

- A、1 级
- B、2 级
- C、3 级
- D、4 级

【答案】： C

11、心脏骤停首选的治疗措施是 0

- A、心肺复苏
- B、安置起搏器
- C、开通静脉输液
- D、通畅呼吸道
- E、高浓度吸氧

【答案】： A

12、护士在紧急情况下为抢救患者生命实施必要的紧急救护，应该做到以下几点，
但除外()

- A、必须依照诊疗技术规范
- B、必须有医师在场指导
- C、根据患者的实际情况和自身能力水平进行力所能及的救护
- D、避免对患者造成伤害
- E、以上均正确

【答案】： B

13、患者，男性，70岁，突发急性广泛心肌梗死，经治疗疼痛有所好转，继而出现
呼吸困难、咳嗽、发绀、咳大量粉红色泡沫痰，其咳嗽病因是 0

- A、急性肺淤血
- B、急性肺不张
- C、急性肺水肿
- D、急性肺炎
- E、急性胸膜炎

【答案】： C

14、锐器伤的职业防护措施中有错的是 0

- A、在有可能接触病人血、体液时必须戴手套
- B、手术中用弯盘存放锐器后再传递
- C、抽吸药液后必须立即用双手操作套上针帽
- D、锐器不可与其他医疗垃圾混放
- E、用砂轮划痕后垫纱布再瓣安瓿

【答案】： C

15、风湿性心瓣膜病最易累及的是 0

- A、二尖瓣
- B、主动脉瓣
- C、三尖瓣
- D、二尖瓣+三尖瓣
- E、主动脉+肺动脉瓣

【答案】： A

16、患者女性，43 岁。中午饱餐后出现上腹部绞痛，同时向腰背部呈带状放射，已持续 6 小时。怀疑为急性胰腺炎，此时最具诊断意义的实验室检查为 0

- A、 白细胞计数
- B、血清淀粉酶测定
- C、尿液淀粉酶测定
- D、血清脂肪酶测定
- E、血清谷丙转氨酶

【答案】： B

17、某日护士小张正在急诊室工作，突然闯进一位怒气冲冲的患者家属，叫嚷着要找医院领导。这时小张应该 0

- A、制止患者家属愤怒的发泄
- B、直接交给上级领导处理
- C、主动倾听，了解分析患者家属愤怒的原因
- D、对其不理不睬，直接回避
- E、对其愤怒行为给予批评

【答案】： C

18、现场急救中，口对口人工呼吸的吹气频率较适宜的是 ()

- A、12~14 次/分
- B、14~16 次/分
- C、16~18 次/分

D、18~20 次/分

E、20~22 次/分

【答案】： B

19、胸部冲击伤最严重的并发症是 0

- A、血胸
- B、气胸
- C、ARDS
- D、肺不张
- E、肺破裂

【答案】： C

20、急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是()

- A、呼吸和循环衰竭
- B、中毒性休克
- C、大出血
- D、急性肾衰竭
- E、急性肝衰竭

【答案】： A

21、在车祸伤现场，作为奔向伤员的现场急救人员，应如何正确向伤员喊话?0

- A、大声呼喊伤员的名字，确定其是否能活动和反应
- B、大声喊出自己是来营救的急救人员，让伤员放心
- C、大声告诉伤员不可随意活动，等待急救的处理
- D、大声报出自己名字，让伤员放心
- E、不向伤员喊话，该处理什么就做什么措施

【答案】： C

22、成年人颅内压的正常值为 0

- A、70-200mmH₂O
- B、80-210mmH₂O
- C、90-190mmH₂O
- D、60-180mmHg
- E、70-150mmHg

【答案】： A

23、有机磷农药吸收后浓度最高的脏器是 0

- A、心
- B、脑
- C、肾
- D、肝
- E、肺

【答案】： D

24、休克时正确的补液原则是 0

- A、补液“宁多勿少”
- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D、失多少补多少
- E、如血压正常不必补液

【答案】： B

25、气管插管留置的时间一般最多为()h

- A、48
- B、12
- C、72
- D、24

【答案】： C

26、患者，男，50岁。某日在烈日下劳动4小时后感到头昏乏力，随后昏倒在地，神志不清，急送医院，头颅CT

检查未见异常。查体：体温 41℃，心率 135 次/分，律齐，血压 90/60mmHg，深昏迷，双下肢阵发性抽搐，大、小便失禁。该患者属于中暑的哪一类型()

- A、热射病
- B、热痉挛
- C、热衰竭
- D、先兆中暑
- E、轻度中暑

【答案】： A

27、急性肠梗阻易导致

- A、高血钙
- B、低血钙
- C、高血钾
- D、低血钾
- E、高渗性脱水

【答案】： D

28、左下 LL 导联位于哪个位置?

- A、左锁骨中线与脐水平交汇处
- B、左锁骨中线剑突水平处
- C、胸骨左缘第四肋间
- D、胸骨左缘锁骨中线第一肋间

【答案】： B

29、对火灾抢救出来的伤员，应首先

- A、给予充足的饮食再送医院
- B、询问火灾原因
- C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院
- D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

30、下列不属于院前急救原则的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤后轻伤
- C、先固定后搬运
- D、急救与呼救并重

【答案】： A

31、气管插管时看到的第一个标记物是 0

- A、声门
- B、会厌
- C、切牙
- D、悬雍垂

【答案】： D

32、口对口人工呼吸的吹气量应达到()

- A、2400mL 以上
- B、500mL
- C、1/3 肺活量
- D、达到病人肺部
- E、使病人胸廓抬起

【答案】： E

33、关于心肺复苏，错误的是?0

- A、频率 100-120 次/分
- B、深度 5-6cm
- C、部位为胸骨下部
- D、按压通气比为 30:2

【答案】： C

34、下面禁止转运的指征不正确的是)

- A、心跳、呼吸停止;
- B、有气管插管指征，但未插管的;
- C、血流动力学不稳定;
- D、血压偏高

【答案】： D

35、患者，女性，58 岁，慢性支气管炎病史 10 年，慢阻肺病史 5 年。护士在夜间查房时发现患者剧烈咳嗽后突感上胸刺痛、胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体：左侧

胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为 0

- A、肺梗死
- B、急性心肌梗塞
- C、自发性气胸
- D、支气管哮喘
- E、胸腔积液

【答案】： C

36、II型呼吸衰竭是指动脉血气显示 0

- A、仅有缺氧
- B、仅有二氧化碳潴留
- C、仅有二氧化碳降低
- D、既有缺氧，又有二氧化碳降低
- E、既有缺氧，又有二氧化碳潴留

【答案】： E

37、休克早期血压的变化 0

- A、收缩压下降，脉压差小
- B、收缩压升高，脉压差大
- C、收缩压正常，脉压差小
- D、收缩压下降，脉压差大
- E、血压无变化

【答案】： C

38、最容易发生急性肾衰竭的是 0

- A、严重颅脑外伤
- B、严重挤压伤
- C、大面积烧伤
- D、外伤致脾破裂
- E、骨盆骨折

【答案】： B

39、输液治疗时患者突然出现心慌气紧、呼吸困难、发绀、大汗、咳嗽、咳泡沫

血痰、烦躁不安。听诊肺部布满湿性啰音。应高度怀疑 0

- A、循环负荷过重
- B、空气栓塞
- C、输液反应
- D、过敏反应

【答案】： A

40、患者患有心脏病但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸

困难或心绞痛。其心功能分级应为 0

- A、心功 1 级
- B、心功能 2 级
- C、心功能 3 级
- D、心功能 4 级
- E、以上都不是

【答案】： A

41、男性，22 岁，右胸刺伤 2 小时，创口与胸腔相通，患者极度呼吸困难，首要的急救措施是)

- A、迅速封闭胸壁伤口
- B、立即手术
- C、输血，输液
- D、胸腔闭式引流
- E、给氧，气管插管

【答案】： A

42、男，57岁。2个月来清晨常出现头痛，癫痫发作4次，经检查诊断为颅内占位性

病变、颅内压增高，行开颅手术。颅内压增高的典型表现为（

- A、头痛、呕吐、食欲缺乏
- B、头痛、呕吐、抽搐
- C、头痛、抽搐、呕吐、意识障碍
- D、头痛、呕吐、视盘水肿
- E、头痛、抽搐、血压增高

【答案】： D

43、短时间内出血量超过（）时可出现周围循环衰竭。0

- A、500ml
- B、800ml
- C、1200ml
- D、1000ml
- E、2000ml

【答案】： D

44、危重症患者家属最主要的心理需求为 0

- A、病情保障与获取信息
- B、照顾患者
- C、接近患者
- D、获得支持
- E、自身舒适

【答案】： A

45、2015心肺复苏指南继续强调将0的重要意义。

- A、迅速开放呼吸道；
- B、迅速判断意识
- C、有效的人工通气；
- D、有效不间断胸外按压

E、除颤

【答案】： D

46、进行 CPR 的前提条件是 0

A、无反应、无呼吸

B、无反应、有呼吸

C、

无意识

D、无反应

【答案】： A

47、在使用球囊-面罩通气时，可尽量减少空气进入患者胃内的做法是
0

A、增加通气频率，减少通气量

B、减少每分钟通气次数

C、尽可能延长每次通气时间

D、用尽全力给予最大量的通气

E、通气量能使患者胸廓明显隆起即可

【答案】： E

48、患者男性，46岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血原因，首选的
检查方法是)

A、大便隐血试验

B、X线钡剂造影

C、内镜检查

D、血常规检查

E、B超检查

【答案】： C

49、女性，49岁，多年胃溃疡，近1个月胃区疼痛，发病前饱食并饮酒，饭后12分钟
突然腹痛，剧如刀割，腹呈板状，来源急诊下一步简单有效的检查方
法是 0

A、腹部X线检查

B、纤维胃镜

C、腹腔冲洗

D、磁共振

E、B 超

【答案】： A

50、有机磷农药中毒的中毒机理是 0

- A、麻醉作用
- B、抑制酶的活力作用
- C、局部刺激、腐蚀作用
- D、干扰细胞膜和细胞器的生理功能

【答案】： B

51、患者有规律呼吸几次后，突然停止呼吸，间隔一个短时间后又开始呼吸，周而

复始。此种呼吸和呼吸暂停交替出现的现象称为 0

- A、潮式呼吸(陈施呼吸)
- B、深度呼吸(库斯莫呼吸)
- C、叹息呼吸
- D、间断呼吸(毕奥呼吸)
- E、蝉鸣式呼吸

【答案】： D

52、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 0

- A、酮体生成过多
- B、水肿
- C、治疗前，血钾偏高或正常
- D、携氧功能障碍

【答案】： B

53、患者，男性，55 岁。参加 2 小时会议后，到洗手间返回会议室途中突然晕倒，

意识不清。如果有 3 人在现场，其最佳分工是)

- A、1 人拨打“120”电话，第 2 人按压人中，第 3 人高声呼喊患者
- B、1 人判断患者心搏骤停，第 2 人拨打“120”电话，第 3 人立即进行胸外按压
- C、1

人拨打“120”电话，第2人判断患者意识，第3人置患者于舒适体位

D、1人拨打“120”电话，第2人判断患者意识，第3人给患者人工呼吸

E、1人呼喊患者、判断呼吸和脉搏，第2人拨打“120”电话，第3人呼救

【答案】： B

54、急性敌百虫中毒禁用 O 溶液洗胃。O

A、清水、生理盐水

B、1:5000 高锰酸钾溶液

C、2%重曹溶液

D、牛奶、蛋清水

E、活性炭

【答案】： C

55、高钾时心电图的变化正确的是 O

A、S-T 段下降

B、T 波高尖，PR 间期延长

C、出现 U 波

D、QRS 间 缩 短 ，QT 时间延长

E、T 波宽而低平，重者 T 波倒置

【答案】： B

56、患者，男性，23岁，踝关节扭伤6小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是()

A、促进末梢循环

B、促进炎症的消散

C、促进炎症的局限

D、减轻局部出血、疼痛

E、使血管扩张，减轻深部组织充血

【答案】： D

57、终止室颤最迅速、最有效的措施是 0

- A、立即胸外心脏按压
- B、立即给予除颤
- C、尽快给予气管插管
- D、立即给予球囊-面罩通气
- E、立即给予肾上腺素 1mg 静脉注射

【答案】： B

58、对心室颤动病人进行心肺复苏的首选药物是 0

- A、碳酸氢钠
- B、山黄若碱
- C、利多卡因
- D、去甲肾上腺素
- E、葡萄糖酸钙

【答案】： C

59、电除颤的并发症不包括 0

- A、心律失常
- B、高血压
- C、肺和体循环栓塞
- D、急性肺水肿

【答案】： B

60、属于闭合性创伤的是 0

- A、擦伤
- B、震荡伤
- C、切削伤
- D、撕脱伤
- E、火器伤

【答案】： B

61、现场心肺复苏操作首要步骤是 0

- A、心前区叩击
- B、心脏按压
- C、口对口人工呼吸
- D、按额托项，保持呼吸道通畅
- E、心内注射

【答案】： D

62、急性有机磷农药中毒出现肺水肿，首选的急救药物为 0

- A、马啡
- B、肾上腺素
- C、甘露醇
- D、阿托品

【答案】： D

63、判断甲状腺功能亢进程度的主要依据是 0

- A、体温、呼吸
- B、血压、脉搏
- C、体重、食欲
- D、突眼程度
- E、睡眠时间

【答案】： B

64、患者，男性，3岁，因呕血黑便来院就诊，神志清楚，面色苍白，血压 80/50mmHg。

考虑病人血容量不足，应输入的溶液是 0

- A、10%葡萄糖
- B、脂肪乳
- C、20%甘露醇
- D、中分子右旋糖酐
- E、浓缩白蛋白

【答案】： D

65、灭火器至少多长时间进行一次全面检查和保养 0

- A、一个月
- B、一个季度
- C、半年
- D、一 年

【答案】： A

66、斜正重症酸中毒时，根据二氧化碳结合力和 FH 值应给予 0

- A、甘露醇
- B、碳酸氢钠
- C、葡萄糖
- D、氯化钠
- E、转化籍

【答案】： B

67、艾滋病的主要传播途径是 0

- A、饮食传播
- B、母晏传播
- C、蚊虫叮咬
- D、血液传播
- E、性接触传播

【答案】： E

68、抢救口服有机磷农药中毒病人洗胃时最常用的洗胃液是 0

- A、0.9%氯化钠注射液、温开水
- B、热开水
- C、2%碳酸氢销
- D、1:5000 高锰酸钾溶液
- E、5%葡萄糖注射液

【答案】： A

69、作为一名跳楼致高处坠落伤患者的现场目击者，以下哪种做法是最正确及时的？()

- A、立刻拨打 120 急救电话，等待救援人员的到来
- B、立刻离开现场，以免惹祸上身
- C、立刻给患者行心电图，宣布患者死亡
- D、围观患者，议论纷纷，摇头叹息
- E、迅速判断患者意识和伤情，呼吁现场群众协助救治，同时拨打急救电话呼叫急救措施，必要时立刻进行 CPR 或止血、固定等处理

【答案】： E

70、如果一次注入洗胃液过多会引起 0

- A、胃内压升高引起反射性心跳加快
- B、胃内压降低引起反射性心跳骤停
- C、胃内压升高毒物吸收增加
- D、胃内压降低毒物吸收增加

【答案】： C

71、患者，男性 32 岁，因支气管扩张合并感染入院，昨日出现大咯血，提示患者 24 小时咯血量超过()

- A、100ml
- B、300ml
- C、500ml
- D、700ml
- E、1000ml

【答案】： C

72、以下患者可以立即转送的是 0

- A、腹腔内出血未控制
- B、休克患者

C、大腿骨折未固定

D、急性左心素竭

E、肠膨出已行腹部包扎

【答案】： E

73、张力性气胸紧急处理是 0

- A、行胸膜腔闭式引流术
- B、开胸缝合气管裂伤
- C、用大号针头在锁骨中线第 2~第 3 肋间胸穿放气
- D、给氧 E. 做人工呼吸

【答案】： C

74、下列哪项对高钾血症患者兼用 0

- A、等渗盐水
- B、10%葡萄糖液
- C、右旋糖酐
- D、林格氏液
- E、碳酸氢钠

【答案】： D

75、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

76、2010 年 10 月-美国心脏协会(AHA)公布最新心肺复苏(CPR)指南。
重新安排

了 CPR 传统的三个步骤，最新三步骤是)

- A、A-B-C
- B、C-A-B
- C、B-CA
- D、B-A-C

【答案】： B

77、抢救脊柱骨折的伤员时，应 0。

- A、采取保暖措施
- B、用软板担架运送
- C、用三角巾固定
- D、扶持伤者移动
- E、以上方法均正确

【答案】： C

78、患者，女性，35 岁。因头部外伤报诊为”脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现， 患者神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。该患者目前最确切的首要护理诊断是 0

- A、有窒息的危险
- B、气体交换受损
- C、有受伤的危险
- D、有感染的危险
- E、有脑疝的危险

【答案】： A

79、院前急救的原则错误的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤，后轻伤
- C、急救与呼救并重
- D、转运与救护相结合

【答案】： A

80、患者，男性，52 岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量 血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清， BP75/46mmHg

R38 次/分，心率 126 次/分，
律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查
- D、循环情况
- E、仔细的胸部检查

【答案】： B

81、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

- ()
- A、美蓝
 - B、VK1
 - C、解磷定
 - D、阿托品
 - E、纳络酮

【答案】： E

82、患者，女性，55 岁。因高速车祸 4 小时入院，伤后当时浅昏迷，GCS 评分 5 分，呼吸急促(38 次/分)伴口严重发绀，面部严重肿胀，脉搏摸不到，手足发冷，血压 50/30mmHg。假如你是现场救护人员，首先实施的抢救措施是 0

- A、立即建立静脉通路、抗休克治疗
- B、进行创伤严重度评分
- C、立即送往医院
- D、气管插管、给氧
- E、仔细检查，明确诊断

【答案】： D

83、关于呼吸的观察不正确的是 0

- A、成人安静时每分钟 16~20 次
- B、每分钟超过 24 次称呼吸增快，每分钟少于 10 次称呼吸减慢
- C、潮式呼吸和间歇呼吸属于节律异常的呼吸
- D、呼吸困难分为吸气性、呼气性和混合性三类
- E、呼气时发出鼾声是由于喉头痉挛引起

【答案】： E

84、严重创伤性休克后，首先应预防的是 0

- A、感染
- B、输血并发症
- C、急性心力衰竭
- D、肠麻痹
- E、急性呼吸窘迫综合征

【答案】： A

85、左心衰时呼吸困难的特点，不包括 0

- A、活动时加重
- B、休息时减轻
- C、仰卧时加重
- D、常伴淤血性肝大
- E、常采取端坐呼吸体位

【答案】： D

86、复苏时一人行胸外心脏按压和人工呼吸的次数比例是(

- A、15:2
- B、5:1
- C、15:1
- D、5:2
- E、其余各项均不对

【答案】： A

87、抢救时胸外心脏按压有效的标志是 0

- A、颈动脉搏动
- B、股动脉搏动
- C、肱动脉搏动
- D、颈、股动脉搏动
- E、颈、肱动脉搏动

【答案】： D

88、电流击伤对人的致命作用是 0

- A、引起心室颤
- B、诱发心动过速
- C、导致心室血流减慢
- D、造成心肌缺血

【答案】： A

89、插胃管时，患者出现呛咳、紫绀应 0

- A、嘱患者深呼吸
- B、嘱患者作吞咽动作
- C、立即拔出胃管重插
- D、托起患者头部再插管
- E、稍停片刻继续插

【答案】： C

90、呼吸性酸中毒应先处理的问题是 0

- A、控制感染
- B、促进咳痰
- C、单纯高浓度吸氧
- D、给予碱性液体
- E、解除呼吸道梗阻，改善换气

【答案】： E

91、用于动脉出血的止血方法为 0

- A、加加压包扎止血法

- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/018057105063006077>