

## 基层医生培训各科试题和答案常见疾病公共卫生概论

1、公共卫生事业的最终目标是(A)

- A、疾病预防与健康促进
- B、医疗保健
- C、保护环境
- D、促进经济发展
- E、卫生监督

2、根据国家卫生部《基本公共卫生服务 2011 版规范》中的描述，在国内展开的基本公共卫生服务为(D)项

- A、 8
- B、 9
- C、 10
- D、 11
- E、 12

3、2010 年 4 月卫生部发布了《地市级突发公共卫生事件应急指挥与决策系统建设技术指南》，中心思想就是(C)

- A、避免疾病，提高健康
- B、为健康服务，为公众服务
- C、平战结合、预防为主
- D、未病先防，已病防变
- E、及时报告，及时处理

4、世界卫生组织在组织法里明确指出：“健康不仅是没有疾病或不虚弱，而且是身体的、心理的健康和(E)适应的完美状态”

- A、家庭
- B、工作
- C、环境
- D、精神
- E、社会

5、公共卫生资金实行分级筹措，主要为三个方面，即中央、省和(A)

- A、地方
- B、个人
- C、社会
- D、医疗机构
- E、政府

中医“治未病”（一）

1、“治未病”一词最早见于( )一书，它提出了中医治未病的基本理论和实践框架 C

- A、《金匱要略》
- B、《难经》
- C、《黄帝内经》
- D、《伤寒论》
- E、《千金要方》

2、在疾病未形成之前，对可能导致疾病的各种原因，采取针对性措施，预防其发生，称为(B)

- A、见微知著
- B、未病先防
- C、有病早治
- D、已病防变
- E、瘥后防复

3、《金匱要略·脏腑经络先后病脉证篇》中“夫治未病者，见肝之病，知肝传脾，当先实(A)”

- A、脾
- B、肾
- C、心
- D、肝
- E、肺

4、提出“上医医未病，中医医欲病之病，下医医已病之病”学术思想的是(D)

- A、朱丹溪
- B、葛洪
- C、吴鞠通
- D、孙思邈
- E、张仲景

5、( )中提出“务在先安未受邪之地”的防治原则 C

- A、《金匱要略》
- B、《温病条辨》
- C、《温热论》
- D、《伤寒论》
- E、《千金要方》

## 中医“治未病”（二）

1、《灵枢·天年》曰：“五脏坚固，血脉和调，肌肉解利，皮肤致密，营卫之行，不失其常，呼吸微徐，气以广行，六腑化谷，津液布扬，各如其常，故能长久”，是对(B)体质的描述

- A、气虚质
- B、平和质
- C、阳虚质
- D、阴虚质
- E、特禀质

2、不能长距离行走，爬一两层楼气喘，说话声音低，且中间需要停顿换气为(A)体质的特点

- A、气虚质
- B、痰湿质
- C、阳虚质
- D、阴虚质
- E、湿热质

3、《素问·逆调论》云：“阳气少，阴气多，故身寒如从水中出。”是对(C)体质的描述

- A、气虚质
- B、血瘀质
- C、阳虚质
- D、痰湿质
- E、特禀质

4、阴虚质常用保健穴位可选用(D)

- A、足三里、丰隆
- B、曲池、合谷
- C、支沟、阴陵泉
- D、太溪、三阴交
- E、气海、关元

5、由于水液内停而痰湿凝聚，以粘滞重浊为主要特征的体质是(E)

- A、阴虚质
- B、血瘀质
- C、阳虚质
- D、湿热质
- E、痰湿质

### 中医“治未病”（三）

1、面部或鼻部有油腻感或者油亮发光，易生痤疮或疮疖，感到口苦或嘴里有异味的是(D)

- A、气郁质
- B、特禀质
- C、痰湿质
- D、湿热质
- E、阴虚质

2、张景岳《景岳全书》：“此多以衣食之累，利害之牵，及悲忧惊恐而致郁者总皆受郁之类。神志不振，……凡此之辈”是对(A)的描述

- A、气郁质
- B、阴虚质
- C、阳虚质
- D、特禀质
- E、血瘀质

3、“治未病”的目的是(E)

- A、健康文化
- B、健康管理
- C、提高健康
- D、未病先防
- E、健康保障

4、血瘀质常用的保健穴为(C)

- A、足三里、丰隆
- B、曲池、合谷

- C、期门、血海
- D、太溪、三阴交
- E、气海、关元

5、由于先天性和遗传因素造成的一种体质缺陷，包括先天性、遗传性的生理缺陷，先天性、遗传性疾病，过敏反应，原发性免疫缺陷等而形成的体质是(E)

- A、气虚质
- B、血瘀质
- C、阳虚质
- D、痰湿质
- E、特禀质

## 支气管哮喘

- 1、当前防治支气管哮喘最有效的药物是 (C)
- A、 $\beta_2$ 受体激动剂
  - B、茶碱类
  - C、糖皮质激素

- D、白三烯调节剂
- E、色甘酸钠

2、支气管哮喘发作时不能使用的药物是 (C)

- A、抗胆碱药
- B、氨茶碱
- C、吗啡
- D、 $\beta_2$  受体激动剂
- E、糖皮质激素

3、临床用来控制呼吸道炎症最有效的药物是 (A)

- A、糖皮质激素
- B、色甘酸钠
- C、茶碱类
- D、白三烯拮抗剂
- E、 $\beta_2$  受体激动剂

4、支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时，药物治疗可  
选用 (C)

- A、呋塞米
- B、吗啡
- C、氨茶碱
- D、西地兰
- E、肾上腺素

5、男性，64岁，有青光眼史，房屋装修刷漆后出现眼发痒、  
流涕、喷嚏，随后发作性呼吸困难、烦躁不安，听诊双肺布  
满哮鸣音。以下用药不恰当的是 (B)

- A、氨茶碱
- B、阿托品气雾吸入
- C、异丙肾上腺素喷吸
- D、舒喘灵
- E、激素静脉点滴



## 肺炎（一）

1、肺炎患者的热型为 **B**

- A、弛张热
- B、稽留热
- C、波状热
- D、回归热
- E、不规则热

2、下列疾病可出现铁锈样痰的是 **C**

- A、慢性支气管炎
- B、肺癌
- C、肺炎
- D、肺结核
- E、急性左心衰

3、下列肺炎易并发脓气胸的是 **E**

- A、肺炎球菌肺炎

- B、肺炎支原体肺炎
- C、肺炎杆菌肺炎
- D、病毒性肺炎
- E、金黄色葡萄球菌肺炎

4、男性，20岁，诊断为肺炎球菌肺炎。目前口渴无尿，四肢厥冷，血压 10.6/8kPA (80/60mmHg)，心率 120 次/分。  
治疗首选 D

- A、血管活性药物
- B、静脉滴注乳酸钠
- C、静脉注射西地兰
- D、静脉滴注低分子右旋糖酐
- E、静脉滴注糖皮质激素

5、医院获得性肺炎最常见的致病菌是 C

- A、肺炎球菌
- B、葡萄球菌
- C、革兰阴性杆菌
- D、厌氧菌
- E、真菌

1、支原体肺炎突出的临床特点是 C

- A、婴幼儿多见
- B、多无明显发热
- C、咳嗽症状突出
- D、肺部体征明显
- E、头孢菌素治疗有效

2、诊断支原体肺炎的主要依据是 D

- A、临床表现
- B、X线特异表现
- C、血细菌培养
- D、血清冷凝集试验阳性
- E、红霉素试验性治疗

3、下列关于肺炎球菌肺炎的治疗错误的是 D

- A、青霉素为首选药
- B、青霉素过敏可选用第一代头孢菌素
- C、抗生素疗程一般为 5~7 天
- D、胸片阴影消散后停用抗生素
- E、卧床休息，适当支持治疗

4、男性，65 岁，7 月前发热、咳嗽，胸片右上肺片状影，经抗炎治疗好转。2 月前有类似发作 1 次，10 天前再次发热、咳嗽，胸片又见右上肺片状致密影，查体：右上肺呼吸音低，无啰音，下列诊断可能性最大的是 D

- A、肺炎支原体肺炎
- B、病毒性肺炎
- C、干酪性肺炎
- D、阻塞性肺炎
- E、革兰阴性杆菌

5、女性，30岁，右下大叶性肺炎，用青霉素治疗后热退，3天后又发热，白细胞总数持续增高。其原因首先应考虑 B

- A、青霉素剂量不足
- B、发生并发症
- C、未用退热药
- D、未用糖皮质激素
- E、致病菌对青霉素不敏感

### 呼吸系统疾病病例讨论

1、患者，男，45岁，吸烟史20年，慢性支气管炎病史5年，近2年发作较频。下列措施最有助于缓解病情的是 C

- A、增加营养
- B、注意保暖
- C、戒烟
- D、抗生素治疗
- E、体育锻炼

2、患者，男，45岁，吸烟史20年，慢性支气管炎病史5年，近2年发作较频。下列治疗措施宜于缓解期采用的是 A

- A、扶正固本、免疫治疗
- B、预防性应用抗生素
- C、祛痰止咳剂维持
- D、小剂量皮质激素
- E、支气管扩张剂

3、肺源性心脏病急性加重期最重要的治疗措施是 D

- A、应用强心剂
- B、应用利尿剂
- C、控制心律失常
- D、控制肺部感染
- E、通畅呼吸道

4、男性，58岁，慢性咳嗽、咳痰5年，每于冬春季节发作，近一周上述症状加重，查体双肺无异常，X线示双肺纹理增多、紊乱，心电图正常。最可能的诊断是 C

- A、肺结核
- B、支气管扩张
- C、慢性支气管炎
- D、支气管哮喘
- E、肺源性心脏病

5、男性，60岁，慢性咳嗽、咳痰10余年，活动后气短5年，一周来咳嗽加重，咳黄痰，气短加重，尿少。查体：口唇紫绀，颈静脉怒张，双肺干湿啰音，心率124次/分，律齐，肝大，肋下3Cm，双下肢浮肿。对该患者最重要的治疗措施是 A

- A、控制肺部感染
- B、解痉、平喘
- C、应用利尿剂消除水肿
- D、应用强心剂纠正心衰
- E、通畅呼吸道

1、根据全国第三次普查结果，我国 15 岁以上居民的高血压病人人数约 (A)

- A、1.0 亿
- B、1.2 亿
- C、1.4 亿
- D、1.6 亿
- E、1.8 亿

2、慢性心衰的诱发因素中最常见的是 (D)

- A、严重心律失常
- B、妊娠与分娩
- C、过劳和情绪激动
- D、各种感染
- E、输液过量、过快

3、60 岁男性，血压 150/95 毫米汞柱，属于 (D)

- A、标准血压
- B、正常血压
- C、正常高值

- D、轻度高血压
- E、单纯收缩期高血压

### 心脑血管疾病的全科医学处理（二）

1、女性 70 岁，血压 150/95 毫米汞柱，腰围 27 厘米，心电图示  $SV_1+RV_5=50mV$  危险分层属于（B）

- A、低危
- B、中危
- C、高危
- D、很高危
- E、不能定

2、对血压 180/100 毫米汞柱，无自觉症状者的处理（D）

- A、不必处理
- B、定期随访
- C、限体力活动
- D、给药
- E、转诊

3、在老年高血压的防治中下列不正确的论述是（C）

- A、高血压与性别无明显相关性
- B、烟叶中的尼古丁影响降压药的疗效
- C、高血压与遗传因素明显相关
- D、饮酒量与血压之间存在剂量—反应的关系
- E、盐的摄入量与高血压呈正相关

### 心脑血管疾病的全科医学处理（三）

1、高血压患者家属认为限盐对控制血压非常重要，属于影响病人行为的（B）

- A、倾向因素

- B、促成因素
- C、强化因素
- D、消极因素
- E、后置因素

2、关于慢性心力衰竭患者的生活管理治疗不正确的是（A）

- A、病情稳定者可作 3-5 次/周，20-30 分钟/次运动训练
- B、重度心衰患者应完全卧床
- C、可短途飞行，但不去高海拔的地方
- D、心衰患者需限盐及液体入量
- E、完全戒烟，避免酗酒

3、下列急性动脉栓塞体征不正确的是（E）

- A、刀割样剧痛
- B、皮色苍白凉冷
- C、麻木麻痹
- D、动脉搏动消失
- E、高度肿胀



## 心力衰竭（一）

1、改善急性左心衰竭症状最有效的药物是（B）

- A、利尿药
- B、洋地黄
- C、钙离子拮抗药
- D、肾上腺素能受体阻滞药
- E、血管紧张素转换酶抑制药

2、慢性心衰伴有轻度低钠血症时应注意（C）

- A、嘱多饮糖水

- B、尽量多吃蔬菜
- C、严格限制饮水量
- D、无盐饮食
- E、加大血管扩张剂用量

3、血管扩张剂治疗心力衰竭的主要作用机制是 (C)

- A、增强心肌收缩力
- B、改善心肌供血
- C、降低心脏前、后负荷
- D、降低心肌耗氧量
- E、减慢心率

4、心力衰竭时下述减轻心脏负荷的治疗措施中，不正确的是 (B)

- A、根据病情适当安排生活，劳动和休息
- B、凡是心力衰竭的病人都应卧床休息
- C、控制钠盐摄入
- D、合理应用利尿剂
- E、合理应用血管扩张剂

5、患者 50 岁，既往史不详，突然发生呼吸困难，满肺哮鸣音，心率 120 次/分，心脏听诊听不清有无杂音，药物治疗应首选 (D)

- A、硝普钠
- B、西地兰
- C、异搏定
- D、氨茶碱
- E、心得安

## 心力衰竭（二）

1、最常见的诱发慢性心力衰竭的因素是（A）

- A、呼吸道感染
- B、心律失常
- C、钠盐摄入过多
- D、输液过多过快
- E、情绪激动

2、右心功能不全的主要表现是（B）

- A、肺循环瘀血
- B、体循环瘀血
- C、发绀
- D、心界向左扩大
- E、呼吸困难

3、男性，65岁，冠心病患者。体力活动受到轻度限制，休息时无症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛，可诊断为（C）

- A、心功能正常
- B、心功能Ⅰ级
- C、心功能Ⅱ级
- D、心功能Ⅲ级
- E、心功能Ⅳ级

4、诊断右心衰竭时，最可靠的体征是 (A)

- A、肝颈静脉回流征阳性
- B、肝肿大
- C、下肢水肿
- D、腹水
- E、胸水

5、鉴别右心衰竭与肝硬化的要点是 (B)

- A、下肢水肿
- B、肝颈静脉回流呈阳性
- C、腹水形成
- D、肝脏肿大
- E、食欲减退、恶心呕吐

冠心病基础知识 (一)

1、以下不是引起动脉粥样硬化的主要因素的是 A

- A、与年龄性别无关

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018073112142006131>