

围产保健

一、填空题(每题 1 分, 共 20 分)

1、母婴保健工作以保健为中心, 以保障_____为目的。

答案: 生殖健康

2、2014 年是《中华人民共和国母婴保健法》颁布_____周年。

答案: 20

3、王某是大专毕业生, 已取得执业医师资格证书和执业证书, 执业范围为妇产科, 现拟在某医院从事剖宫产手术, 则王某还应取得_____证件

答案: 《母婴保健技术服务考核合格证书》

4、孕产期保健是指各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后_____天的妇女及胎婴儿提供全程系列的医疗保健服务。

答案: 42

5、叶酸补充时间: _____,

答案: 怀孕前三个月和怀孕后三个月

6、一般待孕妇女补充叶酸的剂量为_____。

答案 0.4mg

7、孕早期保健主要目的: _____, 全面评价孕妇健康状况, 筛查不宜妊娠者, 提供孕早期保健指导。

答案: 确定宫内妊娠

8、妊娠图主要检测: _____、腹围、体重、_____、

胎位、胎心、头盆关系、水肿、尿蛋白九项指标。

答案：宫高、血压

9、产前筛查主要进行 _____ 、神经管畸形和胎儿严重畸形的筛查。

答案：唐氏综合征或 21 三体综合征

10、妊娠期某种病理或致病因素可能危害孕妇、胎儿、新生儿或导致难产，称为 _____

答案：高危妊娠

11、产褥期一般为 _____ 周。

答案：6

12、孕产妇死亡是指在妊娠期或 _____ 的妇女，无论妊娠时间和部位。由于任何与妊娠或妊娠处理 有关的或由此而加重了的原因导致的死亡。

答案：妊娠终止后 42 天之内

13、出生缺陷监测对象为在监测医院出生的妊娠满 _____ 周至产后 _____ 天内的围产儿。

答案：28 、 7

14、对艾滋病、梅毒感染产妇所生婴儿应该定期随访至 _____ 月。

答案：18 个月

15、早孕最早及最重要的症状是 _____

答案：停经

16、对妊娠合并严重内科疾病的高危孕妇，在孕 28、34、37 周检查时，应有 _____ 科会诊意见。

答案：内科

17、宫颈癌的孕妇应采取应采取 _____ 方式终止妊娠。

答案：剖宫产

18、子痫患者一般不主张扩容，仅用于 _____ 、贫血

答案：严重低蛋白血症

二、单项选择题（每题 1 分，共 40 分）

1、目前我国采用的围生期是（ ）

- A、妊娠满 20 周到产后 4 周
- B、妊娠满 28 周到产后 1 周
- C、妊娠满 20 到产后 1 周
- D、妊娠满 28 周到产后 4 周
- E、胚胎形成到产后 1 周

答案：B

2、艾滋病产妇进行纯母乳喂养的同时，应该服用相应的抗病毒药物，应持续到时候停药？（ ）

- A、完全停止母乳喂养后的一周
- B、完全停止母乳喂养后的两周
- C、完全停止母乳喂养后的一个月
- D、完全停止母乳喂养后的两个月

答案：A

3、艾滋病母婴传播中什么时期传播危险性最大? ()

- A、孕早期
- B、孕中期
- C、孕晚期
- D、分娩期
- E、哺乳期

答案: D

4、持续性枕后位的特点是

- A. 腹部检查清楚可及胎背
- B. 第二产程延长
- C. 肛查感骨盆前部空虚, 后部满
- D. 矢状缝在骨盆斜径上, 大囟门居骨盆后方, 小囟门居骨盆前方
- E. 其发生系由于骨盆入口狭窄

答案: B

5、下列哪项不是先兆子宫破裂的诊断依据

- A. 先露部下降受阻, 产程延长
- B. 血尿
- C. 病理性缩复环
- D. 血红蛋白下降
- E. 下腹剧痛拒按

答案: D

6、初产妇临产后 4 小时胎头仍未入盆，此时应测量哪条径线

- A. 对角径
- B. 骶耻内径
- C. 髂棘间径
- D. 坐骨棘间径
- E. 坐骨结节间径

答案：A

7、以下哪项条件可给予试产机会

- A. 轻度头盆不称
- B. 明显头盆不称
- C. 中骨盆横径狭窄
- D. 中骨盆及出口平面狭窄
- E. 出口横径与后矢状径之和 $< 15\text{cm}$

答案：A

8、下述哪种情况可使用缩宫素

- A. 宫颈水肿
- B. 头盆不称
- C. 不协调性宫缩乏力
- D. 协调性宫缩乏力
- E. 子宫痉挛性狭窄环

答案：D

9、自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是

- A. 骨盆入口前后径
- B. 中骨盆前后径
- C. 真结合径
- D. 骶耻内径
- E. 以上均不是

答案：D

答案：C

10、正常妊娠 40 周的羊水量约为

- A. 500ml 以下
- B. 500~800ml
- C. 1000ml
- D. 1500ml
- E. 2000ml

答案：C

11、下列妊娠期保健哪项是正确的

- A. 产前检查应从妊娠 20 周开始
- B. 早期妊娠检查，只是为了确定是否怀孕
- C. 产前检查应每月 1 次
- D. 无水肿的孕妇，不需要测体重
- E. 血压较基础血压增高 4 / 2kPa (30 / 15mmHg) 时为异常

答案：E

12、首次产前检查应从何时开始

- A. 早期妊娠
- B. 妊娠 12 周
- C. 妊娠 16 周
- D. 妊娠 20 周
- E. 妊娠 28 周

答案：A

13、关于胎儿电子监测，提示脐带受压的是

- A. NST 无反应型
- B. 加速
- C. 早期减速
- D. 变异减速
- E. 晚期减速

答案：D

14、高危妊娠时选择终止妊娠的时间应取决于

- A. 宫颈成熟度
- B. 宫底高度
- C. 胎动次数
- D. 胎盘功能和胎儿成熟度
- E. 胎儿电子监测

答案：D

15、初产妇，产程顺利，宫口开全 1h，胎头已拨露，胎心监

护为早期减速应采取的处置是

- A 立即剖宫产
- B 产钳助产
- C 立即静滴葡萄糖液
- D 静点缩宫素
- E 等待自然分娩

答案：E

16、初产妇，产程顺利，宫口开全 1h，胎头已拨露，胎心监护为早期减速应采取的处置是

- A 立即剖宫产
- B 产钳助产
- C 立即静滴葡萄糖液
- D 静点缩宫素
- E 等待自然分娩

答案：E

17、下列哪一项不是胎儿宫内发育迟缓胎儿附属物的病理变化

- A. 绒毛发育迟缓
- B. 绒毛膜血管瘤
- C. 单脐动脉
- D. 脐带真结
- E. 绒毛膜血管病

答案：D

18、月经规律妇女，常用推算预产期的方法是

- A. 末次月经干净之日
- B. 末次月经开始之日
- C. 初觉胎动的时间
- D. 早孕反应开始的时间
- E. 孕早期妇科检查时子宫大小

答案：B

19、下述是一名孕妇于孕 36 周的各项检查的结果，其中哪
项可能是病理性的

- A. 心率增快
- B. 心界向左稍扩大
- C. 下肢水肿，卧床休息后不消退
- D. 心尖及肺动脉瓣区可闻及柔和收缩期吹风样杂音
- E. 劳动后呼吸加快

答案：C

20、第一产程宫颈扩张曲线，正确的是

- A. 潜伏期是指从感觉宫缩开始到宫颈扩张 3cm
- B. 潜伏期最大时限为 16h
- C. 宫颈扩张活跃期的加速阶段是从宫口扩张 3cm 至 4cm，
约需 4h
- D. 活跃期最大倾斜阶段，是从 4cm 扩至 9cm，约需 8h

E. 活跃期减缓阶段，是宫颈扩张从 9cm 至 10cm，约需 4h

答案：B

21、第一产程是从何时算起

- A. 有不规则宫缩，伴有阴道血性分泌(见红)
- B. 有不规则宫缩，伴有阴道流水
- C. 有规则宫缩，伴有阴道少量出血
- D. 有规则宫缩，伴有宫颈扩张
- E. 有规则宫缩，伴有阴道流水

答案：D

22、反映产程进展最重要的指标是

- A. 子宫收缩的强度
- B. 子宫收缩的频度
- C. 子宫收缩的节律性
- D. 胎头下降的程度
- E. 是否破膜

答案：D

23. 正常分娩保护会阴的时间是

- A. 初产妇宫口开全
- B. 初产妇先露着冠时
- C. 经产妇宫口开大 4~5cm，宫缩规律有力时
- D. 经产妇宫口开全时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018142070032007004>