

感染内科诊断学试题

1. 作年龄推断哪项不正确 () C
 - A. 皮肤弹性随年龄增长而减低
 - B. 牙齿脱落大多数老年人均有
 - C. 头发变白肯定已属老年人
 - D. 角膜老年环见于 60 岁以上的老人
 - E. 老年人大多肌肉萎缩松弛
2. 关于皮肤检查的描述, 以下哪项不正确 () C
 - A. 皮肤粘膜出血, 形成红色或暗红色斑, 压之不褪色
 - B. 皮肤粘膜出血不高出皮肤、 $<2\text{mm}$ 者, 为出血点
 - C. 荨麻疹呈苍白或片状发红改变, 不突出皮肤表面
 - D. 皮肤粘膜出血高出皮肤、有波动、 $>5\text{mm}$ 者为血肿
 - E. 皮肤有小红点, 高出皮肤表面, 压之褪色者为丘疹
3. 鉴别颈动脉搏动与颈静脉搏动最关键的是 () D
 - A. 搏动的位置
 - B. 搏动的范围
 - C. 搏动部位是否伴有血管杂音
 - D. 触诊指尖的搏动感, 动脉搏动感较强
 - E. 以上均不是
4. 淋巴结结核, 查体特点中哪项不正确: C
 - A. 肿大的淋巴结常发生在颈部血管周围
 - B. 多发性、质地稍硬
 - C. 孤立性、不易粘连
 - D. 有时可触到波动
 - E. 可形成瘰管
5. 恶性肿瘤淋巴结转移, 查体特点中哪项不正确: D
 - A. 质地坚硬
 - B. 与周围组织粘边, 不易推动
 - C. 一般无压痛
 - D. Virshow 淋巴结为肺癌转移的标志
 - E. 淋巴瘤可表现为全身性淋巴结肿大
6. 关于淋巴结收集淋巴液的描述, 下列哪项不正确: D
 - A. 耳后淋巴结收集头皮范围的淋巴液
 - B. 颈深淋巴结上群收集鼻咽部淋巴液
 - C. 颈深淋巴结下群收集咽喉、气管、甲状腺的淋巴液
 - D. 锁骨上淋巴结群左侧多收集气管、胸膜、肺的淋巴液
 - E. 腹股沟淋巴结群收集下肢及会阴的淋巴液

7. 下面关于体温测量的描述，哪项是不正确的： B
- A. 口测法对婴幼儿、神志不清者适用
 - B. 腋测法：把体温计放在腋窝深处夹紧，放置 5 分钟读数
 - C. 肛测法：较腋测法及口测法的结果高
 - D. 检查前要甩到 36℃ 以理
 - E. 腋测法较安全、方便

8. 体温低于正常，可见于下列情况，除了 D
- A. 休克
 - B. 慢性消耗性疾病
 - C. 严重营养不良
 - D. 妊娠妇女
 - E. 低温环境中暴露过久

9. 急性病容可见于下列情况，除了： E
- A. 大叶性肺炎
 - B. 疟疾
 - C. 流脑
 - D. 化脓性扁桃体炎
 - E. 肺结核

10. 粘液性水肿面容常见于： A
- A. 甲状腺功能减退症
 - B. 慢性肾炎
 - C. 肝硬化
 - D. 巨幼细胞贫血
 - E. 恶性淋巴瘤

11. 慌张步态见于： B
- A. 小脑疾患
 - B. 震颤性麻痹患者
 - C. 脊髓痨
 - D. 先天性髋关节脱位
 - E. 脑梗塞

12. 关于玫瑰疹，下列哪项是错误的： C
- A. 鲜红色、圆形斑疹
 - B. 直径 2-3mm
 - C. 多出现于四肢
 - D. 对伤寒有诊断意义
 - E. 常在发热后等 6 天出现

13. 关于蜘蛛痣的描述下列哪项是错误的： A

- A. 多出现于下腔静脉分布的区域
- B. 与肝对体内雌激素灭活减弱有关
- C. 健康妇女在妊娠时可出现
- D. 肝硬化患者常出现
- E. 是皮肤小动脉末端扩张形成

14. 下列情况下体温可略有升高，除了：C

- A. 剧烈运动
- B. 饱餐后
- C. 月经期
- D. 高温环境下
- E. 饮大量热水

15. 外源性致热源，包括下列哪位，除了：E

- A. 细菌毒素
- B. 无菌性坏死组织
- C. 某些类固醇物质
- D. 抗原抗体复合物
- E. 白细胞介素 I

16. 关于 FUO 的描述哪项是错误的：A

- A. 体温 37.3°C 以上
- B. 发热 2-3 周以上
- C. 经过常规检查不能明确诊断
- D. 结核感染是常见病因之一
- E. 结缔组织病是常见病因之一

17. 下列关于热型的描述哪项不正确：D

- A. 稽留热型指 24 小时内体温波动小于 1°C
- B. 弛张热型指 24 小时波动范围超过 2°C
- C. 间歇热、见于疟疾
- D. 回归热与波状热均为骤升、骤降型
- E. 结核病常表现为不规则热型

18. 下列哪种情况发热时不常伴有寒颤 B

- A. 急性细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 疟疾
- D. 钩端螺旋体病
- E. 输血反应

19. 关于脑脊液生化检查，结果的描述哪项是错误的：B

- A. 化脓性脑膜炎时蛋白明显升高
- B. 结核性脑膜炎时葡萄糖明显减低

- C. 隐球菌脑膜炎与结核性脑膜炎改变相似
 - D. 病毒性脑膜炎变化较轻。
 - E. 蛛网膜下腔粘连梗阻时蛋白异常增高
20. 关于脑脊液标本采集，下列哪项是错误的： C
- A. 一般内腰穿取得标本
 - B. 标本采集后应立即送检
 - C. 第一管送检细胞学检查
 - D. 第二管送检生化检查
 - E. 所用试管应无菌
21. 正常成人脑脊液中葡萄糖含量为： A
- A. 45-80mg/dl
 - B. 50-90mg/dl
 - C. 55-95mg/dl
 - D. 60-100mg/dl
 - E. 65-105mg/dl
22. 正常成人脑脊液中蛋白质含量为： C
- A. 5-20mg/dl
 - B. 10-30mg/dl
 - C. 15-45mg/dl
 - D. 20-50mg/dl
 - E. 30-55mg/dl
23. 正常成人氯化物含量为： D
- A. 89-99mmol/L
 - B. 99-109mmol/L
 - C. 109-119mmol/L
 - D. 119-129mmol/L
 - E. 129-139mmol/L
24. 下列关于正常成人脑脊液的描述哪项是正确的： D
- A. 可有少量红细胞，少量白细胞
 - B. 无红细胞，可有少量中性粒白细胞
 - C. 无红细胞，可有 0-5/ul 白细胞
 - D. 无红细胞，可有 0-8/ul 单核白细胞
 - E. 无红细胞，可有 0-15/ul 单核白细胞
25. 患者，男，10岁，发热，伴头痛，喷射样呕吐2天。查体：意识模糊，全身皮肤散在瘀斑，颈抵抗明显。腰穿：脑脊液压力 300mmH₂O，白细胞 1000/ul，多核细胞 90%，单核白细胞 10%，葡萄糖 10mg/dl，氯化物 100mmol/L，蛋白 900mg/dl，最可能的诊断是： C
- A. 病毒性脑膜炎
 - B. 结核性脑膜炎
 - C. 流行性脑脊髓膜炎

- D. 隐球菌脑膜炎
- E. 乙型脑炎

26. 患者，女，20岁，发热、头痛1周，意识模糊1天。查体：意识模糊，颌胸距3指。腰穿压力230mmH₂O，脑脊液化验白细胞120u/l，多核白细胞30%，淋巴细胞70%，葡萄糖40mg/dl，氯化物110mg/dl，蛋白70mg/dl，最可能的诊断是：

- A. 病毒性脑膜炎
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 隐球菌脑膜炎
- E. 脑膜白血病

27. A 28-year-old woman who work in a poultry processing factory develops an acute febrile illness. Which of the following signs and symptoms is LEAST suggestive of the diagnosis of cryptococcosis () E

- A. Fever
- B. Severe headache
- C. Vomiting
- D. Stiff back and neck
- E. Diarrhea

28. 感染性发热占发热病因的 A

- A. 50~60%
- B. 60~70%
- C. 45~50%
- D. 55~60%
- E. 43%

29. 能直接作用于体温调定点的物质有 B

- A. 细菌内毒素
- B. 重度安眠药中毒
- C. 抗原抗体复合物
- D. 类固醇物质
- E. 无菌性坏死组织

30. 内源性致热原是 C

- A. 只有蛋白质
- B. 含有少量糖的蛋白质
- C. 含有少量糖和脂肪的蛋白质
- D. 含有少量脂肪的蛋白质
- E. 只含有糖和脂肪

31. 下列哪项不是常见的功能性发热 C

- A. 植物功能紊乱所致低热

- B. 病毒感染治愈后低热不退
- C. 脑震荡后低热
- D. 月经前低热
- E. 妊娠期低热

32. 下列哪项是正确的 A

- A. 腋温在 38°C 属于低热
- B. 口温在 38°C 属于低热
- C. 剧烈运动后一般体温可比平时高 1°C
- D. 腋温在 38°C 属于中等度热
- E. 口温在 38°C 属于中等度热

33. 那种疾病的热型不符合体温骤升型 E

- A. 疟疾
- B. 大叶性肺炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 败血症
- E. 布鲁菌病

34. 那种疾病的热型为体温渐降型 D

- A. 疟疾
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 大叶肺炎
- D. 风湿热
- E. 输液反应

35. 对于蜘蛛痣，下列哪项描述是不正确的 C

- A. 蜘蛛痣的发生一般认为与肝对体内雌激素的灭活减弱有关
- B. 它常见于慢性肝炎患者
- C. 不常见于急性黄疸性肝炎患者
- D. 健康妇女在妊娠期间也可出现
- E. 对于某些患者有几个蜘蛛痣则不一定有意义

36. 间歇性跛行常见于 A

- A. 高血压病患者
- B. 脊髓疾病患者
- C. 腓总神经麻痹患者
- D. 有小脑疾患患者
- E. 进行性肌营养不良患者

37. 关于营养下列哪项是不正确的 C

- A. 体重减轻到低于正常标准体重的 10% 时称为消瘦
- B. 体重超过标准体重 20% 以上称为肥胖
- C. 营养状态临床上常用消瘦、肥胖和中等三个等级来描述

- D. 判断营养状态最简单的办法是查看前臂曲侧或上臂背侧下 1/3 的脂肪
E. 幼年时营养不良可影响发育成长

38. 腰穿的禁忌症有 C

- A. 脑膜刺激症状
B. 疑有颅内出血者
C. 疑有细菌性脑膜炎休克患者
D. 疑有白血病侵及脑膜者
E. 剧烈头痛疑有神经系统疾病者

39. 下列对脑脊液的描述那一项是不正确的 D

- A. 结核性脑膜炎时脑脊液可呈毛玻璃状混浊
B. 急性化脓性脑膜炎脑脊液静置 2 小时即可出现凝块
C. 正常脑脊液即使静置 24 小时也不会混浊
D. 结核性脑膜炎时脑脊液静置 8 小时即可在液面形成薄膜
E. 流行性乙型脑炎时脑脊液可为清晰的

40. 下列对脑脊液的描述那一项是不正确的 C

- A. 正常脑脊液中蛋白定性多为阴性，定量则 $0.15 \sim 0.45 \text{mg/L}$
B. 脑脊液中葡萄糖含量约为血的 60%， $45 \sim 80 \text{mg/dl}$ 。不受血脑屏障的影响
C. 脑脊液中葡萄糖含量不受血脑屏障的影响，而受血糖浓度的影响
D. 脑脊液中氯化物含量受血清氯及脑脊液中蛋白含量影响
E. 脑脊液中氯化物的含量比血中含量高为 $119 \sim 129 \text{mmol/l}$

41. 脑脊液中白细胞显著增高，达 $1000 \times 10^6/\text{L}$ 以上，以中性粒细胞为主 A

- A. 化脓性脑膜炎
B. 结核性脑膜炎
C. 病毒性脑膜炎
D. 隐球菌性脑膜炎
E. 急性脑膜白血病

42. 脑脊液中白细胞显著增高，达 $1000 \times 10^6/\text{L}$ 以上，可见幼稚细胞 E

- A. 化脓性脑膜炎
B. 结核性脑膜炎
C. 病毒性脑膜炎
D. 隐球菌性脑膜炎
E. 急性脑膜白血病

43. 脑脊液中氯化物和糖均明显减少，但氯化物减少更明显 B

- A. 化脓性脑膜炎
B. 结核性脑膜炎
C. 病毒性脑膜炎
D. 隐球菌性脑膜炎
E. 急性脑膜白血病

44. 脑脊液中氯化物和糖无明显变化 C

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 隐球菌性脑膜炎
- E. 急性脑膜白血病

45. 脑脊液中墨汁染色可见不透明的荚膜 D

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 隐球菌性脑膜炎
- E. 急性脑膜白血病

46. 稽留热常见于: A

- A. 大叶性肺炎
- B. 败血症
- C. 布鲁菌病
- D. 周期热
- E. 疟疾

47. 弛张热常见于: B

- A. 大叶性肺炎
- B. 败血症
- C. 布鲁菌病
- D. 周期热
- E. 疟疾

48. 回归热 D

- A. 大叶性肺炎
- B. 败血症
- C. 布鲁菌病
- D. 周期热
- E. 疟疾

49. 间歇热 E

- A. 大叶性肺炎
- B. 败血症
- C. 布鲁菌病
- D. 周期热
- E. 疟疾

50. 波状热 C

- A. 大叶性肺炎
- B. 败血症
- C. 布鲁菌病
- D. 周期热
- E. 疟疾

51. 麻疹 B

- A. 高热伴有畏寒寒战
- B. 发热伴有结膜出血
- C. 发热伴有肝脾肿大及血象三系明显降低
- D. 先有发热随后出现昏迷
- E. 先有昏迷随后出现发热

52. 流行性脑脊髓膜炎 D

- A. 高热伴有畏寒寒战
- B. 发热伴有结膜出血
- C. 发热伴有肝脾肿大及血象三系明显降低
- D. 先有发热随后出现昏迷
- E. 先有昏迷随后出现发热

53. 白血病 C

- A. 高热伴有畏寒寒战
- B. 发热伴有结膜出血
- C. 发热伴有肝脾肿大及血象三系明显降低
- D. 先有发热随后出现昏迷
- E. 先有昏迷随后出现发热

54. 脑出血 E

- A. 高热伴有畏寒寒战
- B. 发热伴有结膜出血
- C. 发热伴有肝脾肿大及血象三系明显降低
- D. 先有发热随后出现昏迷
- E. 先有昏迷随后出现发热

55. 败血症 A

- A. 高热伴有畏寒寒战
- B. 发热伴有结膜出血
- C. 发热伴有肝脾肿大及血象三系明显降低
- D. 先有发热随后出现昏迷
- E. 先有昏迷随后出现发热

56. 麻疹早期的特征性皮疹 C

- A. 玫瑰疹
- B. 荨麻疹

C. Koplik 斑

D. 丘疹

E. 斑疹.

57. 猩红热的常见的皮疹 D

A.玫瑰疹

B.荨麻疹

C.Koplik 斑

D.丘疹

E 斑疹.

58. 伤寒特征性的皮疹 A

A. 玫瑰疹

B. 荨麻疹

C. Koplik 斑

D. 丘疹

E. 斑疹.

59. 鱼虾等过敏常见的皮疹 B

A. 玫瑰疹

B. 荨麻疹

C. Koplik 斑

D. 丘疹

E. 斑疹.

60. 丹毒常见的皮疹 E

A. 玫瑰疹

B. 荨麻疹

C. Koplik 斑

D. 丘疹

E. 斑疹.

61. 胃癌最常: B

A. 向右锁骨上淋巴结转移

B. 向左锁骨上淋巴结转移

C. 向颈部淋巴结转移

D. 向滑车上淋巴结转移

E. 向颌下淋巴结转移

62. 鼻咽癌最常: C

A. 向右锁骨上淋巴结转移

B. 向左锁骨上淋巴结转移

C. 向颈部淋巴结转移

D. 向滑车上淋巴结转移

E. 向颌下淋巴结转移

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/025011333224012020>

F.