

2024 辽宁省北票市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库大全【黄金题型】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 需慎用司坦唑醇的是()

- A: 低血压患者
- B: 肝、肾病患者
- C: 高血压患者
- D: 代谢性酸中毒患者

答案：B

2. 适应症仅应用于治疗失眠的药物是()

- A: 苯巴比妥
- B: 氟西汀
- C: 地西泮
- D: 佐匹克隆

答案：D

3. (2020 年真题) 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 头痛、胸闷、气急、出汗
- B: 发热、血管扩张、面色潮红
- C: 喉头水肿、尿潴留
- D: 血压升高或降低、心率加快

答案：C

4. 不良反应多,治疗窗窄个体差异大,与很多药物存在不良相互作用,已降为二线用药的平喘药物是 ()

- A: 茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 氟替卡松
- D: 孟鲁司特

答案: A

5. 兰索拉唑用于治疗胃及十二指肠溃疡的机制是

- A: 阻断 H₂ 受体
- B: 保护胃黏膜
- C: 中和胃酸, 升高胃内 pH
- D: 抑制 H⁺, K⁺-ATP 酶

答案: D

6. 阻断 H

- A: 哌仑西平
- B: 氢氧化铝
- C: 雷尼替丁
- D: 奥美拉唑

答案: C

7. 老年人对苯二氮 (卞卓) 类药较为敏感, 用药后可致平衡功能失调, 觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状, 在临床上称为

- A: 震颤麻痹综合征
- B: 老年期痴呆
- C: 戒断综合征

D: “宿醉”现象

答案: D

8. 下列药物中不用于抗心律失常的是

A: 比索洛尔

B: 胺碘酮

C: 美西律

D: 单硝酸异山梨酯

答案: D

9. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

A: 维生素 K

B: 硫酸鱼精蛋白

C: 氨甲苯酸

D: 维生素

答案: B

10. (2018 年真题) 紫杉醇抗肿瘤的作用机制是()

A: 干扰微管蛋白的合成

B: 抑制二氢叶酸还原酶, 使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸

C: 与 DNA 发生共价结合, 使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂

D: 直接抑制拓扑异构酶, 并与拓扑异构酶形成复合物

答案: A

11. 使淋巴细胞溶解, 致淋巴细胞耗竭

A: 亚叶酸钙

B: 昂丹司琼

C: 地塞米松

D: 氟他胺

答案: C

12. (2020 年真题) 可用于预防 HIV (人免疫缺陷病毒) 感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

A: 阿昔洛韦

B: 金刚烷胺

C: 恩替卡韦

D: 更昔洛韦

答案: D

13. 青霉素 ()

A: 抗菌作用强, 对厌氧菌有效

B: 对 G

C: 特别对铜绿假单胞菌有效

D: 对 G

答案: D

14. 长期大量服用维生素 A 会出现 ()

A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象

C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

D: 严重神经感觉异常, 进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

答案: B

15. 可竞争性地与胞浆中的醛固酮受体结合, 拮抗醛固酮的保钾利尿药是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：D

16. 治疗急慢性肾衰竭的首选药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 氯噻酮类

答案：B

17. 同时具有短效和长效（双时相）作用的胰岛素是

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 预混胰岛素注射液
- D: 赖脯胰岛素注射液

答案：C

18. 某患者新诊断为退行性膝关节炎,既往有磺胺过敏史,不宜选用的非甾体抗炎药是（）

- A: 布洛芬
- B: 塞来昔布
- C: 双氯芬酸
- D: 吲哚美辛

答案：B

19. 下列不属于双膦酸盐类药物的是

- A: 依替膦酸二钠
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 帕米膦酸二钠
- D: 阿法骨化醇

答案：D

20. 伴有冠心病的高血压患者宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 尼莫地平
- C: 尼群地平
- D: 维拉帕米

答案：A

21. 对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

- A: 柔红霉素
- B: 多柔比星
- C: 表柔比星
- D: 吡柔比星

答案：B

22. 属于胃黏膜保护药的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 多潘立酮
- C: 胶体果胶铋
- D: 山莨菪碱

答案：C

23. 抑制脱氧胸苷酸合成酶

- A: 氟尿嘧啶
- B: 羟基脲
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

答案：A

24. 降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好()

- A: 硝普钠
- B: 氨力农
- C: 地高辛
- D: 多巴酚丁胺

答案：A

25. (2017 年真题) 可以引起跟腱断裂, 血糖异常的药物是 ()

- A: 多西环素
- B: 甲矾霉素
- C: 庆大霉素
- D: 加替沙星

答案：D

26. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

- A: 硫酸镁
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 乳果糖
- D: 甘油

答案：C

27. 与氨曲南在结构上相似的头孢菌素类药是

- A: 头孢美唑
- B: 头孢他啶
- C: 头孢噻肟
- D: 氨曲南

答案：B

28. 口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎可选用

- A: 曲伏前列素
- B: 1%碘甘油
- C: 9%硼酸冰片滴耳液
- D: 四环素

答案：B

29. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

- A: 氯化铵
- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：B

30. (2016 年真题) 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 他莫昔芬
- B: 托瑞米芬
- C: 乙烯雌酚
- D: 氟他胺

答案：D

31. 可用于慢性活动性肝炎的治疗的是

- A: 精氨酸
- B: 复方氨基酸注射液（3AA）
- C: 赖氨酸
- D: 复方氨基酸注射液（18AA）

答案：B

32. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 抑制细菌细胞壁的合成
- B: 影响叶酸代谢
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响胞浆膜的通透性

答案：A

33. 属于 I b 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

- A: 普鲁卡因胺
- B: 维拉帕米
- C: 利多卡因
- D: 苯妥英钠

答案：D

34. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 依诺肝素
- C: 拉西地平
- D: 普伐他汀

答案：B

35. 雄激素可降低的体内物质是

A: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）

B: 低密度脂蛋白（LDL）

C: 高密度脂蛋白（HDL）

D: 乳酸脱氢酶（LDH）

答案：C

36. 以下哪种药物对心脏影响最轻

A: 肾上腺素

B: 茶碱

C: 异丙肾上腺素

D: 沙丁胺醇

答案：D

37. 属于还原酶抑制剂的是（）

A: 他达拉非

B: 西地那非

C: 坦洛新

D: 度他雄胺

答案：D

38. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是

A: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

B: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍

C: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

D: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

答案：D

39. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A: 阿卡波糖

B: 二甲双胍

C: 罗格列酮

D: 贝那普利

答案：C

40. ACEI 与 () 联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

A: 人促红素

B: 留钾利尿剂

C: β 受体阻断剂

D: 噻嗪类利尿剂

答案：D

41. 红霉素的作用机制是 ()

A: 与核糖体 70S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

B: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

D: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案：D

42. 适用于各型疟疾，但主要用于抗氯喹恶性疟治疗和凶险型恶性疟的急救的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 奎宁
- C: 双氢青蒿素
- D: 蒿甲醚

答案：D

43. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 利福平
- B: 环孢素
- C: 苯巴比妥
- D: 四环素

答案：B

44. 链霉素首选用于()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 布鲁菌病
- C: 伤寒、副伤寒
- D: 钩端螺旋体病

答案：A

45. 使用多塞平治疗无效时可换用的抗抑郁药是

- A: 丙米嗪
- B: 氯米帕明
- C: 阿米替林

D: 吗氯贝胺

答案: D

46. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别神经毒性较严重的是

A: 卡铂

B: 顺铂

C: 亚叶酸钙

D: 奥沙利铂

答案: D

47. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向选用

A: 氨甲环酸

B: 低分子肝素

C: 维生素 K

D: 尿激酶

答案: C

48. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

A: 甲地孕酮

B: 阿瑞吡坦

C: 甲氧氯普胺

D: 格雷司琼

答案: D

49. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

A: 非诺贝特

B: 盐酸

C: 瑞舒伐他汀

D: 依折麦布

答案: D

50. 用于治疗耐氯喹和耐多种药物虫株所致的恶性疟，也可用于治疗间日疟的药物是

A: 双氢青蒿素

B: 奎宁

C: 蒿甲醚

D: 乙胺嘧啶

答案: B

51. 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状其所激动的受体是 ()

A: M 受体

B: H 受体

C: α 受体

D: N 受体

答案: C

52. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌或对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的严重感染的抗生素为 ()

A: 阿莫西林

B: 氨曲南

C: 哌拉西林

D: 万古霉素

答案: D

53. 肾毒性大的是

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢噻肟
- C: 庆大霉素
- D: 阿莫西林

答案：C

54. 有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

- A: 选择性 COX-2 抑制剂
- B: 芳基丙酸类
- C: 水杨酸类
- D: 芳基乙酸类

答案：C

55. 强效(使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$)的他汀类调血脂药是()

- A: 依折麦布
- B: 小剂量阿托伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 小剂量氟伐他汀

答案：C

56. 下列哪个选项不属于十一酸睾酮的适应症

- A: 原发性或继发性睾丸功能减退
- B: 乳腺癌转移的姑息性治疗
- C: 女性儿童体质性青春期延迟
- D: 前列腺增生引起的排尿障碍

答案：D

57. (2017 年真题) 可降低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油, 主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 利血平
- C: 依折麦布
- D: 阿昔莫司

答案: D

58. 与唑来膦酸合用可使颌骨坏死的发生率升高的药物是

- A: 萘普生
- B: 高钙食品
- C: 沙利度胺
- D: 抗血管生成药

答案: D

59. 属于低危患者可应用 PDE5 抑制剂的是

- A: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- B: 高血压未得到控制者
- C: 中度的充血性心力衰竭
- D: 轻度、稳定型心绞痛

答案: D

60. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 香豆素类
- B: 达肝素钠
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 K1

答案: B

61. 可用于洋地黄中毒导致的室上性心律失常的药物首选

- A: 苯妥英钠
- B: 美西律
- C: 奎尼丁
- D: 氟西汀

答案：A

62. 氨基酸的主要作用不包括

- A: 调节体内酸碱平衡
- B: 合成蛋白质
- C: 维持氮平衡
- D: 转变为糖或脂肪

答案：A

63. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 吡喹酮
- B: 甲苯咪唑
- C: 氯喹
- D: 甲硝唑

答案：C

64. 用于较严重的频繁干咳，极量一次 100mg 的药物是

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬
- D: 地塞米松

答案：A

65. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- B: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- C: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加
- D: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素

答案：A

66. 有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

- A: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效
- B: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌
- C: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用
- D: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用

答案：A

67. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 氯丙嗪
- B: 维生素 C
- C: 他莫昔芬
- D: 红霉素

答案：B

68. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 静脉
- B: 皮下
- C: 口服
- D: 舌下含服

答案：A

69. 下列哪类药物属于快速杀菌药()

- A: 氯霉素类
- B: 氨基糖苷类
- C: 多黏菌素 B
- D: 红霉素

答案：B

70. 可用于大面积烧伤、创伤、高分解代谢、蛋白丢失负氮平衡者()

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 精氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(18AA)
- D: 赖氨酸

答案：C

71. 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是

- A: 2%后马托品眼膏剂
- B: 1%硫酸阿托品眼膏剂
- C: 四环素可的松眼膏剂
- D: 10%去氧肾上腺素滴眼剂

答案：B

72. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 甲苯氢醌
- B: 氨甲环酸
- C: 艾曲泊帕乙醇胺
- D: 酚磺乙胺

答案：B

73. 使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

- A: 3 日
- B: 5 日
- C: 1 日
- D: 7 日

答案：A

74. 主要用于雌激素或孕激素受体阳性的绝经后早期乳腺癌患者的辅助治疗，或已经接受他莫昔芬辅助治疗 5 年的、绝经后、雌激素或孕激素受体阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗，治疗绝经后（自然绝经或人工诱导绝经）、雌激素受体阳性、孕激素受体阳性或受体状况不明的晚期乳腺癌患者，此药物是

- A: 依西美坦
- B: 氟维司群
- C: 他莫昔芬
- D: 来曲唑

答案：D

75. 以下抗寄生虫药的使用方法错误的是

- A: 氯硝柳胺驱牛带绦虫和猪带绦虫应空腹吞服
- B: 蛲虫病易自身重复感染，故在阿苯达唑治疗 2 周后应重复治疗一次
- C: 左旋咪唑驱蛔虫空腹或睡前顿服

D: 阿苯达唑治疗蛲虫病一次即为一疗程，药片需用水吞服

答案：A

76. 对丙咪嗪过敏的患者禁用

A: 氨己烯酸

B: 苯妥英钠

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案：D

77. 患者易于配合，多用于重症患者和儿童的是

A: 雾化吸入溶液

B: 口服制剂

C: 气雾剂

D: 干粉吸入方法

答案：A

78. 高血压伴消化性溃疡患者慎用的药物是

A: 利血平

B: 普萘洛尔

C: 哌唑嗪

D: 卡托普利

答案：A

79. 手术后出血和血友病辅助治疗宜选用

A: 氨甲环酸

B: 维生素 K

C: 鱼精蛋白

D: 硫酸亚铁

答案：A

80. 抗酸作用较强、较快，有导泻作用

A: 碳酸钙

B: 氢氧化铝

C: 氢氧化镁

D: 三硅酸镁

答案：C

81. 用军团菌、支原体肺炎的首选药()

A: 万古霉素

B: 克拉霉素

C: 克林霉素

D: 红霉素

答案：D

82. 属于雄激素类的是

A: 睾酮

B: 甲地孕酮

C: 他莫昔芬

D: 己烯雌酚

答案：A

83. 强心苷中毒最早出现的症状是

A: 色视

B: 眩晕、乏力和视力模糊

C: 房室传导阻滞

D: 厌食、恶心和呕吐

答案: D

84. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

A: 奥布卡因

B: 羟苄唑

C: 阿托品

D: 20%甘露醇

答案: C

85. 烷化剂中易诱发出血膀胱炎的药物是

A: 氮芥

B: 塞替派

C: 环磷酰胺

D: 卡莫司汀

答案: C

86. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别骨髓抑制较严重的是

A: 卡铂

B: 奥沙利铂

C: 顺铂

D: 亚叶酸钙

答案: A

87. 以下平喘药可辅助治疗急性心功能不全和心源性哮喘的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 布地奈德

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/025122333114012033>