

2024 甘肃省景泰县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整版汇总

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是（）

- A: 夜间哮喘的预防和维持治疗
- B: 肺气肿伴气道痉挛的治疗
- C: 慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗
- D: 缓解支气管痉挛的急性症状

答案：D

2. 能明显抑制骨髓造血功能的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 氯霉素
- D: 青霉素 G

答案：C

3. 通过抑制 HMG-CoA 还原酶调血脂的药物是

- A: 阿昔莫司
- B: 烟酸
- C: 依折麦布
- D: 洛伐他汀

答案：D

4. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

- A: 呋塞米
- B: 丙磺舒
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：D

5.（2018 年真题）可用于治疗非何杰金（非霍奇金）淋巴瘤的单克隆抗体是（）

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐珠单抗
- C: 曲妥珠单抗
- D: 利妥昔单抗

答案：D

6. 硫脲类药物用于

- A: 甲亢
- B: 糖尿病
- C: 高血压
- D: 精神病

答案：A

7. 可致男性胎儿外生殖器发育畸形，妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 多沙唑嗪
- C: 非那雄胺
- D: 赛洛多辛

答案：C

8. 属于 M 受体阻断剂的药物是

- A: 奥布卡因
- B: 阿托品
- C: 乙酰唑胺
- D: 拉坦前列素

答案：B

9. 主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后 2~28 日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为 146 小时的是

- A: 帕米膦酸二钠
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 依替膦酸二钠
- D: 唑来膦酸

答案：D

10. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

- A: 乳膏剂
- B: 油剂
- C: 洗剂
- D: 粉剂

答案：A

11. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是 ()

- A: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂
- B: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用
- C: 可用于过敏性皮炎的治疗

D: 若继发细菌或真菌感染,可与抗菌药或抗真菌药联合使用

答案: A

12. 对视觉起作用的是

A: 视黄醛

B: 视黄酸

C: 视黄醇

D: 维生素 A

答案: A

13. 主要经肝脏代谢,受肾功能影响小,可用于肾功能不全患者的强心苷是

A: 毛花苷丙(西地兰 C)

B: 地高辛

C: 洋地黄毒苷

D: 去乙酰毛花苷(西地兰 D)

答案: C

14. 与鲑降钙素合用,有可能急速降血钙,出现严重低钙血症的是

A: 钙剂

B: 维生素 D

C: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂

D: 铁剂

答案: C

15. 可用于洋地黄中毒导致的室上性心律失常的药物首选

A: 氟西汀

B: 美西律

C: 奎尼丁

D: 苯妥英钠

答案: D

16. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

A: 英夫利昔单抗

B: 西妥昔单抗

C: 利妥昔单抗

D: 贝伐单抗

答案: C

17. (2018 年真题) 肝素过量所致出血的解救药物是 ()

A: 维生素 K

B: 鱼精蛋白

C: 蛇毒血凝酶

D: 酚磺乙胺

答案: B

18. 长期大剂量服用可产生欣快感，可能出现药物依赖性的具有阿片样作用的止泻药是

A: 蒙脱石散

B: 地芬诺酯

C: 洛哌丁胺

D: 硫酸镁

答案: B

19. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 尿激酶
- B: 阿替普酶
- C: 链激酶
- D: 瑞替普酶

答案：C

20. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 佝偻病
- B: 夜盲症
- C: 脚气病
- D: 不孕症

答案：D

21. 长期大量与阿司匹林或其他 NSAID 合用时，可明显增加肾毒性的是

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

22. 下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

- A: 环孢素
- B: 米非司酮
- C: 黄体酮
- D: 奥利司他

答案：D

23. 下述药物中兼有角质溶解和抑制真菌作用的是

- A: 苯甲酸
- B: 特比萘芬
- C: 咪康唑
- D: 阿莫罗芬

答案：A

24. 为最受推荐的常规避孕药，择期手术和长期卧床者，需在手术前一个月停止使用的是

- A: 雌激素
- B: 孕激素
- C: 长效避孕药
- D: 短效口服避孕药

答案：D

25. 对 M3 受体选择性高，可避免心脏及中枢神经系统的严重不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 黄酮哌酯
- B: 奥昔布宁
- C: 索利那新
- D: 托特罗定

答案：C

26. 可能导致跟腱断裂和血糖异常的抗菌药物是

- A: 甲磺霉素
- B: 庆大霉素
- C: 加替沙星
- D: 多西环素

答案：C

27. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

- A: 甲氨蝶呤
- B: 来曲唑
- C: 羟喜树碱
- D: 卡莫氟

答案：B

28. 地高辛与其合用，可使血清地高辛浓度增加 70%~100% 的药物是

- A: 沙库巴曲缬沙坦
- B: 阿托品
- C: 胺碘酮
- D: 阿利吉仑

答案：C

29. 下列关于过氧化氢的用法及注意事项，叙述错误的是

- A: 避免皮肤及黏膜接触高浓度溶液
- B: 妊娠及哺乳期妇女慎用
- C: 遇光稳定，不易变质
- D: 遇氧化物或还原物即迅速分解并产生泡沫

答案：C

30. (2018 年真题) 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 预混胰岛素注射液
- D: 甘精胰岛素注射液

答案：B

31. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 $15 \sim 20 \mu g/ml$ 并且长疗程的患者

B: 肾功能不全者

C: 老年人

D: 肝功能不全者

答案：D

32. 下列关于肝素类药物的抗凝血作用描述正确的是

A: 仅在体内有效

B: 体内、体外均有强大的抗凝作用

C: 仅在体外有效

D: 用药 2 个月后需检测血小板计数

答案：B

33. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

A: 血小板增多

B: 高钾血症

C: 低血糖

D: 低氯碱血症

答案：B

34. 与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

A: 莫沙必利

B: 双八面体蒙脱石

C: 酚酞

D: 地芬诺酯

答案: D

35. 小剂量雌激素用于

A: 痛经

B: 再生障碍性贫血

C: 回奶

D: 绝经期综合征

答案: D

36. 多柔比星与 β 受体阻滞药合用，可能()

A: 导致坏死性结肠炎

B: 增加肝毒性

C: 增加心脏毒性

D: 易产生沉淀

答案: C

37. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

A: 慢性失血性贫血

B: 再生障碍性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 神经炎

答案: D

38. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素 (FT3、FT4) 增高、促甲状腺素 (TSH) 降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 甲巯咪唑
- B: 碳酸锂
- C: 卡比马唑
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

39. 用于高钾血症或普鲁卡因胺引起的心律失常伴有酸血症者的药品是 ()

- A: 谷氨酸
- B: 氯化钾
- C: 乳酸钠
- D: 硫酸镁

答案：C

40. 属于Ⅰ类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是 ()

- A: 普萘洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：C

41. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 坦洛新

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 特拉唑嗪

C: 酚苄明

D: 乙酰唑胺

答案: A

42. 治疗 MRSA 感染首选药物是

A: 红霉素

B: 克林霉素

C: 林可霉素

D: 万古霉素

答案: D

43. 属于长效 B₂ 受体激动剂的平喘

A: 沙丁胺醇

B: 多索茶碱

C: 沙美特罗

D: 布地奈德

答案: C

44. 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

A: 氨氯地平

B: 赖诺普利

C: 吧达帕胺

D: 普萘洛尔

答案: B

45. 可致色觉异常的药物是

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 硝酸甘油

D: 地高辛

答案：D

46. 下述药物中不可用于治疗深部真菌感染的是

A: 制霉菌素

B: 伊曲康唑

C: 灰黄霉素

D: 两性霉素

答案：C

47. (2015 年真题) 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 ()。

A: 干扰素

B: 恩替卡韦

C: 拉米夫定

D: 泛昔洛韦

答案：D

48. 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反是 ()。

A: 肺部纹理加重

B: 急性肾衰竭

C: 胰腺坏死

D: 急性肝衰竭

答案：B

49. 亚胺培南西司他丁一般不宜用于

A: 社区获得性感染

- B: 对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染
- C: 严重需氧菌与厌氧菌混合性感染
- D: 病原菌未查明严重感染

答案：A

50. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 阻断 CTZ 的 D
- B: 阻断 H
- C: 抗幽门螺杆菌
- D: 抑制胃壁细胞的 H

答案：B

51. 脑瘤的首选药是

- A: 羟喜树碱
- B: 依托泊苷
- C: 替尼泊苷
- D: 博来霉素

答案：C

52. 链霉素首选用于()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 布鲁菌病
- C: 鼠疫、土拉菌病
- D: 伤寒、副伤寒

答案：C

53. 复方氨基酸注射液出现发热、头痛、心悸、寒战等反应，主要是因为

- A: 含有过敏原
- B: 患者的个体差异
- C: 静脉滴注速度过快
- D: 含有的氨基酸种类太多

答案：C

54. 已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

- A: 注射用硫酸长春新碱
- B: 注射用柔红霉素
- C: 紫杉醇注射液
- D: 注射用盐酸博来霉素

答案：C

55. (2018 年真题) 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是 ()

- A: 噻托溴铵
- B: 沙美特罗
- C: 茶碱
- D: 孟鲁司特

答案：A

56. 可预防环磷酰胺所致泌尿系毒性的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 美司钠
- C: 呋塞米
- D: 维生素

答案：B

57. 属于耐酸耐酶的青霉素类药物是()

- A: 甲氧西林
- B: 丙匹西林
- C: 阿莫西林
- D: 青霉素

答案: A

58. 使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

- A: 3 日
- B: 7 日
- C: 5 日
- D: 1 日

答案: A

59. 主要抑制排卵的短效口服避孕药是()

- A: 苯丙酸诺龙
- B: 丙酸睾酮
- C: 复方炔诺酮
- D: 炔诺酮

答案: C

60. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于

- A: 湿疹
- B: 变态反应性疾病
- C: 顽固性支气管哮喘
- D: 中毒性感染和休克

答案: D

61. 为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

- A: VLDL
- B: HDL
- C: IDL
- D: LDL

答案：B

62. 利多卡因对哪种心律失常无效()

- A: 阵发性室性心动过速
- B: 室性期前收缩
- C: 室上性
- D: 心室纤颤

答案：C

63. 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A: 乳酸钠注射液收售，
- B: 门冬氨酸钾镁注射液
- C: 二磷酸果糖注射液
- D: 葡萄糖注射液

答案：C

64. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是()

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：D

65. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 餐后半小时
- B: 随餐服用
- C: 餐后 2 小时
- D: 餐前半小时

答案：B

66. 属于 I c 类抗心律失常药的是

- A: 胺碘酮
- B: 利多卡因
- C: 普罗帕酮
- D: 奎尼丁

答案：C

67. 下述哪种药物与氨基糖苷类抗生素合用可能出现呼吸抑制或呼吸停止

- A: 硫糖铝
- B: 奥美拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 多潘立酮

答案：C

68. 克拉霉素与环孢素合用()

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 不良反应叠加

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 药理作用拮抗

答案：C

69. 可减少妊娠子宫兴奋，用于治疗先兆性流产和习惯性流产的药物是

A: 孕激素

B: 雌激素

C: 短效口服避孕药

D: 长效避孕药

答案：A

70. 属于促胰岛素分泌剂的是()。

A: 艾塞那肽

B: 二甲双胍

C: 那格列奈

D: 阿卡波糖

答案：C

71. 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的是

A: 沙格列汀

B: 瑞格列奈

C: 格列美脲

D: 罗格列酮

答案：A

72. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 铁剂不应与浓茶同服，浓茶含有的鞣酸可与铁形成沉淀，使铁剂的吸收减少
- B: 治疗期间应定期检查血象和血清铁水平
- C: 宜在餐后或餐时服用
- D: 进食可促进铁剂的吸收

答案：D

73. 放射性碘

- A: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- B: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- C: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- D: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：A

74. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

- A: 心律失常
- B: 高血压
- C: 充血性心力衰竭
- D: 心肌梗死

答案：A

75. 下列药物中，不属于雌激素的是

- A: 雌二醇
- B: 黄体酮
- C: 尼尔雌醇
- D: 雌三醇

答案：B

76. 主要增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素敏感性的药物是

- A: 罗格列酮
- B: 胰岛素
- C: 氢氧化镁
- D: 二甲双胍

答案：D

77. 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用用于治疗痤疮的药物是
()

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 过氧苯甲酰
- D: 壬二酸

答案：C

78. 作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

- A: 紫杉醇
- B: 枸橼酸他莫昔芬
- C: 吉非替尼
- D: 巯嘌呤

答案：C

79. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

- A: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量
- B: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药
- C: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量
- D: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

答案：D

80.（2016 年真题）患者，男，55 岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是

- A: 脱发
- B: 心悸
- C: 体位性低血压
- D: 性欲减退

答案：D

81.（2018 年真题）肾结石患者禁用的药物是（）

- A: 非布索坦
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 苯溴马隆

答案：D

82. 抑制碳酸酐酶，利尿作用弱的药物是

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：C

83. 具有低毒，可用于对青霉素类、头孢菌素类过敏的患者的药物是（）

- A: 亚胺培南
- B: 氨曲南
- C: 克拉维酸

D: 阿莫西林

答案: B

84. 治疗贾第鞭毛虫病最有效的药物是()。

A: 甲硝唑

B: 奎宁

C: 氯喹

D: 伯氨喹

答案: A

85. 避孕药的作用机制不包括

A: 使子宫腺体制造糖原减少

B: 改变子宫颈黏液

C: 抑制排卵

D: 使子宫黏膜内腺体生长

答案: D

86. 抗血小板药西洛他唑属于

A: 整合素受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

D: 维生素 K 拮抗剂

答案: B

87. 属于刺激性泻药的是()

A: 欧车前

B: 番泻叶

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 利那洛肽

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/025141134114012033>