

2024 江苏省建湖县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题大全（综合题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 脓毒血症引起的严重肾衰竭使用

- A: 复方氨基酸（18AA- I）
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 复方氨基酸注射液（3AA）
- D: 苯丙氨酸

答案：B

2. 属于芳香酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 阿那曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 炔雌醇
- D: 氟他胺

答案：A

3. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 作为一级预防，降低心肌梗死死亡率
- B: 长期应用者突然停药可发生反跳现象
- C: 老年高血压患者一般首选 β 受体阻断剂
- D: 糖脂代谢异常时首选 β 受体阻断剂

答案：B

4. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

- A: 惊厥
- B: 剧烈疼痛
- C: 阿片中毒
- D: 失眠

答案：C

5. （2016 年真题）华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

- A: 依诺肝素
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B2

答案：A

6. 口服呋喃妥因可用于治疗()

- A: 尿路感染
- B: 呼吸道感染
- C: 肠道感染
- D: 肺感染

答案：A

7. 抗酸作用较强、较快，有导泻作用

- A: 碳酸钙
- B: 氢氧化铝
- C: 三硅酸镁
- D: 氢氧化镁

答案：D

8. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 13. 4×10⁹ / L，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑对曲霉菌有效
- B: 氟康唑是肝药酶诱导剂
- C: 氟康唑首次使用不需给予负荷剂量
- D: 氟康唑用于治疗侵袭性念珠菌感染

答案：D

9. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

- A: CYP286
- B: CYP2C19
- C: CYP2D6
- D: CYP3A4

答案：B

10. 抗胆碱 M 受体药的药理作用不包括

- A: 收缩胃肠平滑肌
- B: 解除毛细血管痉挛
- C: 扩张支气管
- D: 抑制腺体分泌

答案：A

11. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是

- A: 维生素 K1
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 鱼精蛋白
- D: 氨基己酸

答案：D

12. 硝酸酯类、 β 受体阻断药、Ca

- A: 缩小心室容积
- B: 降低心肌耗氧量
- C: 扩张冠状动脉
- D: 减慢心率

答案：B

13. (2017 年真题) 关于镇咳药作用强度的比较, 正确的是 ()

- A: 可待因 > 苯丙哌林 > 喷托维林
- B: 喷托维林 > 苯丙哌林 > 可待因
- C: 苯丙哌林 > 可待因 > 喷托维林
- D: 苯丙哌林 > 喷托维林 > 可待因

答案：C

14. 属于容积性泻药的是 ()

- A: 番泻叶
- B: 多库酯钠
- C: 欧车前
- D: 利那洛肽

答案：C

15. 作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是
()

- A: 亚胺培南
- B: 氨曲南
- C: 阿莫西林
- D: 克拉维酸

答案：C

16. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及记忆障碍药是

- A: 利斯的明
- B: 多奈哌齐
- C: 吡拉西坦
- D: 胞磷胆碱

答案：C

17. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 喷托维林
- D: 福尔可定

答案：B

18. 依普黄酮可用于

- A: 儿童及青少年
- B: 妊娠期及哺乳期妇女

C: 绝经期超过 2 年以上的妇女

D: 低钙血症者

答案: C

19. 氨基糖苷类抗菌药无效的是()

A: 厌氧菌和肠球菌

B: 结核杆菌

C: 需氧革兰阴性菌

D: 铜绿假单胞菌

答案: A

20. 抗酸作用较强、较慢，有导泻作用的是

A: 碳酸钙

B: 三硅酸镁

C: 氢氧化铝

D: 氢氧化镁

答案: D

21. 对阴道滴虫有很好疗效的是

A: 甲硝唑

B: 链霉素

C: 青蒿素

D: 二氯沙奈

答案: A

22. 中枢性或肾性尿崩症可选用

A: 螺内酯

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案: B

23. 甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是

A: 口服一日 4~8mg, 连服 5~10 日

B: 口服, 一次 10~20mg, 每 4~8 小时一次, 连用 2~3 日; 血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量, 直至维持量每日 100mg, 连续用药至血止后 21 日停药

C: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服, 一次 10mg, 一日 1 次, 连用 10~14 日, 酌情应用 3~6 个周期

D: 一日 30mg, 连服 6 个月

答案: B

24. 顺铂所致的肾损害会延缓药物的排泄而导致肾毒性增加, 该药物是

A: 苯海拉明

B: 甲氨蝶呤

C: 丙磺舒

D: 呋塞米

答案: B

25. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

A: 枸橼酸他莫昔芬

B: 巯嘌呤

C: 吉非替尼

D: 紫杉醇

答案: D

26. 治疗 MRSA 的首选药物是

- A: 万古霉素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 林可霉素

答案：A

27. (2015 年真题) 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是 ()。

- A: 罗格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 西格列汀
- D: 二甲双胍

答案：B

28. 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 替普瑞酮
- C: 胶体果胶铋
- D: 复方碳酸钙

答案：A

29. 可抑制花生四烯酸转化为白三烯 ()

- A: 过氧苯甲酰
- B: 阿达帕林
- C: 维 A 酸
- D: 异维 A 酸

答案：B

30. 肾上腺皮质功能不全采用

- A: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素
- B: 糖皮质激素替代疗法
- C: 抗结核药与糖皮质激素合用
- D: 抗菌药物与糖皮质激素合用

答案：B

31. 左氧氟沙星用于治疗()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 钩端螺旋体病
- C: 伤寒、副伤寒
- D: 布鲁菌病

答案：C

32. 强心苷的作用机制不包括()

- A: 使细胞内的 Ca
- B: 使细胞内的 Na
- C: 抑制 Na
- D: 使细胞内的 Na

答案：D

33. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

- A: 第三代头孢菌素
- B: 第一代头孢菌素
- C: 第二代头孢菌素
- D: 第四代头孢菌素

答案：D

34. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

- A: 一日一次，晨起使用
- B: 一日二次，早、晚使用
- C: 一日一次，睡前使用
- D: 一日一次，固定时间使用

答案：C

35. 糖皮质激素诱发或加重感染的主要原因是()

- A: 激素用量不足，无法控制症状
- B: 抑制机体的免疫功能
- C: 患者对激素不敏感，未反映出相应的疗效
- D: 激素促使许多病原微生物繁殖

答案：B

36. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：
二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

- A: 现有方案不存在低血糖的风险
- B: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 用药期间应定期检查空腹血糖、尿糖、尿酮体及肝、肾功能

答案：A

37. (2019 年真题) 长期服用呋塞米，易发生的不良反应是()

- A: 高钠血症
- B: 高氯血症
- C: 低尿酸血症
- D: 低钾血症

答案：D

38. 临床作为控制复发和阻止疟疾传播的首选药的药物是()。

- A: 奎宁
- B: 伯氨喹
- C: 氯喹
- D: 甲硝唑

答案：B

39. (2018 年真题) 阿哌沙班属于 ()

- A: 直接凝血酶抑制剂
- B: 环氧酶抑制剂
- C: 凝血因子 X 抑制剂
- D: 维生素 K 拮抗剂

答案：C

40. 以下关于奥利司他使用的叙述，错误的是

- A: 体重指数为 23 的人可使用
- B: 脂溶性维生素应在服用本品 2 小时后或在睡前服用
- C: 应在餐时或餐后 1 小时内服用，如有一餐未进或食物中不含脂肪，可省略一次服药
- D: 药效在给药后 24~48 小时即可显现，停止治疗后 48~72 小时恢复

答案：A

41. 头孢曲松()

- A: 用于非典型致病原感染
- B: 肾毒性较大
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案: C

42. (2015 年真题) 具有心脏毒性的抗肿瘤药是 ()。

A: 紫杉醇

B: 柔红霉素

C: 长春新碱

D: 博来霉素

答案: B

43. 主要通过增强靶组织对胰岛素的敏感性，减轻胰岛素抵抗发挥疗效的药物是

A: 氢氧化镁

B: 二甲双胍

C: 罗格列酮

D: 胰岛素

答案: C

44. 睾酮治疗原发性和继发性男性性功能低下最有效的给药方法是

A: 肠道外给药

B: 透皮给药

C: 口服给药

D: 注射给药

答案: D

45. (2016 年真题) 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

A: 阿普唑仑

B: 异戊巴比妥

C: 佐匹克隆

D: 地西泮

答案: B

46. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 泼尼松

B: 顺铂

C: 奥沙利铂

D: 吉西他滨

答案: C

47. 抗阿米巴原虫药的药物是()。

A: 奎宁

B: 氯喹

C: 甲硝唑

D: 伯氨喹

答案: C

48. 甲状腺功能亢进症的内科治疗宜选用()

A: 吡格列酮

B: 小剂量碘剂

C: 甲巯咪唑

D: 甲状腺素

答案: C

49. 下列说法中错误的是

A: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑

B: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬

C: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

D: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

答案：D

50. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列哪项不属于多柔比星的禁忌证

A: 骨髓功能抑制

B: 腰椎间盘突出

C: 妊娠及哺乳期妇女

D: 严重心脏病

答案：B

51. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

A: 匹氨西林

B: 美西林

C: 苯唑西林

D: 青霉素 V

答案：B

52. 基因重组产品，与天然内源性红细胞生成素作用相似的是()

A: 重组人促红素

B: 叶酸

C: 链激酶

D: 尿激酶

答案：A

53. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是()

- A: 纳武利尤单抗
- B: 巯嘌呤
- C: 氟尿嘧啶
- D: 环磷酰胺

答案：A

54. 唯一可用于治疗深部和皮下真菌感染的多烯类药物是

- A: 制霉菌素
- B: 氟康唑
- C: 两性霉素
- D: 灰黄霉素

答案：C

55. 首次用药可出现"首剂现象"的药物是()

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 依那普利
- D: 哌唑嗪

答案：D

56. (2019 年真题) 竞争性抑制胃肠道的 α -葡萄糖苷酶活性减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收，可降低餐后血糖的药物是()

- A: 伏格列波糖
- B: 格列吡嗪
- C: 吡格列酮

D: 二甲双胍

答案: A

57. 氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是()

A: 胃肠道反应

B: 二重感染

C: 对肝脏严重损害

D: 对造血系统的毒性

答案: D

58. 吗啡的镇痛作用机制主要是

A: 增强止痛效果

B: 加重呼吸抑制

C: 增强镇静作用

D: 诱发精神错乱

答案: C

59. 重症甲状腺功能亢进症病情未控制者不宜使用

A: None

B: 大剂量碘制剂

C: 小剂量碘制剂

D: 甲状腺素

答案: A

60. 扎鲁司特属于

A: 黄嘌呤类药物

B: M 胆碱受体阻断剂

C: 白三烯调节剂

D: β 肾上腺素受体激动剂

答案：C

61. 氯沙坦的降压作用机制是()

A: 阻断 AT

B: 阻断 AT

C: 阻断 α 受体

D: 阻断 β 受体

答案：B

62. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

A: 帕罗西汀

B: 度洛西汀

C: 马普替林

D: 吗氯贝胺

答案：A

63. 主要作用于 S 期的抗肿瘤药物是

A: 烷化剂

B: 抗癌抗生素

C: 长春碱类

D: 抗代谢药

答案：D

64. 属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的是

A: 利伐沙班

B: 肝素

C: 华法林

D: 依诺肝素

答案：A

65. 滴眼后可出现口腔苦味的药物是

A: 更昔洛韦

B: 氯霉素

C: 利巴韦林

D: 四环素可的松

答案：B

66. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

A: 阿法骨化醇

B: 奥利司他

C: 鲑降钙素

D: 阿仑膦酸钠

答案：C

67. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

A: 泛昔洛韦

B: 拉米夫定

C: 干扰素- α

D: 恩替卡韦

答案：A

68. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

A: 甲氨蝶呤

B: 卡莫氟

C: 来曲唑

D: 喜树碱

答案: C

69. 下列关于蛇毒血凝酶的给药途径，错误的是

A: 静脉注射

B: 皮下注射

C: 肌肉注射

D: 口服给药

答案: D

70. 严重低钾血症、高钠血症、高血压、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用的药物是

A: 甘草酸二铵

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 甲氧氯普胺

D: 雷尼替丁

答案: A

71. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松

B: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

C: 奥美拉唑+口服地塞米松

D: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

答案: B

72. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

B: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

C: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

D: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

答案：C

73. 属于 IC 类抗心律失常药的是

A: 奎尼丁

B: 普罗帕酮

C: 普鲁卡因胺

D: 胺碘酮

答案：B

74. 人体主要的热能来源是

A: 果糖

B: 葡萄糖

C: 维生素

D: 氨基酸

答案：B

75. 破坏 DNA 结构和功能的抗肿瘤药是

A: 5-氟尿嘧啶

B: 环磷酰胺

C: 吉非替尼

D: 多柔比星

答案：B

76. (2016 年真题) 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是

- A: 佐匹克隆
- B: 地西泮
- C: 苯巴比妥
- D: 唑吡坦

答案：C

77. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

- A: 乙胺嘧啶+磺胺药
- B: 静脉滴注奎宁
- C: 咯萘啶或甲氟喹
- D: 氯喹+伯氨喹

答案：C

78. 与阿托品比较，东莨菪碱的特点是

- A: 对胃肠道平滑肌作用强
- B: 对有机磷中毒解救作用强
- C: 中枢镇静作用较强
- D: 对眼的作用强

答案：C

79. 体内缺乏维生素 B1 会导致

- A: 脚气病
- B: 贫血
- C: 不孕症
- D: 脂溢性皮炎

答案：A

80. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列喹酮

答案：D

81. 属于第四代头孢菌素的药物是

- A: 头孢克洛
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢拉定

答案：B

82. 与长春新碱合用可产生严重的周围神经病

- A: 非格司亭
- B: 异烟肼
- C: 铂类
- D: 替尼泊苷

答案：A

83. 氨基苷类通过下列哪种屏障比较容易

- A: 血睾屏障
- B: 血脑屏障
- C: 黏液屏障
- D: 胎盘屏障

答案：D

84. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 慢性收缩性心力衰竭
- B: 梗阻性肥厚型心脏病
- C: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- D: 室性心动过速、心室颤动

答案：A

85. (2021 年真题) 痰培养结果为铜绿假单胞菌，宜选用的抗菌药物是 ()

- A: 苄星青霉素
- B: 青霉素 G
- C: 苯唑西林
- D: 哌拉西林他唑巴坦

答案：D

86. 需慎用司坦唑醇的是 ()

- A: 代谢性酸中毒患者
- B: 高血压患者
- C: 肝、肾病患者
- D: 低血压患者

答案：C

87. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

- A: 氨基己酸
- B: 卡巴洛克
- C: 氨甲苯酸
- D: 酚磺乙胺

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/025344344114012033>