

## 2024 年河北省新河县《执业药师之西药学专业二》资格考试内部题库 A4 版打印

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 依普黄酮可用于

- A: 妊娠期及哺乳期妇女
- B: 绝经期超过 2 年以上的妇女
- C: 儿童及青少年
- D: 低钙血症者

**答案：B**

2. 与肝素相比，华法林的作用特点不包括

- A: 价格便宜
- B: 作用持久
- C: 起效快
- D: 口服有效，应用方便

**答案：C**

3. 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

- A: 青蒿素
- B: 乙胺嘧啶
- C: 奎宁
- D: 伯氨喹

**答案：B**

4. (2019 年真题) 某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是 ( )

A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg

**答案: A**

5. (2021 年真题) 若无禁忌证，治疗 2 型糖尿病首选的口服降糖药物 ( )

A: 达格列净

B: 沙格列汀

C: 吡格列酮

D: 二甲双胍

**答案: D**

6. 治疗伤寒、副伤寒，且有耳毒性的药物是

A: 加替沙星

B: 红霉素

C: 氯霉素

D: 青霉素

**答案: C**

7. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 磺酰脲类过敏
- B: 高血钾
- C: 肝功能不全
- D: 无尿

**答案：C**

8. （2017 年真题）治疗青光眼宜选用（ ）

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 托吡卡胺滴眼剂
- C: 拉坦前列素滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

**答案：C**

9. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 减少房水生成
- B: 收防止激光手术后的反应性眼压升高
- C: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳
- D: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用

**答案：A**

10. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

- A: 长春碱
- B: 他莫昔芬
- C: 紫杉醇
- D: 羟喜树碱

**答案：A**

11. 抑制骨髓造血功能的是

- A: 四环素
- B: 庆大霉素
- C: 红霉素
- D: 氯霉素

**答案：D**

12. 能与胰岛素竞争血浆蛋白，升高胰岛素血浆浓度的是

- A: 磺胺甲唑
- B: 普萘洛尔
- C: 格列喹酮
- D: 甲状腺素

**答案：A**

13. 强心苷中毒最早出现的症状是

- A: 厌食、恶心和呕吐
- B: 眩晕、乏力和视力模糊
- C: 色视
- D: 房室传导阻滞

**答案：A**

14. 以下哪种药物对心脏影响最轻

- A: 肾上腺素
- B: 茶碱
- C: 异丙肾上腺素
- D: 沙丁胺醇

**答案：D**

15. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 短效  $\beta_2$  受体激动剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 吸入性糖皮质激素

**答案：B**

16. 抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

- A: 环磷酰胺
- B: 放线菌素 D
- C: 丝裂霉素
- D: 阿霉素

**答案：A**

17. (2020 年真题) 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防过敏反应
- B: 预防粒细胞缺乏
- C: 预防出血过多
- D: 预防癌症复发

**答案：B**

18. 防止急性血栓的首选药物是

- A: 维生素 B
- B: 维生素 K
- C: 肝素

D: 香豆素类

**答案：C**

19. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

A: 非诺贝特

B: 依折麦布

C: 阿昔莫司

D: 阿托伐他汀

**答案：B**

20. 广谱抗菌药，对细胞内外的结核分枝杆菌、麻风杆菌均有抑制作用的是

A: 利福平

B: 异烟肼

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

**答案：A**

21. 属于钙通道阻滞剂（第 IV 类）的抗心律失常药是

A: 美西律

B: 拉贝洛尔

C: 维拉帕米

D: 胺碘酮

**答案：C**

22. 刺激胰岛细胞分泌胰岛素的是()

A: 胰岛素

B: 磺酰脲类

C: 二甲双胍

D: A 和 B 均无效

**答案: B**

23. (2015 年真题) 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是 ( )

。

A: 卡比马唑片

B: 甲巯咪唑片

C: 复方碘口服液

D: 甲状腺片

**答案: B**

24. 阻断白三烯受体, 起效缓慢, 作用较弱, 仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是 ( )

A: 氟替卡松

B: 沙美特罗

C: 茶碱

D: 孟鲁司特

**答案: D**

25. 患者, 女, 55 岁, 临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下

:

A: 服药过程中适当补充维生素 B

B: 若出现低血糖反应, 应立即饮用蔗糖水

C: 可能出现的不良反应有腹痛, 腹泻, 腹胀

D: 服药期间不要饮酒, 以免引起低血糖

**答案: B**

26. 可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

- A: 水杨酸类
- B: 碳酸氢钠
- C: 氯霉素
- D: 磺胺类

**答案：B**

27. (2015 年真题) 属于 H<sub>2</sub> 受体阻断剂的是 ( )。

- A: 奥美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 法莫替丁
- D: 氯苯那敏

**答案：C**

28. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是

- A: 增强交感神经效应
- B: 延长房室结的功能性不应期
- C: 阻滞  $\beta$  肾上腺素能受体
- D: 减慢心房和房室结的传导

**答案：A**

29. 选择性抑制延髓咳嗽中枢，并具有微弱的阿托品样作用，适用于各种原因引起的无痰干咳的药物是

- A: 福尔可定
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 苯丙哌林

**答案：C**

30. 螺内酯与下列哪种氨基酸合用可导致高钾血症

- A: 色氨酸
- B: 缬氨酸
- C: 赖氨酸
- D: 精氨酸

**答案：D**

31. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌

- A: 急性前壁心肌梗死
- B: 青光眼患者
- C: 严重低血压者
- D: 已使用西地那非者

**答案：A**

32. 红霉素的作用机制是

- A: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程
- B: 与核蛋白 70s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- C: 与核蛋白 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- D: 与核蛋白 50s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

**答案：D**

33. 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是

- A: 特比萘芬
- B: 阿莫罗芬
- C: 制霉菌素
- D: 联苯卡唑

**答案：A**

34. 可沉积在牙齿和骨的钙质区内，引起胎儿牙齿变色的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 多西环素

**答案: C**

35. 患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6~8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8~10/HP，红细胞3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。

- A: 地芬诺酯对肠道作用类似吗啡
- B: 含地芬诺酯和阿托品
- C: 地芬诺酯是吗啡的衍生物
- D: 为阿片受体激动剂

**答案: C**

36. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

- A: 咯萘啶或甲氟喹
- B: 乙胺嘧啶+磺胺药
- C: 氯喹+伯氨喹
- D: 静脉滴注奎宁

**答案: A**

37. 少数病人首次用药出现首剂效应的是

- A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 哌唑嗪

D: 地高辛

**答案: C**

38. 叶酸与维生素 B12 联用治疗

A: 再生障碍性贫血

B: 小细胞低血红蛋白性贫血

C: 溶血性贫血

D: 巨幼细胞贫血

**答案: D**

39. 下列哪项不是血管紧张素转化酶抑制药的主要临床应用()

A: 心律失常

B: 充血性心力衰竭

C: 心肌梗死

D: 高血压

**答案: A**

40. (2015 年真题) 长期使用可使血钾水平升高的药品是 ( )。

A: 吲达帕胺

B: 乙酰唑胺

C: 氨苯蝶啶

D: 呋塞米

**答案: C**

41. 属于阴道杀精药的是

A: 壬苯醇醚

- B: 米非司酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 氯地孕酮

**答案：A**

42. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

- A: 比索洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 依那普利
- D: 地尔硫?

**答案：A**

43. 选择性雌激素受体调节剂可能增加静脉血栓栓塞事件的危险性，危险性最大的时期是

- A: 治疗初始时 2 个月内
- B: 治疗开始 6 个月后
- C: 治疗初始时 4 个月内
- D: 治疗初始时 1 个月内

**答案：C**

44. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂药物的是()。

- A: 维拉帕米
- B: 尼莫地平
- C: 硝苯地平
- D: 氨氯地平

**答案：A**

45. 重症肌无力、癫痫患者避免使用的抗菌药是

- A: 米诺环素
- B: 左氧氟沙星
- C: 甲硝唑
- D: 哌拉西林

**答案：B**

46. 孟鲁司特的作用机制是

- A: 阻断 M 受体
- B: 阻断  $\alpha$  受体
- C: 抑制磷酸二酯酶
- D: 阻断白三烯受体

**答案：D**

47. 助消化药不包括

- A: 胰酶
- B: 多潘立酮
- C: 乳酸菌素
- D: 乳酶生

**答案：B**

48.  $\beta$ -内酰胺类抗生素的主作用靶位是()

- A: 二氢叶酸合成酶
- B: 细菌细胞膜上特殊蛋白 PBP<sub>s</sub>
- C: DNA 螺旋酶
- D: 细菌核糖体 50S 亚基

**答案：B**

49. 氟尿嘧啶可用于治疗()。

- A: 晚期前列腺癌
- B: 急性淋巴细胞白血病
- C: 晚期睾丸肿瘤
- D: 绒毛膜上皮癌

**答案：D**

50. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 卡莫氟
- C: 来曲唑
- D: 羟喜树碱

**答案：A**

51. 葡醛内酯属于

- A: 促胃肠动力药
- B: 抑酸剂
- C: 肝胆疾病辅助用药
- D: 胃黏膜保护剂

**答案：C**

52. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

- A: 阿昔洛韦
- B: 庆大霉素
- C: 咪康唑
- D: 红霉素

**答案：C**

53. 高浓度使细胞膜的渗透性增加，钾离子和其他内容物漏出，细胞死亡的是

- A: 制霉菌素
- B: 特比萘芬
- C: 阿莫罗芬
- D: 环吡酮胺

**答案：D**

54. 治疗钩虫病宜选用

- A: 氯喹
- B: 甲苯咪唑
- C: 甲硝唑
- D: 吡喹酮

**答案：B**

55. 有性激素样副作用的是()

- A: 呋塞米
- B: 螺内酯
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

**答案：B**

56. 痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

- A: 非布司他
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 碳酸氢钠

**答案：A**

57. 属于孕激素类的是

- A: 甲地孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 己烯雌酚
- D: 睾酮

**答案：A**

58. 易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的  
是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 氟曲南
- D: 阿奇霉素

**答案：B**

59. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

- A: 革兰阴性菌
- B: 结核杆菌
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 厌氧菌

**答案：D**

60. (2020 年真题) 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 长春新碱
- B: 环磷酰胺
- C: 甲氨蝶呤

D: 曲妥珠单抗

**答案: A**

61. 司来吉兰用于

A: 早期帕金森病

B: 慢性脑功能不全

C: 神经源性尿崩症

D: 特发性震颤

**答案: A**

62. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

A: 灰婴综合征

B: 二重感染

C: 不可逆的再生障碍性贫血

D: 可逆的各类血细胞减少

**答案: C**

63. 苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

A: 10  $\mu\text{g}/\text{ml}$

B: 25  $\mu\text{g}/\text{ml}$

C: 15  $\mu\text{g}/\text{ml}$

D: 20  $\mu\text{g}/\text{ml}$

**答案: D**

64. 对凝血各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是( )。

A: 磺达肝葵钠

B: 阿哌沙班

- C: 水蛭素
- D: 依诺肝素

**答案: D**

65. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

- A: 大剂量抑制卵巢排卵
- B: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备
- C: 促进女性性器官的发育成熟
- D: 抑制子宫平滑肌的收缩

**答案: C**

66. 咪唑类药物的抗真菌作用机制是()

- A: 影响二氢叶酸合成
- B: 竞争性抑制鸟嘌呤进入 DNA 分子中，阻断核酸合成
- C: 抑制以 DNA 为模板的 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 合成
- D: 影响真菌细胞膜通透性

**答案: D**

67. 属于润滑性泻药的是

- A: 欧车前
- B: 多库酯钠
- C: 利那洛肽
- D: 番泻叶

**答案: B**

68. 主要降三酰甘油的药物的是

- A: 硝酸甘油
- B: 阿昔莫司

C: 普萘洛尔

D: 胍乙啶

**答案: B**

69. 有关阿托品的叙述，错误的是

A: 婴幼儿对其毒性不敏感

B: 存在潜在性青光眼时，使用阿托品有诱发危险

C: 妊娠期静脉滴注阿托品可使胎儿心动过速

D: 与促胃肠动力药合用时应有间隔时间

**答案: A**

70. 易产生耐药性，极少单独用药，临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是

A: 特比萘芬

B: 氟康唑

C: 卡泊芬净

D: 氟胞嘧啶

**答案: D**

71. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是()

A: 香豆素类

B: 非格司亭

C: 氨甲环酸

D: 维生素 K

**答案: A**

72. 伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

A: 乙酰唑胺

- B: 氨苯蝶啶
- C: 阿米洛利
- D: 氢氯噻嗪

**答案：D**

73. 抗生素类抗真菌药()

- A: 氟康唑
- B: 阿莫罗芬
- C: 两性霉素
- D: 特比萘芬

**答案：C**

74. (2016 年真题) 属于长效  $\beta_2$  受体激动剂的平喘

- A: 沙美特罗
- B: 沙丁胺醇
- C: 布地奈德
- D: 多索茶碱

**答案：A**

75. 黄体酮治疗先兆流产，必须肌内注射给药的主要理由是()

- A: 肌内注射吸收迅速
- B: 口服后在消化道和肝内被迅速破坏
- C: 口服吸收缓慢
- D: 口服用药排泄快

**答案：B**

76. 通过抑制血管紧张素转化酶产生作用，长期应用有可能导致血钾升高的降压药是

- A: 卡托普利
- B: 哌唑嗪
- C: 维拉帕米
- D: 硝酸甘油

**答案：A**

77. 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮
- B: 能降低血清前列腺特异性抗原（PS）水平
- C: 易引起直立性低血压
- D: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发

**答案：C**

78. 为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道 pH 没有影响的是

- A: 酚酞
- B: 开塞露
- C: 乳果糖
- D: 聚乙二醇 4000

**答案：D**

79. 在体内不经细胞色素 P450 酶代谢的药物是()

- A: 氟伐他汀
- B: 阿托伐他汀
- C: 普伐他汀
- D: 瑞舒伐他汀

**答案：C**

80. 可以减轻环磷酰胺导致的膀胱毒性的药物是()。

- A: 美司钠
- B: 右雷佐生
- C: 二巯基丙醇
- D: 亚叶酸钙

**答案：A**

81. 患儿，女，8岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成
- B: 干扰 DNA 的合成
- C: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成
- D: 干扰细菌细胞壁合成

**答案：D**

82. 乳果糖禁用于

- A: 急腹症
- B: 哺乳期
- C: 肝性脑病
- D: 妊娠期

**答案：A**

83. 下述属于  $\beta$  受体阻断剂禁忌证的是

- A: 不适用于先天性青光眼患者
- B: 心动过缓、房室传导阻滞患者禁用
- C: 虹膜睫状体炎患者禁用
- D: 甲状腺功能亢进患者禁用

**答案：B**

84. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

- A: 甲状腺素
- B: 依替膦酸二钠
- C: 胰岛素
- D: 糖皮质激素

**答案：C**

85. 有癫痫或精神病史的患者应慎用哪种药

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

**答案：C**

86. 人体主要的热能来源之一，被用来补充热量是

- A: 维生素
- B: 氨基酸
- C: 果糖
- D: 葡萄糖

**答案：D**

87. 属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是()

- A: 维拉帕米
- B: 胺碘酮
- C: 普鲁卡因胺
- D: 利多卡因

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/026003140101011030>