2024海南省保亭黎族苗族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题带答案（模拟题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.能监测用药过程中错误的真实发生率的方法是

A：病历审查

B：计算机检测方法

C：岗位工作问责

D：直接观察

答案：D

2.患者，女，48岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是

A：甲氧氯普胺片

B：乳酶生片

C：多潘立酮片

D：干酵母片

答案：B

3.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20／5mgqd

A：白色，右上角应有标注

B: 淡绿色

C: 淡红色

D: 淡黄色

答案：A

4.患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片10mgpoqd；美托洛尔缓释片47.5mgpoqd；贝那普利片20mgpoqd；阿司匹林肠溶片100mgpoqd；辛伐他汀片40mgpoqd。

A: 华法林片

B: 氯吡格雷片

C: 对乙酰氨基酚片

D: 双嘧达莫片

答案：B

5.甲状腺功能亢进合并哮喘的患者慎用的药物是()

A: 异丙托溴铵

B: 奥马珠单抗(抗lgE抗体)

C: 茶碱

D: 沙美特罗

答案：C

6.误服汞产生的急性汞中毒，最先表现的症状是

A: 头痛、头晕

B: 神经衰弱

C: 口腔炎、胃肠炎

D: 兴奋

答案：C

7.用淡红色处方纸书写的是

A：急诊处方

B：第一类精神药品处方

C：第二类精神药品处方

D：普通处方

答案：B

8.解救中毒的肾衰竭者（）

A：不能催吐

B：不能导泻

C：不能用强利尿剂

D：禁止洗胃

答案：C

9.属于B级高危药品的是

A：50%葡萄糖注射液

B：血液透析液

C：全胃肠外营养液

D：5%葡萄糖注射液

答案：C

10.肝素使用过量造成出血，特效的解救药是

A：鱼精蛋白

B：阿司匹林

C：维生素C

D：白蛋白

答案：A

11.每四小时用药一次的外文规范缩写是

A：tid

B：qod

C：qn

D：q4h

答案：D

12.以下所列药物中，有腹泻的2岁以下儿童不宜使用的是

A：盐酸小檗碱

B：洛哌丁胺

C：双歧三联活菌制剂

D：鞣酸蛋白

答案：B

13.现代药物临床治疗更多依赖于循证医学的支持，在循证医学证据分级中，证据和推荐强度的级别最高的是()

A：同质随机对照试验的系统评价

B：大样本病案系列

C：单个大样本随机对照试验

D：同质病例对照试验的系统评价

答案：A

14.如应用利福平、异烟肼时检查肝功能，用氨基糖苷类检查听力、肾功能等，是遵照

A：注意ADR症状，尤其是迟发反应

B：了解患者及家族的过敏史

C：注意特殊人群用药

D：注意定期监测器官功能

答案：D

15.适合睡前服用的是

A：吲哚美辛

B：多潘立酮

C：氟伐他汀

D：奥利司他

答案：C

16.干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

A：青霉素

B：链霉素

C：四环素

D：磺胺嘧啶

答案：A

17.解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A：1%硫酸铜

B：1%氯化钠

C：1%硫酸镁

D：3%过氧化氢

答案：C

18.麻醉药品处方印刷用纸的颜色是

A：淡黄色

B：淡红色

C：淡绿色

D：淡橙色

答案：B

19.（2019年真题）患者，女，72岁，有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频，尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数＞105cfu/ml，诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

A: 复方磺胺甲噁唑片

B: 莫西沙星片

C: 阿奇霉素片

D: 阿莫西林胶囊

答案：B

20.阻塞性黄疸可呈现

A: 鲜血便

B: 白陶土便

C: 柏油黑便

D: 乳凝块便

答案：B

21.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37．8℃，心率130次／分，血压80／40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 稳定型心绞痛

B: 冠状动脉粥样硬化型心脏病

C: 无症状型心肌缺血型

D: 非ST段抬高型心肌梗死

答案：D

22.重量比重量百分浓度系指100g溶液中所含溶质的克数，以符号

A: %(g/ml)表示

B: %(g/g)表示

C: %(ml/g)表示

D: %(ml/ml)表示

答案：B

23.重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

A: 静脉滴注

B: 喷雾给药

C: 腔道给药

D: 吸入给药

答案：C

24.治疗缺铁性贫血的首选药物是

A: 维生素C

B: 硫酸亚铁

C: 维生素B12

D: 叶酸

答案：B

25.鲜血便主要见于（）

A: 下消化道出血

B: 慢性菌痢

C: 小肠炎症

D: 霍乱

答案：A

26.抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

A: 头孢哌酮

B: 克拉维酸

C: 氨曲南

D: 亚胺培南

答案：D

27.可引起驾驶员嗜睡的药物是

A: 抗过敏药

B: 双嘧达莫

C: 东莨菪碱

D: 阿米洛利

答案：A

28.(肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

A: 1/7～1/5

B: 3/5～3/4

C: 1/5～1/2

D: 1/10～1/5

答案：C

29.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 甘精胰岛素睡前30min,皮下注射,qd

B: 门冬胰岛素餐前30~60min,皮下注射,tid

C: 低精蛋白锌胰岛素餐前30min,皮下注射

D: 普通胰岛素餐前30min,皮下注射,qd

答案：A

30.(妊娠的危险性分级)在动物生殖试验中并未显示对胎儿的危险，但无孕妇的对照组；或对动物生殖试验显示有副作用(较不育为轻)，但在早孕妇女的对照组中并不能肯定其不良反应(并在中、晚期妊娠亦无危险的证据)

A: C级

B: A级

C: B级

D: D级

答案：C

31.洗胃液1:5000高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

A: 3911中毒

B: 巴比妥类中毒

C: 乐果中毒

D: 1605中毒

答案：B

32.应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起

A: 尿沉渣白细胞

B: 尿沉渣管型

C: 尿沉渣尿酸盐

D: 尿沉渣结晶

答案：B

33.Ⅰ类手术切口应用第三代头孢菌素

A: 过度治疗用药

B: 盲目联合用药

C: 超适应证用药

D: 无适应证用药

答案：D

34.茶碱类支气管平滑肌松弛剂治疗慢阻肺疾病的主要不良反应是

A: 尿频

B: 水肿

C: 失眠

D: 口渴

答案：C

35.患者，男，46岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 其神经毒性与剂量大小无关

B: 与氯化钠存在配伍禁忌

C: 遇冷可加重其神经毒性

D: 在葡萄糖溶液中稳定

答案：A

36.低致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用止吐治疗方案是

A: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松瑞和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

C：化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

D：化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

答案：C

37.毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A：导泻与洗肠

B：静脉补液

C：催吐、洗胃

D：吸氧

答案：C

38.患者，男，18岁，因鼻塞症状就诊，医生处方1%盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是()

A：滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液

B：萎缩性鼻炎患者可增加给药次数

C：滴鼻后，要静卧3～5分钟

D：用药前要将鼻腔分泌物清理干净

答案：B

39.有关依从性的说法错误的是

A：药师加强对患者的用药指导可提高其依从性

B：采用缓释或控释制剂给药有利于提高患者的依从性

C：依从性仅限于药物治疗

D：患者如缺乏依从性可能会干扰临床试验结果

答案：C

40.属于润滑性泻药的是

A：番泻叶

B：硫酸镁

C：开塞露

D：乳果糖

答案：C

41.肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

A：二甲双胍

B：奥利司他

C：别嘌醇

D：替米沙坦

答案：A

42.糖尿病合并肾病者宜首选的药物是

A：阿卡波糖

B：二甲双胍

C：格列喹酮

D：罗格列酮

答案：C

43.（2015年真题）消化不良患者宜选用（）。

A：干酵母

B：小檗碱

C：阿苯达唑

D: 乳果糖

答案：A

44.影响维生素B12吸收的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 苯妥英钠

C: 二甲双胍

D: 苯巴比妥

答案：C

45.接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

A: 乙型肝炎病毒e抗原

B: 乙型肝炎病毒表面抗体

C: 乙型肝炎病毒表面抗原

D: 乙型肝炎病毒e抗体

答案：B

46.（2016年真题）患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo，瑞格列奈片1mgtidpo，阿托伐他汀钙片20mgqdpo等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

B: 停用二甲双胍肠溶片

C: 停用瑞格列奈片

D: 停用阿托伐他汀钙片

答案：D

47.增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

A: 头孢哌酮

B: 利巴韦林

C: 加替沙星

D: 拉氧头孢

答案：C

48.口服避孕药所致的心肌梗死，在吸烟妇女中发生的危险性加大，说明药源性疾病的患者因素是

A: 药物的使用

B: 生理因素

C: 不良生活方式

D: 药物制剂因素

答案：C

49.患者，女，44岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇片4mgtid治疗，没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋、话不成句，被紧急送往医院。

A: 沙丁胺醇片

B: 沙美特罗-氟替卡松干粉吸入剂

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 福莫特罗干粉吸入剂

答案：B

50.饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童可适当选服

A: 复合营养素

B: 复合维生素

C: 钙剂

D: 中草药制剂

答案：B

51.过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用()

A: 七叶洋地黄双苷滴眼液

B: 玻璃酸钠滴眼液

C: 氧氟沙星滴眼液

D: 色甘酸钠滴眼液

答案：D

52.心力衰竭的风湿性心脏病禁用

A: β 受体阻断剂

B: RAAS 抑制剂

C: 强心苷

D: 利尿剂

答案：C

53.抗结核化学药物治疗的主要适应证为

A: 肺结核病灶硬结已久

B: 痰菌阴性，无明显结核毒性症状

C: 病灶部分硬结，痰菌阴性

D: 有活动性肺结核痛灶

答案：D

54.患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

A: 氟西汀

B: 卡马西平

C: 多奈哌齐

D: 左旋多巴

答案：D

55.心力衰竭抗高血压药物的禁忌证

A: 维拉帕米

B: 美托洛尔

C: 依那普利

D: 氢氯噻嗪

答案：A

56.以下所列项目中，处理误服毒物不久、神志尚清醒的中毒患者的首要措施是

A: 导泻与洗肠

B: 静脉补液

C: 催吐、洗胃

D: 给氧气吸入

答案：C

57.外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

A: 庆大霉素

B: 林可霉素

C: 甲硝唑

D: 制霉菌素

答案：D

58.细菌感染性腹泻患者宜选用

A: 干酵母

B: 乳果糖

C：阿苯达唑

D：小檗碱

答案：D

59.适用于年轻、震颤突出的患者

A：苯海索

B：司来吉兰

C：左旋多巴

D：恩托卡朋

答案：A

60.关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

A：达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是IIa因子)

B：可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

C：需监测INR

D：与食物和药物相互作用小

答案：C

61.患者，女，33岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

A：细菌性阴道病

B：外阴阴道假丝酵母菌病

C：急性尿道炎

D：输卵管炎

答案：A

62.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC15×10

A：选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

B：抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

C：如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

D：首选针对革兰阳性菌的药物

答案：D

63.血尿酸升高的相关疾病是

A：痛风

B：过敏性鼻炎

C：湿疹

D：流感

答案：A

64.患者，男，59岁，因多尿，下肢浮肿就诊。体征和实验室检查：BMI28.3kg／m2，餐前血糖7.8mmol／L，餐后血糖13.6mmol／L，糖化血红蛋白7.9%，血清C肽0.2μg／L，三酰甘油2.8mmol／L。建议服用

A：吡格列酮

B：格列吡嗪

C：格列本脲

D：二甲双胍

答案：D

65.患者,男,62岁,临床使用青蒿素和乙胺嘧啶联合治疗疟疾,产生的药物相互作用属于()

A：增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

B：拮抗作用,药品不良反应增加

C：降低抗药性,疗效增加

D: 敏感化作用,药品不良反应增加

答案：C

66.（2015年真题）处方中“餐后给药”的外文缩写是（）。

A: qn

B: pc

C: po

D: Ac

答案：B

67.临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢性病终末期患者的一项特殊疗护项目

A: 12

B: 10

C: 6

D: 5

答案：C

68.血红蛋白(HGB)正常参考区间是

A: 170～200g/L

B: (4.0～10.0)×10

C: (15.0～20.0)×

D: 180～220g/L

答案：A

69.患者，女，52岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续1小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉28mm／1h，指尖关节的X线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

A: 白介素一6拮抗剂

B: 依那西普

C: 关洛昔康

D: 泼尼松

答案：D

70.在人体血液白细胞群体中，中性粒细胞的正常参考范围是

A: 0.01～0.05

B: 0.20～0.40

C: 0.50～0.70

D: 0.03～0.08

答案：C

71.用于解救对乙酰氨基酚中毒的特殊解毒剂是

A: 亚甲蓝

B: 纳洛酮

C: 乙酰半胱氨酸

D: 氟马西尼

答案：C

72.药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

A: 培高利特

B: 替加色罗

C: 钆贝葡胺

D: 塞来昔布

答案：A

73.旅行者轻中度腹泻宜选用

A：洛哌丁胺

B：双歧三联活菌制剂

C：山莨菪碱

D：胰酶

答案：A

74.服用药物对粪外观的影响,水杨酸钠

A：变红或黑色

B：红至黑色

C：橘红至红色

D：黄色

答案：B

75.糖尿病患者尿常规检查可发现

A：尿葡萄糖阳性

B：尿淀粉酶增高

C：尿血红蛋白阳性

D：尿胆红素阳性

答案：A

76.（2017年真题）患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L（正常值:3.9～6.1mmol/L）,餐后血糖148mmo/L（正常值:<7.8mmol/L），血尿酸580μmol/L（正常值:男性180～440μmol/L）,LDL-c3.7mmo/L（正常值:2.1~3.1mmo/L）肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A：应用阿司匹林

B：适量运动

C：低嘌呤饮食

D：控制体重

答案：A

77.（2016年真题）因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是（）。

A：甲状腺切除后的患者

B：合并高胆固醇血症的患者

C：合并轻度高血压的患者

D：6个月内有静脉血栓栓塞史的患者

答案：D

78.（2021年真题）两性霉素B用0．9%氯化钠注射液溶解，可导致（）

A：溶液变色

B：产生胶状不溶物

C：微浑浊或沉淀

D：产生气体

答案：C

79.重度癌性疼痛宜选用的药物是

A：阿司匹林

B：吗啡

C：多奈哌齐

D：可待因

答案：B

80.毒物引起严重腹泻者

A：不能用强利尿剂

B：禁止洗胃

C：不能导泻

D：不能催吐

答案：C

81.（2021年真题）静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

A：美罗培南

B：克拉霉素

C：万古霉素

D：头孢哌酮

答案：C

82.药物相互作用使毒性增加的事例是

A：阿托品联用吗啡

B：阿托品联用普萘洛尔

C：山莨菪碱联用哌替啶

D：铁剂联用维生素

答案：C

83.阿莫西林片的适宜服药时间是

A：餐后

B：餐前

C：清晨

D：餐中

答案：B

84.痔疮的主要表现是

A：坠胀感

B：疼痛

C：瘙痒

D：便后鲜血

答案：D

85.药物治疗结核病的原则应用两种以上抗结核药物以增强及确保疗效

A：规律

B：联合

C：早期

D：适量

答案：B

86.以下ADR因果关系评定为"肯定"的依据中，不正确的是

A：原患多种疾病混杂因素可能干扰

B：停药后反应停止

C：有文献资料佐证

D：用药及反应发生时间顺序合理

答案：A

87.“治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者可分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度”是针对

A：半衰期小于30分钟的药品

B：半衰期大于30小时的药品

C：半衰期8～24小时的药品

D：半衰期大于24小时的药品

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/026144032054011030