

2021 年主管护师考试试题精选及答案

姓名

分数

一、 单选题(每题 1 分,共 100 分)

1、 电极复律前正确的准备措施是

A . 停药洋地黄 1-3 天

B . 禁食 2h , 排空大、小便

C.褥垫保证松软无硬物

D . 暂时拔除吸氧导管

E . 忌用镇静剂

答案 : C

2、 肾盂肾炎感染方式是

A . 经性接触

B . 经饮水

C.经伤口

D.血行

E.逆行

答案：E

3、急性白血病与急性再障最简单的区别是

A.红细胞减少

B.血小板减少

C.血中有原始及早幼粒细胞

D.网织红细胞减少

E.发热

答案：C

4、治疗流行性乙型脑炎脑疝型呼吸衰竭的主要措施是：

A.降温

B . 肾上腺皮质激素

C . 呼吸兴奋剂

D . 脱水剂

E . 镇静剂

答案 : D

5、心肌梗死的特征性心电图改变为

A . T 波倒置 , s—T 段抬高 , 深而宽的异常 Q 波

B . P 波 $>0.25\text{mV}$

C.电轴 $<-30^\circ\text{C}$

D . Q—T 间期 $>0.40\text{s}$

E . $\text{SV}_1+\text{RV}_5>4.0\text{mV}$

答案 : A

6、慢性支气管炎最重要的病因是

A . 过敏 .

B . 感染

C . 大气污染

D . 寒冷气候

E . 呼吸道防御功能低下

答案 : B

7、红细胞平均体积英文简称

A . MCV

B . MCHC

C.MCH

D . MVC

E . MAH

答案 : A

8、降低麻疹发病率的关键措施是：

- A . 早发现、早治疗、早隔离
- B . 易感儿及时接种麻疹疫苗
- C . 接触后注射麻疹免疫球蛋白
- D . 患儿停留过舱病室通风 3 小时
- E . 流行期间易感者不到人群密集场所

答案：B

9、二尖瓣狭窄早期大咳血的原因是：

- A . 支气管部膜微血管破裂
- B . 肺水肿
- C . 支气管静脉破裂
- D . 合并肺炎
- E . 肺栓塞

答案：A

10、下列有关急性胰腺炎的叙述正确的是

A . 男性多于女性

B . 可用度冷丁止痛

C . 间断性腹痛

D . 严重性与淀粉酶的升高程度成正比

E . 可用吗啡痛

答案：B

11、护理脑出血病人时，动作轻柔的目的是

A . 病人舒适

B . 预防压疮

C . 减少情绪波动

D . 防止损伤皮肤黏膜

E . 避免加重脑出血

答案：E

12、甲亢危象的治疗，哪项是错误的：

A.口服复方碘或静点碘化钠，停用抗甲状腺药

B . 利血平或心得安

C . 纠正水电解质失衡，物理降温

D . 地塞米松静点

E . 防治感染

答案：A

13、菌痢腹泻的特点不包括

A . 每日可达 10-20 次

B . 每次量少

C . 伴有明显里急后重

D . 黏液脓血便

E . 有腥臭味

答案 : E

14、成年男性贫血是指外周血中血红蛋白

A . <100g / L

B . <110g / L

C.<120g / L

D . <130g / L

E . <140g / L

答案 : C

15、肾脏病引起的多尿早期的表现是

A . 全天多尿

B . 上午多尿

C.下午多尿

D. 夜间多尿

E. 睡前多尿

答案：E

16、支气管哮喘主要临床表现为

A. 反复发作带哮鸣音的吸气性呼吸困难

B. 反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难

C. 反复发作带哮鸣音的混合性呼吸困难

D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰与呼吸困难

E. 突然发作的持续性呼吸困难

答案：B

17、关于 2 型糖尿病的描述，下列哪项是错误的

A. 起病较慢

B . 多伴肥胖

C.酮症少见

D . 症状较轻

E . 血浆胰岛素正常

答案：B

18、张先生，40岁，患“慢性粒细胞白血病(慢粒)”3年，近日来出现原因不明的高热，胸骨疼痛难忍，脾迅速增大。此情况需考虑

A . 类白血病反应

B . 脾功能亢进

C . 急性白血病

D . 慢粒急性变

E . 白血病细胞浸润

答案：D

19、酮症酸中毒的护理注意事项中，下列哪项不妥：

- A . 昏迷时设专人护理
- B . 绝对卧床休息
- C . 及时留取标本送验
- D . 快速推注碳酸氢钠
- E . 一般先补充生理盐水

答案：D

20、胃溃疡发病的最主要因素是：

- A . 胃酸分泌增高
- B . 胃黏膜屏障减弱。
- C . 遗传因素
- D . 免疫因素
- E . 饮食不节

答案：B

21、溃疡并发幽门梗阻时的护理措施是。

- A . 流质饮食
- B . 每餐前洗胃
- C . 减少补液
- D . 忌胃肠减压
- E . 记出入液量 .

答案：E

22、慢性肾小球肾炎护理措施不包括

- A . 消除疑虑，配合治疗
- B . 减轻水肿，维持体液平衡
- C . 让病人了解有关防治知识
- D . 合理膳食，保证足够营养
- E . 多饮水，保持尿量在 2500ml

答案：E

23、关于室性期前收缩的心电图表现,错误的一项是 A .有提前出现的宽大畸形的 QRS 波

B . T 波方向与 QRS 波主波方向相反

C . QRS 波群前、后可出现逆行的 P 波

D . 代偿间歇完全

E . 室性融合波

答案：C

24、诊断系统性红斑狼疮最有意义的实验室检查是

A . 抗 Sm 抗体、抗 RNA 抗体、抗 ds—DNA 抗体、血清补体

B . 血沉、抗“O”、抗体、血清补体、谷丙酶

C . 皮肤狼疮带试验、血清补体、血沉、抗“O”

D . 血象、找狼疮细胞、抗 Sm 抗体、肌酸磷酸激酶

E . 血沉、抗“O”、血象、找狼疮细胞、肌酸磷酸激酶

答案：A

25、慢性肾炎的饮食应选择

A . 低优质蛋白、低磷饮食

B . 低优质蛋白、低钙饮食

C . 高优质蛋白、低钠饮食

D . 高优质蛋白、高糖饮食

E . 高优质蛋白、高磷饮食

答案：A

26、肾盂肾炎一般不出现

A . 脓尿

B . 血尿

C . 菌尿

D . 管型尿

E . 大量蛋白尿

答案：E

27、甲亢性心脏病心律失常最常见的是：

A . 房性期前收缩

B . 室性期前收缩

C . 交界性期间收缩

D . 阵发性房颤

E . 房室传导阻滞

答案：D

28、28 岁男性高度近视患者，自诉突然感到心悸，听诊心率 200 次 / min，心律匀齐，强弱均等，血压尚正常.您考虑患者最可能发生的是

A . 窦性心动过速

B . 室上性心动过速

C.室性心动过速

D . 房颤

E . 室颤

答案 : B

29、心力衰竭的基本病因

A . 心脏负担过重

B . 长期素食

C.长期饮食

D . 长期咳嗽

E . 长期高血糖

答案 : A

30、流行性脑脊髓膜炎的常见皮疹为 :

A . 瘀点、瘀斑

B . 单纯疱疹

C . 脓疱疹

D . 斑丘疹

E . 以上都不是

答案：A

31、高血压病分期标准，最主要的依据是：

A . 病程长短

B . 血压增高程度

C . 症状轻重

D . 心、脑、肾损伤及功能代偿情况

E . 血压能否降至正常

答案：B

32、尿毒症病人必有的；临床表现为：

A . 皮肤尿素霜沉着

B . 嘴内尿味或金属味

C . 纤维素性胸膜炎

D . 纤维素性心包炎

E . 贫血

答案 : E

33、慢性胃体炎的病因是

A . 烟酒嗜好

B . 幽门螺杆菌感染

C . 自身免疫反应

D . 急性应激

E . 胆汁反流

答案 : C

34、慢性再障病人目前最常用的治疗是

A . 成分输血

B . 输血

C.雄激素

D . 抗生素

E . 支持疗法

答案 : C

35、下列症状与体征哪项与甲型病毒性肝炎不相关

A . 起病发热 , 乏力、厌食、巩膜黄染

B . 乏力、厌食、恶心、尿色加深

C . 腹胀、肝质地硬、脾大

D . 皮肤黄染、轻度搔痒

E . 腹软、肝大质软、轻度叩击痛

答案 : C

36、按贫血的发病机理下列哪项组合是错误的

A.红细胞破坏过多—慢性感染性贫血

B.红细胞生成减少—再生障碍性贫血

C.红细胞慢性丢失过多—缺铁性贫血

D.输血血型不合—免疫性溶血性贫血

E.造血原料缺乏—巨幼细胞性贫血

答案：A

37、典型急性菌痢病人的粪便呈

A．米泔水样便

B．柏油样黑便

C．少量黏液脓血便

D．果酱样腥臭便

E．灰陶土样便

答案：C

38、系统性红斑狼疮常见皮损是

A . 紫癜

B . 蝶形红斑

C.玫瑰疹

D . 荨麻疹

E . 水肿

答案：B

39、HBsAg (+), HBeAg (+), 说明此病人：

A . 无传染性

B . 具有免疫力

C . 病情比较稳定

D . 乙肝恢复期

E . 病毒复制强 , 有传染性

答案 : E

40、下列哪项符合高血压的治疗原则 :

A . 联合用药 , 达到降压目的后停药

B . 症状不重者 , 不宜用降压药

C . 联合用药 , 达到降压目的后短期服用维持量

D . 联合用药 , 达到降压目的后长期服用维持量

E . 间断用药 , 避免产生抗药性

答案 : D

41、某传染病在一个较小范围内短时间突然出现大批同类病例 , 称为 :

A . 流行

B . 大流行

C . 散发

D . 暴发

E . 以上都是

答案 : D

42、患哪种传染病后可获得一定免疫力，但不持久：

A . 白喉

B . 流行性脑脊髓膜炎

C . 猩红热

D . 百日咳

E . 流行性感冒

答案 : E

43、肝性脑病病人应当：

A . 供给足量的热能与蛋白质

B . 给予足量脂肪以提供热能

C . 供给足量的糖和钠盐

D . 每天给水不少于 2500ml

E . 给予足量的碳水化合物。

答案：E

44、休克型肺炎，患者宜采取何种体位

A . 平卧位

B . 半卧位

C.侧卧位

D . 头低足高位

E . 去枕平卧位或头略高、足高的特殊位

答案：E

45、青年女性患者于受凉淋雨后突发寒战、高热、胸痛、咳嗽、气急、咯铁锈色痰，体检左下肺有实变体征及湿罗音，治疗用药应首选

A . 安乃近

B . 地塞米松

C.青霉素

D . 棕色合剂

E . 氨茶碱

答案：C

46、慢性阻塞性肺病

A.慢支、肺气肿和哮喘

B.单纯性慢支或单纯哮喘

C.慢性阻塞性支气管炎合并阻塞性肺气肿

D.慢支、肺不张、支气管哮喘

E.以上都不是

答案：C

47、关于支气管扩张的叙述，下列哪项有误

- A . 多在中、老年期起病
- B . 主要表现为慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血及继发肺部感染
- C.病变部位可听到局限性持久存在的罗音
- D . x 线胸片可见蜂窝状或卷发样阴影
- E . 支气管碘油造影确诊

答案：A

48、流行性乙型脑炎的传播途径是

- A . 气溶胶
- B . 粪一口传播
- C . 密切接触
- D . 虫媒传播
- E . 血液传播

答案：D

49、肝硬化病人发生意识障碍可能是

A . 过度疲劳

B . 肝性脑病

C. 饮酒过多

D . 脑缺血

E . 酸中毒

答案：B

50、男，60岁，大便后突起右手无力，讲话不清，约1h后昏迷。体检：浅昏迷，瞳孔等大，血压 29.3 / 14 . 6kPa，右侧肢体瘫痪,肌张力低，腱反射未引出，右侧巴氏征阳性。最可能的诊断是

A . 高血压脑出血

B . 脑血栓形成

C . 脑栓塞

D . TIA

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026150112213010045>