

护士职业暴露与防护

护士职业暴露与防护

探讨的问题

- 护士的职业危害有哪几方面？
- 护士的职业防护现状怎样？
- 我们应该掌握哪些防护措施？

护士的职业危害

- 1. 生物性危害
- 2. 化学性危害
- 3. 物理性危害
- 4. 运动功能性危害
- 5. 心理社会性危害

护士的职业防护现状

- 一、职业防护知识缺乏
- 二、针刺伤情况严重
- 三、化学药物的防护不到位
- 四、心理社会问题

一、职业防护知识缺乏

- 职业防护教育未受到重视
- 医院和社会对防护知识的宣传和重视力度不够
- “不怕脏、不怕累”

二、针刺伤情况严重

- 1. 针刺伤发生率高。

中华医院感染学杂志. 实习护士发生医疗锐器伤的调查.

432 名实习护士10个月实习期间发生锐器损伤的占93.3%，平均6.4次/人，以针头和玻璃为主占80.33%，被污染物刺伤的占37.72%。

二、针刺伤情况严重

- 2. 针刺伤时的操作环节多发生在处理用后的针头上。

发生针刺伤不同环节的刺伤率分别为操作前占25.6%，操作中占20.0%，操作后占54.4%。

注射后针头处理：收废弃针、毁形浸泡、取下针头及重套针帽

二、针刺伤情况严重

- 3. 针刺伤后对伤口的处理不规范

6 %的人采取一般的消毒措施(碘酒+ 酒精)

,

能较规范处理的仅占4 %左右,有0. 33 %的护士未做任何处理

二、针刺伤情况严重

- 4. 刺伤后主动汇报率低

调查实习护生刺伤后尽管有54.4%的人感到害怕,但仅有2.3%的护生向带教老师汇报,不汇报的原因44.2%的人认为没必要,34.6%不知向谁汇报

三、化学药物的防护不到位

- 调查107家医院,化疗药物配置多以分散式管理为主,不设化疗配药中心,有竖式层流生物安全柜(BSC)设备的占17.7%
- 护士在操作中均戴口罩,穿防护服、戴目镜者极少,能正确使用乳胶手套和聚乙烯手套的仅9家占8.4%

四、心理社会问题

- 对西安市4所三级甲等教学医院的调查发现,临床护士有情绪疲溃感的占59.1%,无成就感者占53.2%

我们应该掌握哪些防护措施？

- 一、增强职业防护意识
- 二、防护屏障
- 三、严格医疗废物管理
- 四、预防职业暴露的措施
- 五、职业暴露后的处理原则
- 六、完善规章制度或管理办法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026152220203010132>