

2024 年福建省寿宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试真题题库及答案【历年真题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

A: 65ml/min

B: 47ml/min

C: 70ml/min

D: 55ml/min

答案：B

2. ADR 报告表内容填写不齐全、等待补充后再评价，或因果关系难以定论、缺乏文献资料佐证；ADR 因果关系可评价为

A: 可能

B: 很可能

C: 可能无关

D: 待评价

答案：D

3. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

A: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

B: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用

C: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用

D: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案：B

4. 铅中毒

A: 1%硫酸镁溶液

B: 1%氯化钠溶液

C: 5%碳酸氢钠溶液

D: 药用炭混悬液

答案：A

5. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液，分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

A: 889ml，111ml

B: 200ml，800ml

C: 500ml，500ml

D: 111ml，889ml

答案：D

6. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: 3-4 周

B: 4-6 周

C: 6-12 周

D: 2-3 周

答案：B

7. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者的预后大为改观，血液净化的方法不包括

- A: 血液透析
- B: 血液置换
- C: 血液滤过
- D: 腹膜透析

答案：B

8. 影响药品质量的环境因素不包括

- A: 人员设置
- B: 时间
- C: 日光
- D: 振荡

答案：A

9. 患者,男,80岁,因发热、咳嗽、咳痰2天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治疗。患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是()

- A: 甘草合剂
- B: 左氧氟沙星
- C: 氨溴索
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

10. 药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

- A: 印鉴卡
- B: 五专管理
- C: 防盗设施
- D: 基数卡

答案：A

11. 沙眼的病原体为

- A: 衣原体
- B: 支原体
- C: 细菌
- D: 病毒

答案：A

12. 中成药舒筋活络酒具有祛风除湿、活血通络、养阴生津的功效，与其合用可加强对中枢神经系统抑制作用的药物是

- A: 地高辛
- B: 氯苯那敏
- C: 复方利血平
- D: 甲氧氯普胺

答案：B

13. 第一类精神药品处方印刷用纸是

- A: 淡红色
- B: 淡黄色
- C: 淡橙色
- D: 淡绿色

答案：A

14. 延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 磷霉素联用其他抗菌药物
- B: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- C: 头孢哌酮 / 舒巴坦复方制剂
- D: 硫酸阿托品联用吗啡

答案：A

15. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 右旋糖酐铁
- B: 叶酸
- C: 富马酸亚铁
- D: 维生素 C

答案：B

16. 患者，男，40 岁，因饮酒 10 个小时后突然出现右足第一跖趾关节剧痛就诊。查体：患处肿胀、发红，不能穿鞋；触压患处疼痛加重。实验室检查显示血尿酸 $520 \mu mol / L$ 。诊断为痛风急性发作。

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 泼尼松
- D: 塞米昔布

答案：B

17. 痛风时尿沉渣结晶为（）

- A: 酪氨酸?
- B: 磷酸盐结晶?
- C: 草酸盐结晶?
- D: 尿酸盐结晶?

答案: D

18. 下列药物中，可引起黑便的药物为（）

- A: 铝碳酸镁
- B: 复方氢氧化铝
- C: 硫糖铝片
- D: 枸橼酸铋钾

答案: D

19. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 病理性骨折
- C: 下肢动脉栓塞
- D: 下肢深静脉血栓形成

答案: D

20. 低 HDL-C 血症，宜选用的药物是

- A: ω -3 脂肪酸
- B: 贝特类
- C: 他汀类
- D: 烟酸

答案: D

21. 有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中
- B: 丙氨酸氨基转移酶（ALT）与谷丙转氨酶（GPT）是两个反映肝脏功能的指标
- C: 血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比
- D: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类

答案：C

22. （2016 年真题）患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 每次调整 1-4 单位
- B: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- C: 每 3-5 天调整 1 次
- D: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

答案：B

23. 发热的程度按体温状况分级。"低热"者的体温是

- A: 37.4℃～38℃
- B: 37℃以上
- C: 41℃以上
- D: 38.1℃～39℃

答案：A

24. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: 烟酸类
- B: 贝特类
- C: ω -3 脂肪酸制剂

D: 他汀类

答案: D

25. 适用于肝性脑病及长期卧床的老年便秘患者的药物是

A: 硫酸镁

B: 甘油栓

C: 比沙可啶

D: 乳果糖

答案: D

26. 进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: III期临床试验

B: 临床预试验

C: II 期临床试验

D: I 期临床试验

答案: A

27. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

A: 餐前服用

B: 餐后服用

C: 清晨服用

D: 餐中服用

答案: B

28. 应用华法林抗凝治疗时，INR 安全有效范围为血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

- A: >3.0
- B: 2.0~2.5
- C: <2.0
- D: 2.0~3.0

答案：D

29. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 8.0×10

- A: 肌痛
- B: 乳酸酸中毒
- C: 心力衰竭
- D: 低血糖

答案：B

30. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 氢氯噻嗪和辛伐他汀
- B: 美托洛尔和赖诺普利
- C: 氢氯噻嗪和阿司匹林
- D: 美托洛尔和辛伐他汀

答案：C

31. 医生开具处方，必须使用药品的名称是

- A: 药品习用名
- B: 药品通用名

C: 药品化学名

D: 药品商标名

答案: B

32. 患者，男，67 岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续 1 个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

A: 加巴喷丁

B: 山莨菪碱

C: 吗啡

D: 布洛芬

答案: A

33. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛患者的首选处方药是

A: 苯噻啶

B: 卡马西平

C: 地西泮

D: 山莨菪碱

答案: B

34. 含铁量高，服用后起效快的药品是

A: 葡萄糖酸亚铁

B: 富马酸亚铁

C: 乳酸亚铁

D: 硫酸亚铁

答案: B

35. 下列复方药物中，可使高血压患者血压升高的是

A: 复方酚咖伪麻胶囊

B: 速克感冒胶囊

C: 速感宁胶囊

D: 银菊清解片

答案：A

36. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

A: 尽可能避免使用

B: 需增加给药剂量

C: 须谨慎使用，必要时减量给药

D: 一般无须调整剂量

答案：D

37. (2019 年真题) 患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 丙戊酸钠的不良反应

B: 糖尿病病情进展

C: 卡马西平的不良反应

D: 停用了苯妥英钠

答案：A

38. 下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

A: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒

B: 心、肝、肾及胃肠等主要器官的功能在不断下降

C: 与血浆蛋白的结合率增加，使游离型药物减少

D: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长

答案：C

39. 控制心室率的药物是

A: 美托洛尔

B: 氯吡格雷

C: 胺碘酮

D: 达比加群酯

答案：A

40. 口服避孕药可能导致

A: 血清总胆固醇升高

B: 血清碱性磷酸酶升高

C: 血白细胞减少

D: 血清血红蛋白升高

答案：A

41. 应用麻醉药利多卡因时宜

A: 不饮酒

B: 少食盐

C: 少食醋

D: 不吸烟

答案：D

42. 曲唑酮的作用机制为（）

A: 抑制单胺氧化酶

B: 抑制 NE 再摄取

C: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取

D: 抑制 5-HT 受体拮抗和再摄取

答案：D

43. 青霉素较难在乳汁中出现的机制是

A: 呈弱酸性

B: 在母体血浆中处于结合状态

C: 解离度大

D: 呈弱碱性

答案：A

44. 影响核酸合成的药物

A: 放线菌

B: 培美曲塞

C: 依托泊苷

D: 顺铂

答案：B

45. 主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

A: 双解磷

B: 亚硝酸钠

C: 谷胱甘肽

D: 盐酸烯丙吗啡

答案：D

46. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 膀胱炎

- B: 压力性尿失禁
- C: 急性肾盂肾炎
- D: 急迫性尿失禁

答案：C

47. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 A 级的是

- A: 美托洛尔
- B: 氯化钾
- C: 青霉素
- D: 环丙沙星

答案：B

48. (2016 年真题) 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是 ()。

- A: 按阶梯给药
- B: 提倡无创给药方式，尽量口服
- C: 应个体化用药
- D: 疼痛时用药，不痛时不需用药

答案：D

49. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 洛哌丁胺

B: 鞣酸蛋白

C: 小檗碱

D: 药用炭

答案：A

50. 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L(正常值:3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L(正常值:<7.8mmol/L)，血尿酸 580 μmol/L(正常值:男性 180~440 μmol/L)，血 LDL-C 3.7mmol/L(正常值:2.1~3.1mmol/L)肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 心律失常

B: ALT 升高

C: 低血糖

D: 腹胀

答案：D

51. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

A: 米氮平

B: 吗氯贝胺

C: 氟伏沙明

D: 氯米帕明

答案：C

52. 患者静脉滴注两性霉素 B 850mg，临床药师建议两性霉素 B 应该调节至适当的滴注速度。

A: 护士

B: 患者

C: 患者家属

D: 医生

答案：A

53. 药品质量缺陷，包括

A: 药品名称形似

B: 须冷藏药品

C: 药品名称音似

D: 片剂药品受潮裂片

答案：D

54. 用药错误 I 级（9 级）的标准

A: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

B: 差错导致患者永久性伤害

C: 差错导致患者死亡

D: 客观环境或条件可能引发差错

答案：C

55. 为解热或镇痛，有心功能不全史的患者应慎用布洛芬。因为用药后可能发生

A: 急性肾衰竭

B: 过敏反应

C: 重度肝损伤

D: 尿潴留和水肿

答案：D

56. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

- A: 尚不确定的信号
- B: 确认的信号
- C: 驳倒的信号
- D: 部分确认的信号

答案：C

57. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 支气管哮喘
- B: 急性左心衰竭
- C: 慢性支气管炎急性发作
- D: 肺动脉栓塞

答案：B

58. （2018 年真题）患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 阿司匹林泡腾片
- B: 左氧氟沙星片
- C: 氨溴索片
- D: 维生素 C 片

答案：A

59. 高 TC 血症首选

- A: 依折麦布

- B: 非诺贝特
- C: 氟伐他汀
- D: 阿昔莫司

答案: C

60. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次/分，R22 次/分，BP112 / 77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 抗肿瘤药物均采用静脉给药
- B: 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药
- C: 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量
- D: 每 21 天为 1 个疗程

答案: C

61. 不宜咀嚼或吞服，以免影响药物剂型设计目的是

- A: 胶囊剂
- B: 糖浆剂
- C: 粉剂
- D: 舌下片

答案: D

62. 在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞（DC）的正常比例范围是

- A: 0.20~0.40
- B: 0.01-0.05
- C: 0.03-0.08
- D: 0.50~0.70

答案：D

63. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 奥美拉唑
- B: 乳酶生
- C: 阿嗝米特肠溶片
- D: 多潘立酮片

答案：B

64. 开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

- A: 修订医嘱及时沟通
- B: 医嘱清楚准确
- C: 医嘱完整不漏项
- D: 实现个体化治疗

答案：D

65. 患者，女，27 岁，感染乙型肝炎病毒。实验室检测 HBeAg 阳性，HBVDNA30000IU / ml，ALT200U / L，血清总胆红素 50U / L。决定使用抗病毒药物治疗。有关抗乙肝病毒药物的用药注意事项，正确的是

- A: 普通干扰素 α 睡前皮下注射给药
- B: 替比夫定、阿德福韦和拉米夫定被推荐为临床治疗乙型肝炎的一线药物
- C: 聚乙二醇干扰素 α 每周给药 3 次或隔日给药 1 次
- D: 无禁忌证前提下，干扰素 α 是治疗乙肝的首选抗病毒药

答案：A

66. 禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括（）

- A: 三环类药物
- B: 苯二氮类药物
- C: 5-HT_{1A} 受体部分激动剂
- D: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

答案：B

67. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 间羟胺
- B: 阿托品
- C: 地西洋
- D: 有机硫类

答案：B

68. 患者，女，42 岁。左足背部出现严重冻疮，可考虑应用

- A: 樟脑软膏
- B: 肝素钠乳膏
- C: 紫云膏
- D: 赛庚啶

答案：B

69. 患者，男，18 岁，因鼻塞症状就诊，医生处方 1%盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是（）

- A: 滴鼻后，要静卧 3~5 分钟
- B: 萎缩性鼻炎患者可增加给药次数
- C: 用药前要将鼻腔分泌物清理干净
- D: 滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液

答案：B

70. (毒物及药物中毒解救)，二巯丙醇用于解救

- A: 氰化物中毒
- B: 水银中毒
- C: 吗啡中毒
- D: 有机磷中毒

答案：B

71. 患者，男，1岁，近期出现乏力、下肢步态不稳、行走困难、嗜睡。经临床检查，各项血细胞均偏低；血涂片中可见多数大卵圆形的红细胞，中性粒细胞分叶过多，可见5叶或6叶以上的分叶，偶可见巨大血小板。确诊为巨幼细胞贫血，应给予的治疗药物是

- A: 促红细胞生成素注射剂
- B: 硫酸亚铁片
- C: 叶酸片、维生素 B12 片
- D: 输入新鲜血浆

答案：C

72. (透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

- A: 乳果糖
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿法骨化醇
- D: 铁剂

答案：A

73. 可提示肝内或肝后胆管梗阻者的是

- A: 血清碱性磷酸酶升高
- B: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- C: A/G 值低于 1
- D: γ -谷氨酰转移酶升高

答案：D

74. (常用的特殊解毒剂的适应证)，丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

- A: 二巯丁二钠
- B: 纳洛酮
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 谷胱甘肽

答案：D

75. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 吸氧
- B: 静脉补液
- C: 导泻与洗肠
- D: 催吐、洗胃

答案：D

76. “每日 3 次”的外文缩写是

- A: hs
- B: tid
- C: NS

D: po

答案：B

77. 餐前 30min 服用的药物是

A: 阿托伐他汀

B: 奥美拉唑

C: 伊托必利

D: 复方氢氧化铝

答案：D

78. 下列药物中，解救氰化物中毒的特效药是

A: 维生素 C

B: 维生素 K

C: 亚甲蓝

D: 氟马西尼

答案：C

79. 适应证

A: 这种药能报销吗

B: 中午忘吃药了怎么办

C: 这次拿的“×××”（商品名）是我以前一直服用的“格列齐特”吗

D: 这药能治我这种病吗

答案：D

80. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是

A: 左氧氟沙星

B: 阿奇霉素

C: 头孢呋辛

D: 阿莫西林

答案: B

81. 服用华法林期间应进行监测的指标是()

A: APTT

B: RBC

C: INR

D: ALT

答案: C

82. 抗抑郁药物的合理使用既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

A: 氟伏沙明

B: 丙米嗪

C: 阿米替林

D: 帕罗西汀

答案: A

83. 患者,女,56岁,身高156m,体重61kg。空腹血糖78mmo/L,餐后血糖11.2mmol/,糖化血红蛋白6.7%。

A: 口服磺酰脲类降糖药

B: 饮食及运动治疗

C: 口服二甲双胍

D: 口服 α -糖苷酶抑制剂

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

84. 急性荨麻疹的治疗首选药物是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/026210211055011030>