

2024 年安徽省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题通关秘籍题库及答案（网校专用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 应急能力较差，较敏感，极易产生药品不良反应，是指

- A: 严格掌握适应证
- B: 严格掌握用药剂量
- C: 明确诊断
- D: 密切监护

答案：D

2. 可提示骨骼疾病的是

- A: γ -谷氨酰转移酶升高
- B: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- C: 血清碱性磷酸酶升高
- D: A/G 值低于 1

答案：C

3. 对流行性结膜炎可选用

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 杆菌肽眼膏
- C: 碘苷滴眼液
- D: 1%泼尼松龙滴眼液

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

4. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的兴奋剂是

- A: 普萘洛尔
- B: 麻黄碱
- C: 人生长激素
- D: 可卡因

答案：B

5. 急性肾盂肾炎常见

- A: 白细胞管型
- B: 蜡样管型
- C: 颗粒管型、透明管型
- D: 细胞管型

答案：A

6. 下列药物中，能解救香豆素类灭鼠药中毒的是

- A: 乙酰胺
- B: 维生素 B
- C: 阿托品
- D: 维生素 K

答案：D

7. 与对氨基苯甲酸（PAPB）化学结构相似，可与 PAPB 竞争二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 四环素
- C: 青霉素
- D: 链霉素

答案：A

8. (2017 年真题) 因可提高血液携氧量, 被长跑运动员用于提高成绩, 因而被列为兴奋剂管理的药物是 ()

- A: 甲睾酮
- B: 可卡因
- C: 哌替啶
- D: 人促红素

答案: D

9. 说明书中没有儿童用药剂量时, 可以根据儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法错误的是 ()

- A: Fried 公式, 婴儿药物剂量=月龄 \times 成人剂量/150
- B: 儿童剂量=成人剂量 \times 儿童体表面积(m²)/1.73(m²)
- C: 儿童剂量=成人剂量 \times 小儿体重(kg)/70
- D: 小儿药物剂量=(年龄 \times 成人剂量)/小儿体表面积(m²)

答案: D

10. 一般高血压患者服用降压药, 建议控制在

- A: <140 / 90mmHg
- B: <120 / 80mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <140 / 80mmHg

答案: A

11. 出现粪便显黑色, 粪隐血呈阳性症状时, 首先考虑的疾病是

- A: 阿米巴痢疾
- B: 痔疮, 肛裂
- C: 过敏性肠炎

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 胃、十二指肠溃疡伴出血

答案：D

12. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

A: 50mg

B: 100mg

C: 90mg

D: 75mg

答案：B

13. 患者,77 岁,因感冒发热咳嗽,自服酚麻美敏片、维 C 银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

A: 氯苯那敏

B: 银翘

C: 对乙酰氨基酚

D: 维生素

答案：A

14. 归属公共网络资源的是

A: www. googl

B: www. merck. com

C: www. cmt. tom. cn

D: www. ashp. org

答案：A

15. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 利福平
- C: 吡嗪酰胺
- D: 链霉素

答案：B

16. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列想患者交代的用药注意事项，错误的是：

- A: 不宜与铝剂同时服用
- B: 宜空腹服用
- C: 宜同时补充维生素 C
- D: 不宜同时进食牛奶和蛋类

答案：B

17. 属于核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 恩夫韦替
- C: 扎西他滨
- D: 沙奎那韦

答案：C

18. 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 双氯芬酸钠片
- B: 莫沙必利片
- C: 伊马替尼片
- D: 西咪替丁片

答案：B

19. 高度心脏传导阻滞抗高血压药物的禁忌证

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 氢氯噻嗪
- B: 依那普利
- C: 维拉帕米
- D: 美托洛尔

答案：D

20. 非选择性 β -受体阻断剂的禁忌证是

- A: 体位性低血压
- B: 高血钾
- C: 哮喘
- D: 充血性心力衰竭

答案：C

21. 患者，女，60岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度已 L1~L4 椎体 T 值-2.7SD，BMD749(mg/cm²)；股骨颈 T 值-2.2SD，BMD602(mg/cm²)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

- A: 甲状旁腺素
- B: 双膦酸盐
- C: 氟制剂
- D: 钙制剂

答案：B

22. 氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是（）

- A: 维生素 K1
- B: 青霉胺
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰胺

答案：D

23. 患者，女，63 岁，因“突发左上肢麻木，伴头晕 2 小时”入院，诊断为缺血性脑卒中，患者既往有高血压病史 20 年，可选用哪种药物进行溶栓治疗

- A: 巴曲酶
- B: 阿司匹林
- C: 阿替普酶
- D: 华法林

答案：C

24. 滴眼液或眼膏开瓶后保质期一般为

- A: 28~40 天
- B: 10~20 天
- C: 28~30 天
- D: 25~35 天

答案：C

25. 利血平+氢氯噻嗪

- A: 抑制乙醛脱氢酶
- B: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- C: 抑制氧化代谢反应
- D: 产生有利的药物相互作用

答案：D

26. 与患者进行沟通时沟通技巧不包括

- A: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度
- B: 尽量使用专业性术语

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多

D: 认真聆听，使用通俗易懂的语言

答案：B

27. 由护士双人核对监测

A: 患者执行医嘱差错

B: 药师调配处方差错

C: 医师处方差错

D: 护士执行医嘱差错

答案：D

28. 粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾

A: 米泔水样

B: 白陶土便

C: 柏油便，黑色有光泽

D: 暗红果酱色

答案：D

29. 严重肝病患者的尿液常见

A: 磷酸盐结晶

B: 尿酸盐结晶

C: 草酸盐结晶

D: 酪氨酸和亮氨酸结晶

答案：D

30. 成人末梢血白细胞的参考范围是

A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9$

B: $(4.0 \sim 5.5) \times 10^9$

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: $(3.5 \sim 10.0) * 10$

D: $(15.0 \sim 20.0) * 10$

答案：A

31. 乳汁中药物的浓度与下列哪种因素无关

A: 药物与母体血浆蛋白结合率

B: 药物剂型

C: 脂溶性

D: 母体中的药物浓度

答案：B

32. 低张力性便秘

A: 开塞露

B: 乳果糖

C: 羧甲基纤维素钠

D: 比沙可啶

答案：A

33. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A: 复方消化酶制剂送服时不宜用热水

B: 多潘立酮可能引起心脏相关风险

C: 助消化药与吸附剂合用须间隔 2~3h

D: 胰酶口服时应嚼碎服用

答案：D

34. 下列五种内服药品中，应在餐前服用的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 氨茶碱片
- C: 呋塞米片
- D: 吡罗昔康片

答案：A

35. 以下叙述中，处方审核结果可判定为“超常处方”的是

- A: 使用“遵医嘱”字句
- B: 无正当理由超说明书用药
- C: 字迹难以辨认
- D: 联合用药不适宜

答案：B

36. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

- A: 维生素 K1
- B: 亚硝酸钠
- C: 乙酰胺
- D: 碘解磷定

答案：A

37. 急性汞中毒出现

- A: 腐蚀性口腔炎
- B: 恶心、呕吐、口内有金属味
- C: 肌肉震颤、抽搐
- D: 恶心、呕吐、视力模糊

答案：A

38. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是由于“药物制剂因素”的是

- A: 胍乙啶使肾上腺素受体敏感性增强
- B: 排钾利尿药增加心脏对强心苷类的敏感性
- C: 输液中的颗粒物引起肺部异物性肉芽肿
- D: 乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的中枢神经抑制作用

答案：C

39. 蛋白酶抑制剂（）

- A: FIs
- B: NRTIs
- C: PIs
- D: NNRTIs

答案：C

40. 药物临床评价是指

- A: 新药上市以后对药品的理化性质、质量和价格的评估
- B: 对药品治疗效果、不良反应、用药方案、贮存稳定性及药品经济学的评估
- C: 对药物临床前研究的一切新药申报资料的真实性和科学性进行的评估
- D: 新药临床研究在未上市以前进行的利益与风险关系的评估

答案：B

41. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

- A: 应用特殊剂型者
- B: 肝肾功能不全者
- C: 药物治疗窗窄、需要做监测者

D: 需要重新选择药品或调整用药方案者

答案: B

42. 下述"药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的"中, 不正确的是

A: 减少急性加重的频次

B: 排痰化痰

C: 预防和控制症状

D: 减少急性加重的程度

答案: B

43. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

A: 50%葡萄糖注射液

B: 复方氯化钠注射液

C: 5%葡萄糖注射液

D: 0.9%氯化钠注射液

答案: D

44. 成本-效益分析

A: 成本和治疗结果均用货币表示

B: 药物利用指数(DUI)

C: 治疗结果采用临床指标表示, 如治愈率

D: 是成本-效果分析的一种特例

答案: A

45. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml, 现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合, 需要

A: 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml

B: 50%葡萄糖注射液 72ml 和 5%葡萄糖注射液 428ml

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 50%葡萄糖注射液 56ml 和 5%葡萄糖注射液 444ml

D: 50%葡萄糖注射液 85ml 和 5%葡萄糖注射液 415ml

答案: C

46. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式，正确的是

A: 直接吞咽

B: 餐后服用

C: 餐前服用，充分咀嚼后咽下

D: 宜多饮水，减轻刺激

答案: C

47. (2019 年真题) 处方中外文缩写 mcg 代表

A: 微克

B: 必要时

C: 餐后

D: 临睡时

答案: A

48. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法正确的是

A: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋

B: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

C: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

D: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

答案: A

49. 冠心病患者入不能耐受 ACEI，可考虑给予 ()

A: β 受体激动剂

B: α 受体拮抗剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 地高辛

D: AR

答案: D

50. 选择性单胺氧化酶 A 抑制剂

A: 氟伏沙明

B: 氯米帕明

C: 吗氯贝胺

D: 米氮平

答案: C

51. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 淡红色

B: 淡橙色

C: 淡黄色

D: 淡绿色

答案: C

52. 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是: B

A: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是 48 小时

B: 血小板计数 $<100 \times 10^9$

C: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

D: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

答案: B

53. 保钾利尿剂

- A: 阿米洛利
- B: 雷米普利
- C: 依普利酮
- D: 阿利吉仑

答案：A

54. (2020 年真题) 患者，女，65 岁，间断腹胀、纳差 6 年，因病情加重伴精神恍惚 3 天为主诉入院，实验室检查:ALT200U/L，AST320U/L，诊断为肝硬化失代偿期、肝性脑病。患者乙肝病史 20 年，间断服用中药（具体不详）治疗。糖尿病史 10 年，便秘多年，3~4 天排便一次。

- A: 维生素 B1
- B: 水溶性维生素
- C: 辅酶 A
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：D

55. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等
- B: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- C: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征
- D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

56. 不能用热水送服的药物是

- A: 胃黏膜保护剂
- B: 磺胺类药物
- C: 镇静催眠药
- D: 微生态制剂

答案：D

57. 下列用于解热镇痛的处方药是

- A: 安乃近
- B: 布洛芬
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案：A

58. 原发性蛛网膜下腔出血的最常见的病因是

- A: 颅内动脉瘤
- B: 脑血管畸形
- C: 动脉硬化
- D: 高血压

答案：A

59. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 抗菌药物
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 糖皮质激素

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

60. 下列药品中，与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

- A: 维生素 C
- B: 巴比妥
- C: 碳酸钙
- D: 地西洋

答案：D

61. 依据生物钟规律，适宜睡前服用的药品是

- A: 苯海拉明
- B: 沙丁胺醇
- C: 奥利司他
- D: 氟伏沙明

答案：B

62. 饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

- A: 15ml
- B: 10ml
- C: 25ml
- D: 20ml

答案：C

63. 减少因人员不足引致忙乱无序而带来的调配差错，是针对药品调配环节防范措施中的

- A: 保证足够的人力配备
- B: 规范操作、坚持核对
- C: 及时沟通
- D: 环境整齐、安静

答案：A

64. 由服用利尿药所引起的尿失禁属于

- A: 压力性尿失禁
- B: 真性尿失禁
- C: 急性、可逆性/暂时性尿失禁
- D: 急迫性尿失禁

答案：C

65. 正常成人血清尿素氮(BUN)的正常参考区间为()：

- A: 2.2~5.1mmol/L
- B: 3.8~6.1mmol/L
- C: 3.2~7.1mmol/L
- D: 1.8~6.5mmol/L

答案：C

66. 《药物事实与比较》属于

- A: 药物综合信息
- B: 药物相互作用
- C: 药品标准
- D: 药品不良反应

答案：A

67. 一级信息资料的最突出优点是

- A: 读者可以自己 对文献进行评价，免受他人观点的影响
- B: 内容广泛、使用方便
- C: 提供的信息丰富、详实
- D: 查阅时需要利用所提供的参考文献去验证

答案：A

68. 促动力药

- A: 铝碳酸镁
- B: 埃索美拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 多潘立酮

答案：D

69. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 氯吡格雷
- D: 利伐沙班

答案：C

70. 具有变形运动和吞噬功能，可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

- A: 中性粒细胞
- B: 嗜酸性粒细胞
- C: 嗜碱性粒细胞
- D: 淋巴细胞

答案：B

71. 处方按性质可分为

- A: 法定处方、普通处方
- B: 普通处方、协定处方
- C: 法定处方、麻醉药品处方

D: 法定处方、医师处方

答案：D

72. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

A: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同

B: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同

C: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同

D: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同

答案：A

73. 妊娠早期妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 苯妥英钠

B: 甲氨蝶呤

C: 辛伐他汀

D: 沙利度胺

答案：D

74. 患者，女，5岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天

B: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天

C: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天

D: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天

答案：C

75. 药品外观质量检查时，下列哪种药品需要进行澄明度检查

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 糖浆剂
- B: 注射剂
- C: 片剂
- D: 口服液

答案：B

76. 尤其适用于伴胸痛的干咳患者的药品是

- A: 可待因
- B: 羧甲司坦
- C: 右美沙芬
- D: 苯丙哌林

答案：A

77. 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是()

- A: 0.4g，每日 4 次
- B: 0.4g，每日 2 次
- C: 0.8g，每日 3 次
- D: 0.4g，每日 5 次

答案：D

78. 有强烈的血管收缩作用，输液过程中不慎渗出血管，可致组织坏死的药物是

- A: 米力农
- B: 多巴胺
- C: 去乙酰毛花苷
- D: 维拉帕米

答案：B

79. 癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 拉莫三嗪

答案：C

80. (2016 年真题) 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是 ()。

- A: 可能无关
- B: 很可能
- C: 可能
- D: 肯定

答案：D

81. 抗高血压药物属于钙通道阻滞剂的是 ()

- A: 依那普利
- B: 缬沙坦
- C: 氨氯地平
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

82. 脂肪或酪蛋白消化不良 (儿童) 可呈现

- A: 鲜血便

- B: 乳凝块便
- C: 白陶土便
- D: 柏油黑便

答案：B

83. 骨性关节炎伴轻-中度疼痛患者通常首选的药物是

- A: 透明质酸钠
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 布洛芬
- D: 氨基葡萄糖

答案：B

84. 患者，男，68 岁，肺癌晚期，平日清晨、晚间 8 点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛，应采取的治疗措施是

- A: 即刻加用吗啡缓释片一次
- B: 即刻加用芬太尼透皮贴剂
- C: 即刻加用可待因片一次
- D: 即刻加用吗啡片一次

答案：D

85. 阿托品与小活络丹合用

- A: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- B: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- C: 两者合用作用相反，互相降低药效
- D: 合用后抑制后者吸收，降低疗效

答案：B

86. 头痛，伴颈部僵硬、恶心、发热和全身痛，可能有

- A: 脑肿瘤
- B: 动脉瘤
- C: 脑膜炎
- D: 脑血管意外

答案：C

87. 有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 丙氨酸氨基转移酶（ALT）与谷丙转氨酶（GPT）是两个反映肝脏功能的指标
- B: 血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比
- C: 丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中
- D: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类

答案：B

88. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法，错误的是

- A: 禁食富含碘的食物
- B: 哺乳期伴甲状腺功能亢进症患者首选甲巯咪唑
- C: 避免使用含碘药物
- D: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料

答案：B

89. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 出版或更新的频率
- B: 索引的完备程度
- C: 检索路径及费用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 引用参考文献的质量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/027040110053010024>