

护理理论题库——内科部分

一、单选题

1. 脉搏短绌可见于 (D)

A 房室传导阻滞 B 心室颤动 C 窦性心律不齐 D 心房颤动 E 阵发性心动过速

2. 心绞痛发作时疼痛的部位主要在 (B)

A 心尖部 B 胸骨后或心前区 C 咽、下颌部 D 剑突下 E 背部

3. 发生左心衰竭的病人最常见症状是 (B)

A 便秘 B 呼吸困难 C 腹胀 D 体重下降 E 肌肉酸痛

4. 心肌的营养供应主要来自 (C)

A 颈动脉 B 乳内动脉 C 冠状动脉 D 头臂干动脉 E 肱动脉

5. 心跳呼吸骤停初期有效的抢救措施是 (D)

A 心内注射急救药物 B 开胸心脏按压 C 电击除颤 D 口对口呼吸加胸外按压 E 低温疗法

6. 急性心肌梗死发生心律失常最多见于(A)

A 发病后 24 小时内 B 发病后 30 小时左右

C 发病后 36 小时左右 D 发病后 48 小时 E 发病后 72 小时

7. 抢救青霉素过敏性休克的首选药物是: (C)

葡萄糖酸钙 B. 氯化钙 C. 盐酸肾上腺素 D. 去甲肾上腺素 E. 多巴胺

8. 心绞痛发作时, 疼痛时间一般持续 (A)

A 3-5 分钟 B 15-20 分钟 C 30 分钟 D 1 小时内

9. 可以同时扩张小动脉和静脉的血管扩张药是 (A)

A 硝普钠 B 酚妥拉明 C 硝酸甘油 D 多巴胺 E 多巴酚丁胺

10. 急性心肌梗死与心绞痛的疼痛主要区别是 (A)

A 持续时间 B 体位 C 部位 D 性质 E 放射部位

11. 长期卧床的心力衰竭病人, 形成下肢静脉血栓时, 当下床活动, 易栓塞的脏器是 (C)

A 心脏 B 脑组织 C 肺组织 D 肾脏 E 脾脏

12. 须避光使用的药物是 (D)

A 呋塞米 B 消心痛 C 卡托普利 D 硝普钠 E 西地兰

13. 心绞痛发作时疼痛持续时间一般为 (A)

A 3-5 分钟 B 15-20 分钟 C 30 分钟内 D 1 小时内 E 2 小时内

14. 最严重的心律失常是 (E)

A 室性期前收缩 B 房性期前收缩 C 房性扑动 D 室性心动过速 E 心室颤动

15. 冠心病最常见的病因是 (C)

A 重度主动脉病变 B 冠状动脉栓塞 C 冠状动脉粥样硬化 D 肥厚型心肌病 E 冠脉痉挛

16. 急性胰腺炎最主要的临床表现是 (A)

A 突然发生的腹痛 B 腹胀 C 低血压 D 发热 E 恶心呕吐

17. 急性胰腺炎禁用的药物是 (A)

A 吗啡 B 西米替丁 C 生长抑素 D 杜冷丁 E 阿托品

18. 成人插胃管时, 测量长度的正确方法为 (D)

A. 从眉心到剑突 B. 从鼻尖到剑 C. 从口到剑突 D 从发际到剑突

19. 为昏迷病员作口腔护理时, 特别应注意 : (C)

A. 压舌板轻轻撑开颊部 B. 从外向里擦净口腔及牙齿的各面

C. 血管钳夹紧棉球, 蘸水不可过多 D. 操作时动作要轻

20. 最能提示急性出血坏死型胰腺炎的检验结果是 (C)

A. 低血磷 B. 白细胞计数明显升高 C. 低血钙 D. 血清淀粉酶显著增高 E. 低血糖

21. 可放置冰袋降温的部位是 (D)

A. 枕部、肘窝 B. 颈部、腹部 C. 腋窝、胸部 D. 头顶、腹股沟

22. 急性胰腺炎最基本的治疗方法是 (B)

A. 手术治疗 B. 禁食补液 C. 抗生素 D. 糖皮质激素

23. 下面关于应用胶体枸橼酸铋 (CBS)错误的叙述是 (D)

A. 可用吸管直接吸人 B. 可出现便秘和大便呈黑色 C. 病人可有恶心、一时性血清转氨酶升高

D. 最好在餐后半小时服用 E. 极少数病人可出现急性肾衰竭

24. 消化性溃疡的主要症状是 (A)

A. 上腹痛 B. 早饱、嗝气 C. 纳差、厌油 D. 反酸、烧心 E. 上腹胀

25. 消化性溃疡最常见的并发症是 (A)

A. 出血 B. 急性穿孔 C. 慢性穿孔 D. 幽门梗阻 E. 癌变

26. 胃溃疡疼痛的节律性表现为 (E)

A. 空腹痛 B. 夜间痛 C. 进餐时疼痛 D. 餐后 3~4h 疼痛 E. 餐后 1/2—1h 疼痛

27. 静脉血栓形成后对患肢处理错误的是 (D)。

A. 制动 B. 抬高患肢 C. 抗凝治疗 D. 主动功能锻炼

28. 下面关于消化性溃疡病人饮食错误的叙述是 (C)

A. 在溃疡活动期, 以少食多餐为宜 B. 避免夜间零食和睡前进食, 使胃酸分泌有规律

C. 多饮全脂牛奶 D. 避免刺激性强的食物 E. 症状较重的病人可以面食为主

29. 插胃管时, 患者出现呛咳、发绀, 护士应 : (B)

A. 嘱患者深呼吸 B. 立即拔出胃管 C. 嘱患者做吞咽动作

D. 让患者休息一会再插 E. 让患者坚持一下

30. 输血前后及两袋血之间应加入的药物是 (C)

A. 5%葡萄糖 B. 5%葡萄糖盐水 C. 0.9%氯化钠 D. 复方氯化钠

31. 糖尿病患者注射普通胰岛素后一小时方进餐, 此时患者出现头昏、心悸、多汗饥饿感, 护士应想到患者发生哪些病情变化 (C)

A. 胰岛素过敏 B. 冠心病心绞痛 C. 低血糖反应 D. 酮症酸中毒早期 E. 高渗性昏迷先兆

32. 适用于各型糖尿病的治疗, 最基本的办法是 (C)

A. 注射胰岛素 B. EI 服优降糖 C. 饮食疗法 D. 卧床休息 E. 纠正电解质紊乱

33. 引起甲状腺功能亢进症发病的主要因素是 (A)

A. 自身免疫 B. 病毒感染 C. 理化因素 D. 过度疲劳 E. 手术创伤

34. 患者张某, 在输液过程中突然感到胸部异常不适, 随后出现呼吸困难, 严重发绀, 其最大可能及首要处理是: (B)

A. 肺水肿, 停止输液 B. 空气栓塞, 立即左侧卧位 C. 过敏, 皮下注射地塞米松

D. 心脏病发作, 立即遵医嘱使用强心剂 E. 低血容量休克, 立即补充血容量

35. 急性肺水肿的护理措施不正确的是 (C)

A. 按医嘱静脉注射西地兰 B. 取坐位, 两腿下垂 C. 持续低流量吸氧

D. 遵医嘱吗啡皮下注射 E. 遵医嘱静脉注射氨茶碱

36. 某糖尿病病人于某日餐前突然感到饥饿难忍、全身无力、心慌、出虚汗，继而神志恍惚，护士应立即采取哪项措施（ B ）

A. 静脉取血测血糖 B. 协助病人饮糖水 C. 进行血压监测 D. 建立静脉通路 E. 专人护理

37. 谢女士，患糖尿病，胰岛素治疗期间突然心悸、饥饿、出汗，随即意识不清。首要措施为（ C ）

A. 加大胰岛素剂量 B. 加用优降糖 C. 静脉注射 50%葡萄糖
D. 静脉滴注碳酸氢钠 E. 应用呼吸兴奋剂

38. 使用冰袋时哪项操作不妥（ B ）。

A. 将冰块砸成小块，用水冲去棱角 B. 将冰块装满冰袋即拧紧袋口
C. 擦干冰袋外面的水，检查有无漏水 D. 用布套或干毛巾包裹冰袋

39. 早餐前忘记注射胰岛素处理方法不正确的是（ D ）

A. 使用速效胰岛素类似物者可在餐后即刻注射 B. 使用预混胰岛素者可在餐后立即补注
C. 查午餐前血糖，若 $>10\text{mmol/L}$ ，可在午餐前临时注射一次短效人胰岛素或速效胰岛素类似物
D. 可把早晚两次预混胰岛素合并成一次在晚餐前注射

40. 关于胰岛素保存不正确的是（ C ）

A. 正在使用的胰岛素放在室温下（ $25^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$ ）保存
B. 尚未启封的胰岛素可置于 $2 \sim 8^{\circ}\text{C}$ 冰箱中冷藏保存
C. 正在使用的胰岛素需置于 $2 \sim 8^{\circ}\text{C}$ 冰箱中冷藏保存 D. 避免日晒 E. 避免冷冻

41. 当发生低血糖时，必须使用葡萄糖治疗的是（ A ）

A 阿卡波糖 B 格列美脲 C 二甲双胍 D 瑞格列奈

42. 1、分诊中病情级别不属于一级护理的是（ D ）

A 危急病人，如不抢救数分钟内可能死亡者 B 如心脏骤停、休克、急性重度中毒
C 昏迷、急性心肌梗死、大出血 D 高热，体温小于 40°C

42、成批伤检伤分类标记正确的是（ A ）

A 红色，病伤严重，可危及生命者。 B 红色，病情严重无危及生命者。
C 黄色，病情严重可危及生命者。 D 绿色，病伤严重，无危及生命者。

43、用止血带止血时，松解的间隔时间是（ B ）

- A 每 20-30 分钟松解一次 B 每 30-60 分钟松解一次
C 每 60-90 分钟松解一次 D 每 1-2 小时松解一次
45. 增殖性糖尿病视网膜病变病人不鼓励进行的运动 (B)
A. 游泳 B. 慢跑 C. 蹬车运动 D. 散步 E. 耐力运动
46. 大肠的主要功能是 (A)
A. 吸收水分 B. 分解大分子营养物质 C. 吸收维生素 D. 降解含氮代谢产物 E. 吸收脂肪
47. 胃肠钡餐造影检查需要禁食 (E)
A. 2h B. 4h C. 6h D. 8h E. 12h
48. 病人的呕吐物量大并伴有含酸性发酵宿食, 见于 (B)
A. 慢性胃炎 B. 幽门梗阻 C. 急性胆囊炎 D. 急性胰腺炎 E. 慢性胃炎
49. 急性腹痛持续大量呕吐的病人, 表现为呼吸浅慢, 提示发生 (C)
A. 低血钾 B. 呼吸性酸中毒 C. 代谢性碱中毒 D. 代谢性酸中毒 E. 低血钠
50. 急性呕吐与腹泻的病人, 优先考虑的护理诊断 / 问题是 (C)
A. 营养失调: 低于机体需要量 B. 有口腔黏膜完整性受损的危险
C. 有体液不足的危险 D. 活动无耐力 E. 焦虑
51. 长期卧床的病人最易发生褥疮的部位是 (C) 。
A. 耳廓 B. 户胛部 C. 骶尾部 D. 脚后跟
52. 需要将有意识障碍的呕吐病人置于头偏向一侧的卧位, 主要是为了防止 (D)
A. 呕吐加剧 B. 昏迷加重 C. 血压进一步降低 D. 窒息 E. 减少衣物污染
53. 小肠病变引起的腹痛多发生在 (C)
A. 剑突下 B. 右下腹 C. 脐周 D. 左下腹 E. 下腹部
54. 不适宜应用局部热疗减轻腹痛的情况是 (E)
A. 急性胃炎 B. 肠痉挛 C. 消化性溃疡 D. 溃疡性结肠炎 E. 消化性溃疡合并穿孔
55. 以下哪项属于大肠病变引起的腹泻的特点 (D)
A. 腹泻时的量多 B. 粪便一般呈水样 C. 粪便中常带有脂肪滴
D. 粪便含有较多的黏液 E. 粪便的颜色为灰白色
56. 发生急性左心衰的病人最常见症状是 (A)

A 呼吸困难 B 腹胀 C 体重下降 D 便秘

57. 关于腹泻病人的护理, 不正确的是 (B)

A 有腹痛时给予热敷 B. 限制饮水量 C. 不进食生冷食物
D. 食物应低纤维 E. 做好肛周皮肤的护理

58. 引起便秘的原因不包括 (D)

A. 饮水过少 B. 长期卧床 C. 身体极度衰弱 D. 食物中纤维过多 E. 应用吗啡类镇痛药

59. 胰岛素生理功能是 (B)

A 促糖原分解和糖异生, 使血糖降低 B 促葡萄糖利用和转化, 使血糖降低, 促蛋白质合成
C 促蛋白质合成, 维持男性第二性征 D 调节胃肠平滑肌运动 E 刺激骨髓红细胞生成

60. 肥胖是指体重超过理想体重为 (D)

A. 5% B. 10% C. 8% D. 20% E. 15%

61. 糖尿病患者体内葡萄糖不能充分利用, 发生消瘦的原因是 (D)

A. 口渴多饮 B. 脂肪合成增多 C. 无氧糖酵解增加
D. 蛋白质和脂肪分解增多及失水 E. 促进肌肉组织摄取葡萄糖

62. 目前糖尿病患者主要死亡原因为 (D)

A. 下肢动脉血栓形成 B. 酮症酸中毒 C. 高渗性非酮症昏迷
D. 冠心病、脑血管疾病 E. 糖尿病性肾病变

63. 糖尿病酮症酸中毒抢救的主要措施是 (C)

A. 补液 B. 抗感染 C. 补生理盐水 + 胰岛素 D. 补碱性液 E. 纠正电解质紊乱

64. 出现黑便提示出血量至少 (D)

A 200 毫升 B 150 毫升 C 100 毫升 D 50 毫升

65. 低钾血症最初表现是 (C)

A 多尿、夜尿 B 恶心、呕吐 C 肌无力 D 肠麻痹

66. 一氧化碳中毒, 口唇黏膜可出现 (D)

A 潮红 B 紫绀 C 苍白 D 樱桃红色

67. 女性, 28 岁, 烦渴多尿 1 年, 不规律用胰岛素治疗, 纳差、呕吐 3 天。体检: T 36.2°C, 呼吸深大有异味。血糖 22mmol/L, 尿糖 (++++), 酮体 (+++). 最可能的诊断为 (D)

- A. 急性肠炎 + 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒 C. 乳酸酸中毒
D. 糖尿病酮症酸中毒 E. 非酮症高渗性糖尿病昏迷

68. 留置导尿期间，下列措施正确的是：（ A ）

- A. 鼓励患者白天多饮水 B. 集尿袋高于耻骨联合 C. 每天更换一次导尿管
D. 每周更换一次集尿袋 E. 保持导尿管持续开放

69. 2 型糖尿病最常见致死并发症是（ A ）

- A. 心血管病变 B. 非酮症高渗性糖尿病昏迷 C. 并发感染及至败血症
D. 酮症酸中毒昏迷 E. 电解质紊乱

70. 有机磷农药中毒诊断的主要指标（ D ）

- A 典型症状 B 患者主诉 C 特殊气味 D 全血胆碱酯酶测定

71. 输液中发生肺水肿的吸氧需用 20%-30% 的乙醇湿化，其目的是（ C ）

- A 使患者呼吸道湿润 B 使痰液稀薄，易咳出 C 降低肺泡泡沫表面张力 D 消毒吸入的氧气

72. 采取中凹卧位时，应给予（ A ）

- A、头胸抬高 10-20°，下肢抬高 20-30° B、头胸抬高 20-30°，下肢抬高 20-30° C、
头胸抬高 30-40°，下肢抬高 40-50° D、头胸抬高 40-50°，下肢抬高 20-30°

73. 糖尿病病人予以胰岛素治疗，最常见的药物不良反应是（ A ）

- A. 低血糖反应 B. 肝功能损害 C. 腹胀、腹痛 D. 局部红肿、皮疹 E. 血管神经性水肿

74. 有关糖尿病病人应用胰岛素治疗，下列哪项不正确（ A ）

- A. 胰岛素应冷冻保藏 B. 采用 1ml 注射器抽药 C. 经常更换注射部位
D. 局部消毒应严密 E. 应注意胰岛素有效期

75. 对甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼的护理不应（ B ）

- A. 抬高头部 B. 鼓励多食略咸食品 C. 外出时用眼罩 D. 生理盐水纱布局部湿敷 E. 抗生素眼膏涂眼

76. 脑出血急性期应绝对卧床休息（ B ）

- A、1-2 周 B、3-4 周 C、1 周 D、4 周以上

77. 蛛网膜下腔出血病员，绝对卧床（ B ）

- A、出血停止后，仍应卧床 3 周保持情绪稳定，。
B、出血停止后，仍应卧床 4-6 周防止情绪激动注意心理护理。

C、出血停止后，仍应卧床 1 周，多加安慰，防止情绪激动。

D、出血停止后，仍应卧床 6 击以上，做好心理护理，防止情绪激动及躁动使病情加重。

78、颅高压患者呕吐时（ A ）

A、应及时清除口腔内呕吐物并采取头侧位，注意呕吐的形式。

B、呕吐物的量、颜色、性质，取仰卧位。

C、及时清除分泌物后，头偏向一侧，，注意其呕吐的量、性质。

D、清除口腔内的呕吐，并采取仰卧位。

79、静滴甘露醇起脱水降颅压作用，一般 250ml 应在（ B ）滴完。

A、10-15 分钟 B、20-30 分钟 C、30-45 分钟 D、60 分钟

80、蛛网膜下腔出血最常见的病因是（ C ）

A、动静脉畸形 B、高血压动脉硬化 C、先天性动脉瘤 D、颅内肿瘤

81、正常瞳孔在一般光线下直径为（ B ）mm。

A、2-3 B、3-4 C、4-5 D、1-2

82、颅高压患者（收缩压 $<100\text{mmHg}$ 者，昏迷及吞咽反射除外）应取（ B ）

A、头高脚低位 B、抬高床头 $15-30^\circ$ C、头高脚高位 D、去枕平卧位

83、脑出血急性期应禁食（ C ）

A、3 天 B、2 天 C、24 小时 D、4 天

84、截瘫患者，使用热水袋或热敷时温度（ B ）

A、不超过 60°C B、不超过 50°C C、 100°C 用双层布裹的热水袋 D、不超过 70°C

85、诊断癫痫的辅助检查，首选（ B ）

A、CT B、脑电图 C、MR D、B 超

86、禁忌腰椎穿刺的疾病为（ C ）。

A、脑炎 B、脑出血 C、脑疝 D、脑梗塞

87、脑神经共有（ A ）对。

A、12 B、13 C、14 D、11

88、癫痫病人测体温禁由（ A ）测量。

A、口腔 B、肛门 C、腋下 D、以上均可

88、腰穿常选第 (C) 腰椎间隙为穿刺点。

A、1、2 B、2、3 C、3、4 D、4、5

89、为左下肢瘫痪的病人行肌肉注射时，应选 (B)。

A、左臀部 B、右臀部 C、左右交替 D、脐周

90、腰穿术后去枕平卧 (C) 小时

A、8-12 B、4-6 C、6-8 D、3-4

91、以下为浅反射的是 (C)。

A、膝反射 B、踝反射 C、腹壁反射 D、肘反射

92、格林 - 巴利综合症严重病例可发生 (C) 而危及生命。

A、心跳骤停 B、败血症 C、呼吸肌麻痹 D、吞咽麻痹

93、尿储留患者一次导尿不能超过 (B) ml。

A、800 B、1000 C、1200 D、1500

94、腰穿术后应取 (C) 位。

A、头高脚低位 B、头低脚高位 C、去枕平卧 D、中凹卧位

95、以下 (C) 不是脑膜刺激征。

A、颈强直 B、克匿格征 C、巴彬斯基征 D、布鲁津斯基征

96、脑出血最常见的病因是 (B)。

A、动脉瘤 B、高血压动脉硬化 C、血液病 D、糖尿病

97、(B) 为最轻的意识障碍。

A、谵妄 B、嗜睡 C、昏睡 D、昏迷

98、高血压脑出血大部分发生于 (C)。

A、脑叶 B、小脑 C、基底节区 D、脑干

99、脑出血病人 (B) 日无大便，给予通便处理。

A、2 B、3 C、4 D、1

100、脑出血病人排便困难时可用 (B) 通便。

A、高压灌肠 B、低压灌肠 C、小剂量保留灌肠 D、大剂量不保留灌肠

101、在活体的心脏或血管内流动的血液发生凝固的过程，称为 (B)

A、血栓 B、血栓形成 C、栓塞 D、凝固

102、成人侧卧位腰穿压力高于 (B)为颅内压增高。

A、180 mmH₂O B、200 mm H₂O C、200 cm H₂O D、180cm H₂O

103、链霉素皮试液每 0.1ml 含 (C)单位链霉素。

A、25 B、50 C、250 D、150

104、使用溶栓药物治疗时应定期检查 (D)。

A、血常规 B、肝功能 C、心电图 D、凝血功能

105、肌力可分为 (B)级。

A、四 B、五 C、六 D、七

106、肌肉可收缩，但不能产生动作为 (B)肌力。

A、0级 B、I级 C、2级 D、3级

107、压疮发生的最主要原因为 (A)

A、局部组织长期受压 B、局部组织缺乏按摩 C、营养状况差 D、局部组织感染

108、病人持续地处于病理性睡眠状态，能被唤醒，醒后能基本正确地回答问题，尚能配合检查，但刺激停止后又入睡，为 (A)。

A、嗜睡 B、意识模糊 C、昏睡 D、昏迷

109、意识全部丧失，对强烈的刺激也完全无反应，各种反射均消失，生命体征也常有改变，为(D)。

A、意识模糊 B、浅昏迷 C、昏睡 D、深昏迷

110、颈项强直、克匿格征、布鲁津斯基征阳性是 (A)的表现。

A、脑膜刺激征 B、腹膜刺激征 C、脊髓半切综合征 D、共济失调

111、颅内压增高的“三主征”不包括 (B)。

A、头痛 B、耳鸣 C、视乳头水肿 D、呕吐

112、普通光线下瞳孔的直径小于 (B)为瞳孔缩小。

A、1mm B、2mm C、3mm D、4mm

113、普通光线下瞳孔的直径大于 (D)为瞳孔散大。

A、2mm B、3mm C、4mm D、5mm

114、脊神经共有 (D)对。

A、12 B、24 C、30 D、31

115、脊髓压迫症最常见的病因是 (A)。

A、肿瘤 B、炎症 C、脊柱外伤 D、脊柱退行性病变

116、脑缺血性病变的病理分期中“超早期”是指发病的 (A)。

A、1-6 小时 B、6-12 小时 C、6-24 小时 D、24-48 小时

117、以下不属于脑梗死的发病特点的是 (D)。

A、多发生于 60 岁以上 B、安静状态或睡眠中发生

C、意识障碍较轻或无 D、脑脊液呈血性

118、以下不属于溶栓治疗适应症的是 (D)。

A、年龄 <75 岁 B、无意识障碍 C、发病在 6 小时内 D、出血性疾病

119、脑出血最主要的致死原因为 (B)。

A、感染 B、脑疝 C、中枢性高热 D、应激性溃疡

120、确诊蛛网膜下腔出血的首选辅助检查方法是 (B)

A、脑脊液检查 B、颅脑 CT C、MRI 和 MRA D、脑电图

121、蛛网膜下腔出血主要致死原因是 (A)。

A、再出血 B、脑积水 C、感染 D、抽搐

122、以下哪个不属于帕金森病的特有表现 (D)。

A、“搓丸样”动作 B、齿轮样强直 C、写字过小征 D、偏瘫

123、一次癫痫发作持续时间 30 分钟以上，或连续多次发作、发作间期意识或神经功能未恢复至通常水平，称为 (D)。

A、阵挛性发作 B、强直性发作 C、失神发作 D、癫痫持续状态

124.以下哪个不是病毒性脑膜炎的主要临床表现 (D)。

A、发热 B、头痛 C、脑膜刺激征 D、耳鸣

125. 发生重症肌无力危象时最重要的处理措施是 (C)。

A、大剂量激素静脉给药 B、氧气吸入 C、气管切开、呼吸机辅助呼吸 D、心理疏导 126. 酒精擦浴禁拭区为 (C)。

A、腋窝 B、手心 C、腹部 D、腹股沟

127. 昏迷病人插胃管为提高成功率应注意 (B)

A、插管前将下颌贴近胸骨柄，至会厌时头后仰，缓慢插入 B、插管前头后仰至会厌托起头部
下颌贴近胸骨柄，缓慢插入 C、选择较细的胃管 D、增加胃管润滑的长度

128. 输液引起急性循环负荷过重（肺水肿）的特征性症状是 (D)

A、咳嗽、呼吸困难 B、心慌、恶心、呕吐
C、紫绀、烦躁不安 D、咳嗽、咳粉红色泡沫性痰、气促、胸闷

129. 为预防昏迷病人发生压疮，应每 (A) 小时翻身一次。

A、2 B、3 C、4 D、5

130. 为患者吸痰时，每次吸痰时间不超过 (B)。

A、10 秒 B、10~15 秒 C、20 秒 D、30 秒

131. 留置胃管患者每次注入流质饮食量不应超过 (B) ml。

A、100 B、200 C、300 D、400

132. 出现脑疝时以下哪项措施不妥 (D)。

A、迅速降低颅压 B、20%甘露醇快速静脉输入 C、脑室穿刺 D、加快补液速度

133. 为留置胃管患者注入流质饮食，其温度为 (B)。

A、30℃ B、38-40℃ C、50℃ D、55℃

134. 以下不属于约束带使用适应症的是 (D)。

A、瞻妄躁动者 B、有明显攻击行为者 C、自杀倾向 D、老年人

135. 脑血管病的危险因素不包括 (D)

A、高血压 B、心脏病 C、糖尿病 D、低脂血症

136. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是 (A)。

A、先天性动脉瘤 B、脑血管畸形 C、高血压动脉硬化 D、脑底异常血管网

137. 蛛网膜下腔出血患者出血停止后仍应卧床休息 (D) 以防再出血。

A、1-2 周 B、2-3 周 C、3-4 周 D、4-6 周

138. 肺炎球菌肺炎的特征性表现是 (B)

A. 寒战高热 B. 铁锈色痰 C. 呼吸困难 D. 咳嗽 E. 胸痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028011033010006052>