

一. 单选题

1. 药物的非特异性作用

- A. 主要与药物作用的载体有关
- B. 与机体免疫系统有关
- C. 与药物本身的理化性质有关
- D. 与药物的化学结构有关
- E. 主要与药物基因有关

2 . 关于受体的叙述，不正确的是

- A. 可与特异性配体结合
- B. 药物与受体的复合物可产生生物效应
- C. 受体与配体结合时具有结构专一性
- D. 受体数目是有限的
- E. 拮抗剂与受体结合无饱和性

3 . 关于受体存在的部位，正确的是

- A. 离子通道受体主要位于细胞核上
- B. 酪氨酸激酶受体是跨膜蛋白
- C. 细胞膜上有受体，细胞内无受体
- D. 细胞膜上有离子通道，但离子通道不是受体
- E. G 蛋白偶联受体位于胞浆中

4. 下列叙述正确的是

- A. 激动药既有亲和力又有内在活性
- B. 激动药有内在活性，但无亲和力
- C. 拮抗剂对受体亲和力弱
- D. 部分激动剂与受体结合后易解离
- E. 拮抗剂内在活性较弱

5. 已确定的第二信使不包括

- A. cAMP
- B. CGMP

C.磷酸肌醇

D.甘油二酯

E.肾上腺素

6. 酚妥拉明过量引起血压下降很低时，升压可用

A.肾上腺素静滴

B.异丙肾上腺素静注

C.去甲肾上腺素皮下注射

D.大剂量去甲肾上腺素静滴

E.以上都不是

7 .当老年患者患有哪一种疾病时禁用强心甙

A.脑血管疾病

8 .胃溃疡

C.急性心肌梗死

D.帕金森病

E.糖尿病

8. B1 受体主要分布于以下哪一器官

A.骨骼肌运动终板

8 .支气管粘膜

C.胃肠道平滑肌

D.心脏

E.腺体

9 .具有明显舒张肾血管增加肾血流作用的药物是

A.肾上腺素

B.多巴胺

C.去甲肾上腺素

D.间羟胺

E.去氧肾上腺素

10. 左旋多巴与卡比多巴合用治疗帕金森病的机制是

A.减慢左旋多巴肾脏排泄，增强其疗效

B.卡比多巴直接激动多巴胺受体，增强左旋多巴疗效

C.减少左旋多巴在外周的脱竣作用，使进入中枢的左旋多巴增多

D.抑制多巴胺再摄取，增强左旋多巴疗效

E.卡比多巴增加左旋多巴通过血脑屏障

11. 解热镇痛药的镇痛机制是

A.使 P 物质和 P 物质受体亲和力降低

B.使痛觉传导通路中 P 物质释放减少

C.抑制环氧酶(COX),使 PG合成释放减少

D.抑制中枢阿片受体

E.激动中枢阿片受体

12. 糖皮质激素药理作用不包括

A.抗炎作用

B.免疫抑制与抗过敏作用

C.抗休克

D.抗细菌性感染

E.影响水代谢

13. 宜选用大剂量碘剂的疾病是

A.结节性甲状腺肿

B.粘液性水肿

C.呆小症

D.甲状腺危象

E.弥漫性甲状腺肿

14 可引起刺激性干咳的药物是

A.氢氯噻嗪

B.卡托普利

C.肺屈嗪

D.心痛定

E.普萘洛尔

15. 可引起“首剂现象”的抗高血压药物是

A.肺屈嗪

B.哌唑嗪

C, 瓜乙唑

D.硝苯地平

E. 硝普钠

16 . 治疗急性肺水肿的首选药物是

A.氢氯噻嗪

B.螺内酯

C.氨苯蝶啶

D.氯睡酮

E. 呋塞米

17 . 治疗室性快速性心律失常首选的药物是

A.奎尼丁

B.维拉帕米

C.普萘洛尔

D.利多卡因

E.胺碘酮

18. 临床常用的评价抗菌药物抗菌活性的指标是

A.抗菌谱

B.化疗指数

C.最低抑菌浓度

D.药物剂量

E. 血浆药物浓度

19. 哪种细菌对青霉素 G 不敏感

A.破伤风杆菌

B.脑膜炎球菌

C.变形杆菌

D.溶血性链球菌

E.梅毒螺旋体

20. 患者，女，46 岁，诊断为结核病，服用多个抗结核病药进行治疗 3 个月，自觉视力下降，经检查后发现还有视野缺损。请问这是哪个药物的不良反应

A.异烟肼

- B. 环丝氨酸
- C. 利福平
- D. 乙胺丁醇
- E. 对氨基水杨酸

21. 解热镇痛且具有抗血小板聚集作用，可能增加出血危险的是

- A. 20%安乃近溶液
- B. 布洛芬
- C. 贝诺酯
- D. 阿司匹林
- E. 对乙酰氨基酚

22. 调配处方时，对需要特殊条件保存（如 2℃-10℃）的药品应该

- A. 加贴标签
- B. 分别包装
- C. 分别发放
- D. 采用特别包装
- E. 加贴醒目标签

23. 以下药物中适宜在睡前服用的是

- A. 美洛昔康
- B. 多潘立酮
- C. 阿托伐他汀
- D. 泼尼松
- E. 呋塞米

24. 一名 3 岁的患儿，其用药量是成人计量的

- A. 1/7-1/5
- B. 1/5-1/4
- C. 1/4-1/3
- D. 1/3-2/5
- E. 2/5-1/2

25. 2012 年“阿糖胞苷儿科事件”是电子处方将阿糖腺苷（抗病毒药）错误输入音似药品阿糖胞苷抗肿瘤药）导致严重后果案例，体现了药物警戒的作用包括

- A.发现药品质量问题
- B.药品上市前风险评估
- C.药品上市后风险评估
- D.发现与规避假、劣药流入市场
- E.发现药品使用环节的用药差错

26. 药品的在店养护应贯彻什么原则

- A.质量第一
- B.效益第一
- C.以防为主
- D.防治结合
- E.效率第一

27. 对胃肠、肝胆疾病引起的消化酶不足者可选用

- A.胰酶片
- B.维生素 C
- C.乳酶生
- D.胃蛋白酶合剂
- E.多潘立酮

28. 医疗器械的基本质量特性是

- A.安全性和适用性
- B.适用性和有效性
- C.安全性和经济性
- D.安全性和有效性
- E.安全性和可靠性

29. 药师在接受护士用药咨询时候应重点关注

- A.药品经济学知识
- B.药物制剂的等效性
- C.药品的生产厂商和批号
- D.药品在人体内的药代动力学参数
- E.注射剂的配置、溶媒、浓度和滴注速度

30. 下列哪种不属于已知致畸的药物

- A. 辛伐他汀
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 利巴韦林
- D. 焕诺酮
- E. 甲氨蝶呤

31. 脑水肿患者静脉滴注 20%甘露醇 500ml, 要求在 2h 内滴完, 滴系数为 20, 输液速度应为

- A. 5000 滴/分
- B. 1000 滴/分
- C. 83 滴/分
- D. 80 滴/分
- E. 60 滴/分

32. 药师“职业道德”要求中, 最重要的是

- A. 尊重患者隐私
- B. 遵循社会伦理规范
- C. 有良好的人文道德素养
- D. 尽力为患者提供专业、真实、准确的信息
- E. 以对药品质量负责, 保证用药安全有效为基本准则

33. 下列药物中适宜在睡前服用的是

- A. 泼尼松
- B. 美洛昔康
- C. 多潘立酮
- D. 辛伐他汀
- E. 奥利司他

34. 易造成持久性低血糖症, 老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

- A. 胰岛素
- B. 格列吡嗪
- C. 甲苯磺丁月尿
- D. 格列本服
- E. 格列齐特

35. 上呼吸道感染最常见的病原体是

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 支原体
- D. 衣原体
- E. 真菌

36 . 患者，男，5岁，1月前因突发右侧肢体无力、言语障碍就诊，诊断为缺血性脑卒中，现服用阿托伐他汀钙片，每晚1次，每次20mg该患者 LDL-C的控制目标值是

- A. $<1.8\text{mmol/L}$
- B. $<4.4\text{mmol/L}$
- C. $<3.4\text{mmol/L}$
- D. $<2.6\text{mmol/L}$
- E. $<2.8\text{mmol/L}$

37 . 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀6周，无明显效果，现考虑更换 MAO(HT)类药物，必须先停用帕罗西汀

- A. 3天
- B. 5天
- C. 1周
- D 2周
- E. 3周

38 . 阿片类药物中毒解救错误的是

- A. 洗胃导泻
- B. 静滴葡萄糖生理盐水促进排泄
- C. 选用纳洛酮拮抗
- D. 使用中枢兴奋剂催醒
- E. 不可用去水吗啡催吐

39 . 严重肝功能不全的病人，不宜选用

- A. 泼尼松
- B. 泼尼松龙

氢化可的松

D.地塞米松

E.倍他米松

40 男性，65岁.测血压经常为 180/120mmHg同时发现血糖为 8.7mmol/L,□□□□ 7,2mmol/L,

以下何种药物不宜使用

A.阿替洛尔

B.卡托普利

C.哌唑嗪

D.甲基多巴

E.尼群地平

41. 不能增加药物的溶解度的是

A.制成盐

B.使用助溶剂

C.采用替溶剂

D.加入助悬剂

E.引入亲水基团

42. 溶液型液体制剂不包括

A.糖浆剂

B.甘油剂

C.醋剂

D.芳香水剂

E.溶胶剂

43. 高分子溶液剂加入大量电解质可导致

A.高分子化合物分解

B.产生凝胶

C.盐析

D.胶体带电，稳定性增加

E.触变现象

44. 采用渗漉法制备流浸膏剂时，通常收集初漉液的量为

A.药材量 4 倍

B.药材量 85%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028012112003006135>