

2024 广西壮族自治区上林县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整版（研优卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 为降低肾小管坏死的发生率，应在输注前、后 12h 给予加入氯化钾的足量生理盐水和呋塞米，保持尿量不少于 100ml / h 的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 头孢菌素类药物
- C: 三环类抗抑郁药
- D: 顺铂

答案：D

2. 甲状腺危象应选用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 大剂量碘剂
- C: 胰岛素
- D: 格列本脲

答案：B

3. 低张力性便秘

- A: 开塞露
- B: 乳果糖
- C: 羧甲基纤维素钠
- D: 比沙可啶

答案：A

4. 60 岁以上老年人用药剂量应酌减，一般给予成人剂量的

A: 45356

B: 45295

C: 45327

D: 45355

答案：D

5. 可加重痴呆及认知功能受损的是

A: H

B: 地西泮

C: 氯苯那敏

D: 异丙嗪

答案：A

6. 药师应对"即时投诉患者"的基本原则是

A: 认真聆听患者倾诉

B: 让患者理解、换位思考

C: 给患者倒上一杯水

D: 尽快将投诉人带离现场

答案：D

7. (2019 年真题) 能改善眼部干燥症状，缓解视疲劳的药物是

A: 聚乙烯醇滴眼液

B: 可的松滴眼液

C: 硫酸锌滴眼液

D: 山莨菪碱滴眼液

答案：A

8. 蛋白酶抑制剂

- A: 依非韦伦
- B: 利巴韦林
- C: 齐多夫定
- D: 利托那韦

答案：D

9. 根据循证医学证据分级，同质 RCT 的系统评价结果属于

- A: II b 类证据
- B: I b 类证据
- C: II a 类证据
- D: I a 类证据

答案：D

10. 《2013 版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，成人推荐维生素 D 摄入量为

- A: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d
- B: 400IU (10 μ g) / d
- C: 600IU (15 μ g) / d
- D: 800~1200IU (20~30 μ g) / d

答案：B

11. 在骨性关节炎治疗中，为减轻胃肠道反应，可选用的选择性 COX-2 抑制剂是

- A: 萘普生
- B: 吲哚美辛
- C: 双氯芬酸

D: 塞来昔布

答案: D

12. 中毒时可采用催吐处理方法的患者

A: 孕妇患者

B: 中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人

C: 昏迷状态病人

D: 患有严重心脏病的患者

答案: B

13. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“D”是指

A: 控制饮食和糖尿病

B: β 受体阻断剂和血压控制

C: 阿司匹林和 ACEI

D: 健康教育和运动

答案: A

14. 肿瘤患者在化疗后出现痛性黏膜炎，可对症给予

A: 劳拉西泮

B: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝

C: 吗啡

D: 醋酸甲地孕酮—地塞米松

答案: B

15. 影响核酸合成的药物

A: 培美曲塞

B: 顺铂

C: 放线菌

D: 依托泊苷

答案：A

16. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- B: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- C: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- D: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同

答案：B

17. 季节性过敏性鼻炎主要的诱因是（）

- A: 花粉
- B: 光线
- C: 热
- D: 冷

答案：A

18. （2019 年真题）夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

- A: 直肠栓剂
- B: 软膏剂
- C: 滴眼剂
- D: 含漱剂

答案：A

19. 是空腹血浆中的主要脂蛋白，可将胆固醇运输到肝外组织的为

- A: 三酰甘油酯
- B: 血清总胆固醇
- C: 极低密度脂蛋白胆固醇

D: 低密度脂蛋白胆固醇

答案：D

20. 患者，男，32 岁。急性铅中毒，应用硫酸镁导泻，适宜的给药途径是

A: 口服给药

B: 直肠给药

C: 静脉注射

D: 吸入给药

答案：A

21. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

A: 胸痛

B: 多持续 3~5 分钟

C: 针刺或刀扎样锐性痛

D: 压迫、发闷

答案：C

22. 胶体果胶铋药物不良反应

A: 男性乳房女性化

B: 黑便

C: 性功能障碍

D: 睡眠障碍

答案：B

23. 主要用于抗真菌的药物是

A: 氟胞嘧啶

B: 阿糖腺苷

C: 阿糖胞苷

D: 氟尿嘧啶

答案: A

24. 治疗高血压伴稳定性心绞痛何种药物为宜

A: 硝苯地平

B: β -受体阻滞剂

C: 利血平

D: 甲基多巴

答案: B

25. “特异体质的患者及其家族成员可能发生过同样反应（如药物过敏）”提示诊断药源性疾病必须

A: 流行病学的调查

B: 排除药物以外的因素

C: 询问用药过敏史和家族史

D: 致病药物的确定

答案: C

26. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“必要时”用药的缩写是()

A: prn

B: qid

C: qd

D: qn

答案: A

27. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现嗜睡的是

A: 布洛芬

- B: 奥美拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 双氯芬酸

答案：B

28. 关于老年人患病，下列哪项叙述是错误的

- A: 老年人由于组织器官老化和生理功能减退，容易罹患多种慢性疾病
- B: 老年人的症状和体征往往表现不典型
- C: 老年人患多种疾病，若治疗上存在矛盾时，应忽略不良反应，保证药物治疗的全面性
- D: 老年人的各种器官功能减退，机体适应能力下降，故一旦发病，病情常迅速恶化

答案：C

29. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，P108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 支气管哮喘
- B: 急性左心衰竭
- C: 慢性支气管炎急性发作
- D: 肺动脉栓塞

答案：B

30. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔
- C: 硝酸酯类

D: 地高辛

答案: A

31. 可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

A: 阿米卡星

B: 米诺环素

C: 头孢唑林

D: 诺氟沙星

答案: D

32. (2016 年真题) 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是 ()。

A: 很可能

B: 可能无关

C: 可能

D: 肯定

答案: D

33. 患者，女，65 岁，因稳定型心绞痛服用阿替洛尔治疗，药师应告知患者每天应自测心率，静息心率控制在

A: 55~60 次 / 分

B: 35~40 次 / 分

C: 40~45 次 / 分

D: 65~70 次 / 分

答案: A

34. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,妊娠早期服用甲氨蝶呤

- A: 导致新生儿血钙过高
- B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- C: 可能致胎儿畸形
- D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

答案: C

35. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起

- A: 尿沉渣白细胞
- B: 尿沉渣尿酸盐
- C: 尿沉渣管型
- D: 尿沉渣结晶

答案: C

36. 以下药品中,最容易受湿度影响而变质的是

- A: 水溶性基质栓
- B: 胰岛素制剂
- C: 滴眼剂
- D: 肝素等生物制品

答案: A

37. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配,体现处方的

- A: 有效性
- B: 法律性
- C: 技术性
- D: 经济性

答案: C

38. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 便秘
- B: 共济失调
- C: 口干
- D: 肾损害

答案：D

39. 可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素是

- A: 甲羟孕酮
- B: 司坦唑醇
- C: 他莫昔芬
- D: 依普黄酮

答案：B

40. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

- A: 1 周
- B: 48 小时
- C: 4 小时
- D: 24 小时

答案：C

41. 季节性过敏性鼻炎主要的诱因是

- A: 花粉
- B: 季节

C: 真菌

D: 尘埃

答案：A

42. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

A: 米氮平

B: 氟伏沙明

C: 氯米帕明

D: 吗氯贝胺

答案：B

43. （2018 年真题）用于胆石症的非手术治疗，属于钙通道阻滞剂，不可掰开嚼碎，避免卧位服用的药物是（）

A: 匹维溴铵片

B: 山莨菪碱片

C: 鹅去氧胆酸片

D: 熊去氧胆酸片

答案：A

44. （2015 年真题）下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是（）。

A: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶

B: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

C: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状

D: 需要终身服药

答案：A

45. 可用于治疗沙眼的处方药是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 红霉素眼膏
- C: 硫酸锌
- D: 磺胺醋酰钠

答案：D

46. 依据 CTP 评分，肝功能不全 A 级病人用药剂量为正常患者剂量的

- A: 70%维持剂量
- B: 60%维持剂量
- C: 80%维持剂量
- D: 50%维持剂量

答案：D

47. 有明确的风险，有必要采取措施以降低风险；评判为

- A: 验证
- B: 确认
- C: 驳倒
- D: 待验证

答案：B

48. 消化不良性腹泻宜选用的药物是

- A: 胰酶
- B: 山莨菪碱
- C: 双八面体蒙脱石散
- D: 双歧三联活菌制剂

答案：A

49. （2018 年真题）干眼症可选用（）

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：C

50. (2017 年真题) 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是 ()

- A: 头孢克洛
- B: 诺氟沙星
- C: 阿莫西林
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：D

51. (2016 年真题) 与阿莫西林配伍，可提高治疗的是 ()。

- A: 苄丝肼
- B: 叶酸
- C: 克拉维酸钾
- D: 奥美拉唑

答案：C

52. 是人体储存能量的形式，直接参与胆固醇和胆固醇酯合成的为

- A: 三酰甘油酯
- B: 血清总胆固醇
- C: 极低密度脂蛋白胆固醇
- D: 低密度脂蛋白胆固醇

答案：A

53. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

- A: 四环素
- B: 阿托品
- C: 氯噻嗪
- D: 地高辛

答案：D

54. 检查栓剂 / 软膏剂的异嗅和散剂的气味属于

- A: 视觉试验
- B: 嗅觉试验
- C: 听觉试验
- D: 触觉试验

答案：B

55. 对于胆囊息肉的叙述错误的是

- A: B 超检查发现胆囊息肉很罕见，通常患者无症状
- B: 当胆囊息肉直径超过 8mm 时，建议看外科
- C: 有发展为胆囊癌的风险
- D: 多数为胆固醇结晶，少数为胆囊腺瘤

答案：A

56. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是()。

- A: 卡马西平
- B: 乙酰胺
- C: 阿托品
- D: 毒扁豆碱

答案：B

57. 正常人对铁剂的吸收率为

- A: 0.3
- B: 10%~20%
- C: 0.4
- D: 10%~30%

答案：B

58. 属于脂溶性维生素的是

- A: 维生素
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 B12
- D: 维生素

答案：D

59. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 预混胰岛素

答案：C

60. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是（）

- A: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑
- B: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- C: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑
- D: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

答案：B

61. 治疗胃食管反流病，艾司奥美拉唑的正确服药时间是

- A: 餐后、睡前
- B: 三餐前 30min
- C: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- D: 早餐前 30min

答案：D

62. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 巴比妥类中毒
- B: 乐果中毒
- C: 1605 中毒
- D: 3911 中毒

答案：A

63. 格列齐特片的适宜服药时间是

- A: 餐中
- B: 餐前
- C: 清晨
- D: 餐后

答案：B

64. 关于乙型肝炎病毒表面抗体的描述错误的是

- A: 大多数 HBsAg 的消失和 HBsAb 的出现，意味着 HBV 感染的恢复期和人体产生了免疫力
- B: HBsAb 是 HBsAg 的对应抗体，但非中和抗体
- C: HBsAb 是一种保护性抗体
- D: 乙型肝炎恢复期可出现 HBsAb 阳性

答案：B

65. 选择的前提是

- A: 药物治疗的安全性
- B: 药物治疗的规范性
- C: 药物治疗的方便性
- D: 药物治疗的有效性

答案：A

66. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 氨氯地平
- B: 卡托普利
- C: 厄贝沙坦
- D: 比索洛尔

答案：C

67. 不良反应是口干、尿潴留的是（）

- A: 索利那新
- B: 哌唑嗪
- C: 特拉唑嗪
- D: 度他雄胺

答案：A

68. （2015 年真题）氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是（）。

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 胃肠类疾病
- D: 肝病

答案：A

69. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 协商方式
- B: 教育方式
- C: 主动方式
- D: 指令方式

答案：C

70. 通过阻滞分布在前列腺和膀胱颈部平滑肌细胞表面的 α_1 受体，松弛平滑肌，达到缓解膀胱出口动力性梗阻作用的药物是

- A: 十一酸睾酮
- B: 特拉唑嗪
- C: 酚妥拉明
- D: 普适泰

答案：B

71. 根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

- A: 急性尿潴留
- B: 严重高血压
- C: 急性胰腺炎
- D: 慢性荨麻疹

答案：A

72. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 软骨病

- B: 骨性关节炎
- C: 类风湿关节炎
- D: 骨质疏松症

答案：C

73. 药物警戒涉及与药品相关的研究和活动，但不包括

- A: 药品超说明书用药
- B: 疫苗的不良反应
- C: 处方调配错误
- D: 药物的有效成分鉴定

答案：D

74. 用于估算透析清除率的是（）

- A: CLHD 公式
- B: CoChrAnE 分级
- C: NCEMERP 标准
- D: CoCkroft-GAut 公式

答案：A

75. 外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

- A: 制霉菌素
- B: 林可霉素
- C: 甲硝唑
- D: 庆大霉素

答案：A

76. 由护士双人核对监测

- A: 医师处方差错

- B: 药师调配处方差错
- C: 患者执行医嘱差错
- D: 护士执行医嘱差错

答案：D

77. 患者，女，42 岁。左足背部出现严重冻疮，可考虑应用

- A: 紫云膏
- B: 樟脑软膏
- C: 赛庚啶
- D: 肝素钠乳膏

答案：D

78. 可提示轻度黄疸的是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $>342 \mu\text{mol/L}$

答案：C

79. 关于处方书写中的基本要求错误的

- A: 中药饮片调剂、煎煮的特殊要求注明在药品左上方并加括号
- B: 麻醉药品处方应有病历记录
- C: 一般情况下均要注明临床诊断
- D: 年龄必须写实足年龄

答案：A

80. “发现并确认‘仙牛健骨颗粒’III期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

- A: 药品上市后风险评估
- B: 发现与规避假、劣药品流入市场
- C: 发现药品质量问题
- D: 药品上市前风险评估

答案：D

81.（2019 年真题）患者，男，25 岁，有癫痫病史 2 年，一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好，近期因社区获得性肺炎入院。下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

- A: 莫西沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 阿莫西林
- D: 头孢曲松

答案：A

82. 患者通过电话、网络或信件询问是

- A: 主动方式
- B: 指令方式
- C: 质问方式
- D: 被动方式

答案：D

83. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

- A: 空腹血糖
- B: 餐后 2 小时血糖
- C: 糖化血红蛋白
- D: 尿胆红素

答案：C

84. 救治磷化锌中毒，不能应用的催吐药是

- A: 硫酸钠
- B: 硫酸铜
- C: 阿扑吗啡
- D: 硫酸镁

答案：C

85. 治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

- A: 头孢唑林
- B: 红霉素
- C: 青霉素
- D: 莫西沙星

答案：B

86. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 索利那新
- B: 坦索罗辛
- C: 米多君
- D: 非那雄胺

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/028013025043007022>