

2024 贵州省赫章县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题通关秘籍题库（历年真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 磺胺类药物应用于新生儿会导致

- A: 血小板减少
- B: 黄疸
- C: 静脉炎
- D: 腹部不适

答案：B

2. 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

- A: 阿司匹林
- B: 二甲双胍
- C: 米氮平
- D: 辛伐他汀

答案：C

3. 可发生双硫仑样反应的是

- A: 替硝唑+苯巴比妥
- B: 替硝唑+华法林
- C: 奥硝唑+乙醇
- D: 甲硝唑+乙醇

答案：D

4. 患者易于配合，多用于重症患者和儿童的是

- A: 口服制剂
- B: 气雾剂
- C: 干粉吸入方法
- D: 雾化吸入溶液

答案：D

5. 关于糖皮质激素对血液成分影响的描述，错误的是

- A: 使中性白细胞数增多
- B: 使血小板增多
- C: 使红细胞和血红蛋白含量增加
- D: 降低纤维蛋白原浓度

答案：D

6. 口服索他洛尔作为抗心律失常药，其疗效和不良反应发生率均呈剂量依赖性，具有最佳获益风险比的用法是一天两次，一次

- A: 160mg
- B: 40mg
- C: 80mg
- D: 120mg

答案：D

7. 糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

- A: 格列吡嗪
- B: 胰岛素
- C: 格列喹酮
- D: 格列齐特

答案：C

8. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 骨髓功能抑制
- B: 妊娠及哺乳期妇女
- C: 严重心脏病
- D: 腰椎间盘突出

答案：D

9. 具有抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 莫沙必利
- B: 西沙必利
- C: 碳酸氢钠
- D: 奥美拉唑

答案：D

10. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0. 5g，一日 3 次；阿卡波糖 0. 1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 乙酰唑胺
- B: 氨苯蝶啶
- C: 呋达帕胺
- D: 呋塞米

答案：D

11. 具有强大的抗凝血因子 XA 功能及微弱的抗凝血酶作用，可用于预防深静脉血栓形成的药物是()

- A: 尿激酶
- B: 那屈肝素钙
- C: 阿加曲班
- D: 华法林

答案：B

12. 存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 泼尼松
- B: 表柔比星
- C: 多西他赛
- D: 卡莫司汀

答案：C

13. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

- A: 卡托普利
- B: 美托洛尔
- C: 沙库巴曲缬沙坦
- D: 伊伐布雷定

答案：C

14. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片中含有

- A: 雌二醇
- B: 去氧孕烯
- C: 维生素 B6

D: 炔雌醇

答案: C

15. 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是()

A: 地特胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案: C

16. 与呋喃妥因特性不符的叙述是()

A: 在小肠吸收迅速

B: 碱性尿液中杀菌作用增强

C: 有广谱抗菌活性

D: 主要用于泌尿系感染

答案: B

17. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

A: 克拉霉素

B: 克林霉素

C: 万古霉素

D: 红霉素

答案: A

18. 下述药物中属于减鼻充血药的是

A: 盐酸麻黄碱溶剂

B: 复方薄荷樟脑溶剂

C: 色甘酸钠溶剂

D: 链霉素溶剂

答案：A

19. 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是()

A: 卡巴克络

B: 甲萘氢醌

C: 蛇毒血凝酶

D: 鱼精蛋白

答案：C

20. 噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

A: 血钾

B: 血氨

C: 血钠

D: 血氯

答案：B

21. 滴鼻剂的正确使用方法不包括()

A: 儿童必须在成人监护下使用

B: 如果正在服用其他药品，需要遵医嘱使用滴鼻剂

C: 使用滴鼻剂时，可以同时使用同类的滴鼻剂加强疗效

D: 如滴鼻液过多流入口腔，可将其吐出

答案：C

22. 以下抗心律失常药中，对光过敏的是

A: 胺碘酮

B: 奎尼丁

C: 普萘洛尔

D: 利多卡因

答案: A

23. 属于刺激性泻药的是

A: 聚乙二醇 4000

B: 乳果糖

C: 甘油（开塞露）

D: 酚酞

答案: D

24. 属于 α_1 受体阻断剂治疗良性前列腺增生症的是

A: 坦洛新

B: 度他雄胺

C: 西地那非

D: 他达拉非

答案: A

25. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

A: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

B: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量

C: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药

D: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

答案: D

26. 碳酸氢钠可用于

A: 呼吸性酸中毒

B: 代谢性碱中毒

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 呼吸性碱中毒

D: 代谢性酸中毒

答案：D

27. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

A: 剂型

B: 浓度

C: pH

D: 作用面积

答案：C

28. 避孕药的作用机制不包括

A: 使子宫黏膜内腺体生长

B: 改变子宫颈黏液

C: 使子宫腺体制造糖原减少

D: 抑制排卵

答案：A

29. (2018 年真题) 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害, 临床用药需要重点关注的抗癫痫药是 ()

A: 苯妥英钠

B: 丙戊酸钠

C: 苯巴比妥

D: 氯硝西洋

答案：B

30. (2018 年真题) 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性, 临床应用的解毒方案是 ()

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
- B: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼
- C: 在用柔红霉素同时,使用柔红霉素等量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素后 30min,使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生

答案：A

31. 对曲霉无效的药物是

- A: 伏立康唑
- B: 伊曲康唑
- C: 氟康唑
- D: 两性霉素 B

答案：C

32. 抑制细菌依赖性 DNA 的 RNA 聚合酶，阻碍 mRNA 合成的药物是

- A: 两性霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氧氟沙星
- D: 利福平

答案：D

33. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

- A: 糖皮质激素
- B: 异烟肼
- C: 丙磺舒
- D: 雌激素

答案：B

34. 喷托维林为中枢性镇咳药。

- A: 氨溴索
- B: 沙丁胺醇
- C: 喷托维林
- D: 噻托溴铵

答案：C

35. 即可溶解白色黏痰，又可溶解脓性痰的是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 羧甲司坦
- C: 氨溴索
- D: 右美沙芬

答案：A

36. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

- A: 15 分钟以上
- B: 60 分钟以上
- C: 30 分钟以上
- D: 5 分钟以上

答案：A

37. (2019 年真题) 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险，为降低此风险，应采取的措施是 ()

- A: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- B: 使用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- C: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- D: 应长期合用质子泵抑制剂

答案：B

38. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 甲苯氢醌
- C: 酚磺乙胺
- D: 鱼精蛋白

答案：B

39. 卡马西平用于

- A: 早期帕金森病
- B: 特发性震颤
- C: 慢性脑功能不全
- D: 神经源性尿崩症

答案：D

40. 糖皮质激素用于某些慢性病的长期疗法中，采用隔日 1 次给药法，将 48 小时用量一次服用，合适的时间是

- A: 中午 12 时
- B: 上午 8 时
- C: 下午 3 时
- D: 下午 6 时

答案：B

41. 对曲霉属无效的药物是()

- A: 氟康唑
- B: 伏立康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 伊曲康唑

答案：A

42. (2019 年真题) 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物 ()

- A: 大环内酯类
- B: 氟喹诺酮类
- C: 四环素类
- D: 氨基糖苷类

答案：B

43. (2018 年真题) 肝素过量所致出血的解救药物是 ()

- A: 鱼精蛋白
- B: 酚磺乙胺
- C: 维生素 K
- D: 蛇毒血凝酶

答案：A

44. 应用磺酰脲类降糖药治疗 5 年，患者发生继发性失效的比例是

- A: 30%~40%
- B: 5%~15%
- C: 1%~5%
- D: 50%~60%

答案：A

45. 少数病人首次用药出现首剂效应的是

- A: 地高辛
- B: 哌唑嗪
- C: 氨氯地平
- D: 卡托普利

答案：B

46. 关于艾塞那肽的描述，不正确的是

- A: 可造成消化不良
- B: 应注意是否有过敏性症状
- C: 服药期间应警惕急性胰腺炎症状
- D: 适用于糖尿病酮症酸中毒

答案：D

47. 主要抑制排卵的长效口服避孕药是

- A: 庚酸炔诺酮
- B: 苯丙酸诺龙
- C: 丙酸睾丸素
- D: 炔诺酮

答案：A

48. 匹维溴铵在使用中应注意

- A: 对食管有刺激性，需整片吞服
- B: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- C: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用
- D: 糖尿病患者避免使用

答案：A

49. 中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

()

- A: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- B: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案: C

50. 与 HIV-1 的逆转录酶直接结合并通过破坏该酶的催化位点来阻断 RNA 依赖和 DNA 依赖的 DNA 聚合酶的活性的是

A: 整合酶抑制剂

B: 核苷类反转录酶抑制药

C: 非核苷类反转录酶抑制药

D: 蛋白酶抑制药

答案: C

51. 可用于降低眼压的药物是()

A: 左氧氟沙星

B: 利福平

C: 阿托品

D: 卡替洛尔

答案: D

52. 属于植物制剂,用于治疗前列腺增生的药物是()

A: 特拉唑嗪

B: 普适泰

C: 十一酸睾酮

D: 非那雄胺

答案: B

53. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

- A: 氯化铵
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 右美沙芬

答案：C

54. 以上药物镇咳作用与可待因相当且没有镇痛作用的是

- A: 喷托维林
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 吗啡

答案：B

55. 安全性高，几乎无不良反应的是

- A: 非那雄胺
- B: 十一酸睾酮
- C: 多沙唑嗪
- D: 舍尼通

答案：D

56. 可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

- A: 多西环素
- B: 甲砒霉素
- C: 加替沙星
- D: 庆大霉素

答案：A

57. 氯霉素的抗菌作用机制是

- A: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏
- B: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成
- C: 与细菌核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，是蛋白质合成受阻
- D: 阻止氨基酰-tRNA 与细菌核糖体 30S 亚基结合，影响蛋白质的合成

答案：C

58. 因是前药，需在肝内转化后生效，严重肝功能不全者不宜选用的糖皮质激素是

- A: 泼尼松
- B: 甲泼尼龙
- C: 氢化可的松
- D: 泼尼松龙

答案：A

59. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 托拉塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：B

60. 属于膨胀性泻药的是()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖
- D: 蓖麻油

答案：A

61. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

- A: 氯喹
- B: 依米丁
- C: 喹碘仿
- D: 替硝唑

答案：A

62. 下列关于眼部细菌感染说法错误的是()

- A: 眼科术后引起细菌性眼内炎，可向眼内注射万古霉素
- B: 急性期或严重的衣原体感染可口服阿奇霉素治疗
- C: 淋球菌性结膜炎采用眼局部抗菌药物治疗即可
- D: 局部给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

答案：C

63. 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是()

- A: 茶碱
- B: 噻托溴铵
- C: 孟鲁司特
- D: 沙美特罗

答案：D

64. 可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

- A: 喹诺酮类
- B: 苯唑西林
- C: 四环素
- D: 甲硝唑

答案：D

65. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

- A: 3%过氧化氢溶液
- B: 3%酚甘油滴耳液
- C: 2%过氧化氢溶液
- D: 2%酚甘油滴耳液

答案：A

66. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，既往有癫痫病史。因感染性脑膜炎入院治疗，在脑脊液标本的病原学结果回报之前，可经验性选用的抗菌药物是 ()

- A: 米诺环素
- B: 卡泊芬净
- C: 亚胺培南西司他丁
- D: 头孢曲松

答案：D

67. 关于唑吡坦作用特点的说法，错误的是 ()

- A: 唑吡坦具有镇静催眠作用，抗焦虑作用
- B: 唑吡坦属于 γ -氨基丁酸 A 型受体激动剂
- C: 唑吡坦血浆蛋白结合率高
- D: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速

答案：A

68. 高效选择性 5-HT

- A: 甲氧氯普胺
- B: 多潘立酮

C: 莫沙必利

D: 西沙必利

答案: C

69. 属于助消化药的是()

A: 莫沙必利

B: 奥美拉唑

C: 胶体果胶铋

D: 胃蛋白酶

答案: D

70. ACEI 与其联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用的是()

A: 人促红素

B: 留钾利尿药

C: 噻嗪类利尿药

D: β 受体阻断药

答案: A

71. 银杏叶提取物用于

A: 早期帕金森病

B: 神经源性尿崩症

C: 特发性震颤

D: 慢性脑功能不全

答案: D

72. 哮喘急性发作首选的药物是

A: 布地奈德福莫特罗吸入剂

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 羧甲司坦口服液

D: 孟鲁司特片

答案: B

73. 关于乙酰半胱氨酸的说法, 错误的是()

A: 对痰液较多的患者, 乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

B: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性

C: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键, 使浓痰易于咳出

D: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

答案: A

74. 下列关于碘苷说法错误的是

A: 可用于疱疹性脑膜炎

B: 皮肤疾病可长期用药

C: 可用于单纯疱疹性角膜炎

D: 可延缓角膜上皮创伤愈合

答案: B

75. 抑制胃酸分泌作用的药物是

A: 奥关拉唑

B: 枸橼酸铋钾

C: 碳酸钙

D: 莫沙必利

答案: A

76. 属于抗菌增效剂的是

- A: 甲氧苄啶
- B: 氧氟沙星
- C: 磺胺嘧啶
- D: 呋喃唑酮

答案：A

77. 抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 博来霉素
- C: 多柔比星
- D: 长春新碱

答案：A

78. 需要迅速抗血小板作用时，不宜选择的药物是

- A: 阿替普酶
- B: 硝酸甘油
- C: 噻氯匹定
- D: 普萘洛尔

答案：C

79. 中毒后可用维生素 B6 来对抗的抗结核药是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案：B

80. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

- A: 两性霉素
- B: 阿糖胞苷
- C: 卡泊芬净
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

81. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 多西他赛
- B: 泼尼松
- C: 卡莫司汀
- D: 表柔比星

答案：C

82. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水
- B: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- C: 服药过程中适当补充维生素 B
- D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

答案：A

83. 肝功能不全、哺乳期妇女禁用()

- A: 氯霉素
- B: 四环素可的松
- C: 夫西地酸
- D: 利福平

答案：C

84. 属于硝基呋喃类的是

- A: 磺胺甲
- B: 夫西地酸
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

答案：C

85. 为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

- A: HDL
- B: LDL
- C: VLDL
- D: IDL

答案：A

86. 通过产生一氧化氮(NO)松弛血管平滑肌，以扩张静脉为主的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 普萘洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 硝苯地平

答案：C

87. (2016 年真题) 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是

- A: 噻吗洛尔
- B: 甘露醇
- C: 毛果芸香碱

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 乙酰唑胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/028026041042007022>