2024河北省晋州市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库附答案【预热题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.举重运动员使用后，可在短时间内急速降低体重，因此需按兴奋剂管理的药物是

A：呋塞米

B：缬沙坦

C：普萘洛尔

D：硝苯地平

答案：A

2.患者，女，30岁，妊娠7个月，既往有磺胺类药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物增多并有烧灼感。药师应推荐的治疗药物是

A：氯霉素滴眼液

B：磺胺醋酰钠滴眼液

C：硫酸锌滴眼液

D：利巴韦林滴眼液

答案：C

3.下列药物信息源中，归属一级文献资料的是

A：中国药学文摘

B：中国药学年鉴

C：中国药学杂志

D: 新编药物学

答案：C

4.《中国药典》2015年版分为几部

A: 二部

B: 三部

C: 一部

D: 四部

答案：D

5.肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

A: 肝硬化

B: 缺铁性贫血

C: 急性胰腺炎

D: 糖尿病

答案：A

6.若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

A: 餐前服用

B: 餐后服用

C: 餐中服用

D: 清晨服用

答案：A

7.单侧头痛伴光敏感、恶心、呕吐提示

A：脑膜炎

B：脑肿瘤

C：脑血管意外

D：偏头痛

答案：D

8.救治磷化锌中毒的过程中，立即应用的催吐药是

A：硫酸铜

B：硫酸钠

C：阿扑吗啡

D：硫酸镁

答案：A

9.白细胞分类中，单核细胞参考范围为

A：20%～40%

B：3%～8%

C：50%～70%

D：1%～5%

答案：B

10.“以快速、准确地获得问询问题答案”的咨询服务方法步骤是

A：对文献进行评价、分析和整理

B：确立有效的检索方法、查阅文献

C：对问题进行确定并归类

D：形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：A

11.脑梗死的分期，急性期

A: 2～3个月

B: 1～6个月

C: 1个月内

D: 15天

答案：C

12.属于治疗荨麻疹的过敏活性物质阻释剂的是

A: 异丙嗪

B: 去氯羟嗪

C: 酮替芬

D: 赛庚啶

答案：C

13.磷化锌经口中毒的典型临床表现是

A: 抽搐

B: 口内有金属味

C: 呕吐物有蒜臭味

D: 腐蚀性口腔炎

答案：C

14.稳定型心绞痛的临床表现不包括

A: 持续3～5分钟

B: 压迫、发闷

C: 胸痛

D: 针刺或刀扎样锐性痛

答案：D

15.患者，女，35岁，部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。

A：低血糖

B：视物模糊

C：牙龈增生

D：共济失调

答案：A

16.服后有幻觉、精神错乱、眩晕、嗜睡、视力模糊

A：布洛芬

B：西咪替丁

C：硝酸甘油

D：金刚烷胺

答案：D

17.消化性溃疡发病机制中的防御因子为

A：酒精

B：Hp感染

C：前列腺素E

D：吸烟

答案：C

18.对急性卡他性结膜炎可选用

A: 碘苷滴眼液
B: 硫酸锌滴眼液
C: 杆菌肽眼膏
D: 1%泼尼松龙滴眼液
答案：C

19.华法林不会在乳汁中出现的机制是
A: 解离度大
B: 在母体血浆中处于结合状态
C: 呈弱酸性
D: 呈弱碱性
答案：B

20.每1疗程期间应停药3天的是
A: 泼尼松
B: 苯溴马隆
C: 别嘌醇
D: 秋水仙碱
答案：D

21.患者，男，40岁，体重70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于50ml/min时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐(Cr)130μmol/L。医师给出的治疗方案是
A: 经验剂量的3/4
B: 延长给药间隔时间
C: 不需要调整给药方案
D: 经验剂量的1/2

答案：C

22.大剂量可导致Q-T间期延长的是

A：西沙必利

B：莫沙必利

C：甲氧氯普胺

D：多潘立酮

答案：A

23.患者，女性，50岁，因咳嗽时漏尿明显就诊，患者既往生育史为剖宫产2胎，既往有咳嗽，漏尿症状，现症状明显加重，负重后均有尿液流出，每日需用卫生巾1～2片。经相关检查确诊为压力性尿失禁，给予米多君治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A：鼻咽炎和尿路感染

B：口干、便秘、尿潴留

C：卧位和坐位时高血压

D：直立性低血压

答案：C

24.适宜餐中服用的是

A：奥利司他

B：吲哚美辛

C：多潘立酮

D：氟伐他汀

答案：A

25.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A：尽量避免使用专业术语

B: 可提供一些宣传资料

C: 认真聆听

D: 尽量提供更多的信息

答案：D

26.对巨幼细胞贫血者应选用（）

A: 维生素 K1

B: 甲磺酸去铁胺

C: 叶酸+维生素 B12

D: 富马酸亚铁

答案：C

27.属于非麻醉性镇咳药的是

A: 沙丁胺醇

B: 苯丙哌林

C: 羟甲唑啉

D: 羧甲司坦

答案：B

28.依据 CTP 评分，肝功能不全 B 级病人用药剂量为正常患者剂量的

A: 25%维持剂量

B: 30%维持剂量

C: 50%维持剂量

D: 40%维持剂量

答案：A

29.对某些患者应教会正确量取内服液体制剂，是针对

A: 交代药物的用量

B：交代药品贮存条件与方法

C：交代用药注意事项

D：交代用药途径及用药方法

答案：A

30.一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

A：涂片、培养鉴定

B：临床治疗方案

C：临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

D：药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

答案：B

31.一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

A：血浆蛋白结合率高的药物

B：分子量大于500的药物

C：分布容积小的药物

D：低水溶性的药物

答案：C

32.除全身症状外，尚有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状

A：胃肠型

B：肺炎型

C：神经型

D：病毒型

答案：A

33.新生儿肾脏有效循环血量及肾小球滤过率较成人低

A：30%～40%

B：40%～50%

C：20%～30%

D：10%～20%

答案：A

34.患者男,65岁,身高170cm,体重60kg,经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率45ml/min),诊断为2型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是

A：格列齐特

B：格列喹酮

C：格列吡嗪

D：格列本脲

答案：B

35.长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

A：地西泮

B：谷维素

C：阿司匹林

D：罗通定

答案：A

36.患者，男，42岁，近期出现烧心（胃灼热）、咳嗽、胸痛症状，疑似胃食管反流病。可作为胃食管反流病的初步诊断方法是给予1～2周、每日2次标准剂量的

A：硝酸甘油

B：西咪替丁

C：艾司奥美拉唑

D：阿司匹林

答案：C

37.（2017年真题）因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是（）

A: 甲睾酮

B: 可卡因

C: 人促红素

D: 哌替啶

答案：C

38.头痛伴恶心且一侧瞳孔改变，提示可能有

A: 脑膜炎

B: 脑血管意外

C: 动脉瘤

D: 脑肿瘤

答案：C

39.由于上市后风险评估，发现其大剂量服用可使患者罹患心肌梗死和心脏猝死的危险增加，从而导致全球撤市的药物是

A: 阿糖胞苷儿科事件

B: 罗非昔布

C: 西立伐他汀

D: 仙牛健骨颗粒

答案：B

40.服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

A: 24小时

B: 4 小时

C: 48 小时

D: 1 周

答案：B

41.可帮助人短时间内急速降低体重

A: 肽激素类

B: 利尿剂

C: 蛋白同化制剂

D: 麻醉药品

答案：B

42.不宜与 5-羟色胺再摄取抑制剂合用的抗震颤麻痹药是

A: 苯海索

B: 复方左旋多巴

C: 金刚烷胺

D: 司来吉兰

答案：D

43.更年期综合征最具特征性的症状为

A: 心悸、胸闷不适

B: 月经周期延长，经量减少，最后绝经

C: 阴道萎缩

D: 潮热、出汗

答案：D

44.在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

A: 尿沉渣管型

B：尿沉渣白细胞

C：尿沉渣磷酸盐结晶

D：尿沉渣结晶

答案：A

45.患者，女，35岁，因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药，药师应推荐的药品是()

A：对乙酰氨基酚片

B：酚麻美敏片

C：氯苯那敏片

D：萘甲唑啉滴鼻液

答案：B

46.（2018年真题）患者，女，48岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是（）

A：甲氧氯普胺片

B：酵母片

C：多潘立酮片

D：乳酶生片

答案：D

47.患者术后，给予肠外营养液10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳250ml、8．5%复方氨基酸750ml、水溶性维生素10ml、脂溶性维生素10ml、微量元素10ml、10%氯化钠注射液40ml、10%氯化钾注射液30ml

A：200kcal

B：450kcal

C：700kcal

D: 1150kcal

答案：B

48.审核发现用药失误的处方，药师应该

A: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告

B: 依照此处方调配药品、发出药品

C: 拒绝调配此处方

D: 修改、调配此处方并发出药品

答案：A

49.患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 氟伐他汀

B: 左旋氨氯地平

C: 雷米普利

D: 比索洛尔

答案：C

50.可出现锥体外系反应的是

A: 苯二氮

B: 甲氧氯普胺

C: 哌替啶

D: 双嘧达莫

答案：B

51.（2017年真题）下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是（）

A: 避免使用含碘药物

B: 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者宜选甲巯咪唑

C：禁食富含碘的食物

D：避免饮用咖啡等兴奋性饮料

答案：B

52.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A：依地酸钙钠

B：二巯丁二钠

C：二巯丙醇

D：青霉胺

答案：C

53.患者,男,64岁,为缓解剧烈癌痛,同时使用5片芬太尼透皮贴剂后,出现呼吸抑制,可选用的解救药物是()

A：氟马西尼

B：亚甲蓝

C：纳洛酮

D：二巯丙醇

答案：C

54.氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用的机制是

A：减少不良反应

B：协同作用

C：拮抗作用

D：敏感化作用

答案：C

55.患者，女，60岁。现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理：因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度：L1-4椎体T值一2.7SD，BMD749（mg/cm2）；股骨颈T值一2．2SD，BMD602（mg/cm2）。医生诊断：绝经后骨质疏松症。

A: 钙制剂

B: 氟制剂

C: 甲状旁腺素

D: 双膦酸盐

答案：D

56.孕妇服用过量可诱发新生儿产生坏血病的药品是

A: 维生素C片

B: 复合维生素B片

C: 维生素AD复方制剂

D: 维生素A片

答案：A

57.能使鼻黏膜血管收缩，减轻充血，缓解鼻塞

A: 氯雷他定片

B: 泼尼松片

C: 孟鲁司特钠片

D: 萘甲唑林滴鼻液

答案：D

58.以下医学检查项目中，主要用于诊断急性胰腺炎的是

A: 淀粉酶增高

B: 肌酸激酶增高

C: 尿淀粉酶

D: 血淀粉酶

答案：A

59.药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致血清总胆固醇升高的药物是

A: 苯妥英钠

B: 胰岛素

C: 阿司匹林

D: 氯氮平

答案：D

60.某患者，女，27岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁3个月。血FT

A: 血压

B: 心率

C: 白细胞

D: 体重

答案：A

61.下述药物中，具有肝药酶抑制作用的是

A: 苯巴比妥

B: 西咪替丁

C: 卡马西平

D: 利托那韦

答案：B

62.患者，女，48岁，身高158cm，体重72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清TSH水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: 初始治疗宜采用最小剂量

B: 与消胆胺同服，可增强疗效

C: 早餐前60min，空腹，1日1次

D: 可降低降糖药疗效

答案：B

63.摄入过多可增加体内血容量，促发充血性心力衰竭或高血压的是

A: 酒

B: 脂肪

C: 食盐

D: 食醋

答案：C

64.下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是

A: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用经双通道（肝、肾）消除的药物

B: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠以碱化尿液，促进药物排泄。防止药源性疾病

C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

D: 肾功能不全者首选经肝胆代谢和排泄的药物

答案：B

65.患者,女,30岁,妊娠7个月,既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧,发痒、分泌物多,有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状,疗效较好,今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是()

A: 酞丁安滴眼液

B: 利巴韦林滴眼液

C: 磺胺醋酰钠滴眼液

D: 硫酸锌滴眼液

答案：D

66.钙通道阻滞剂

A: 氢氯噻嗪

B: 缬沙坦

C: 氨氯地平

D: 依那普利

答案：C

67.患者,女,47岁,出现一侧颜面部骤然发作性闪痛,诊断为三叉神经痛,应选用的药物是()

A: 布洛芬

B: 麦角胺咖啡因

C: 卡马西平

D: 山莨菪碱

答案：C

68.患者，女，33岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

A: 外阴阴道假丝酵母菌病

B：输卵管炎

C：细菌性阴道病

D: 急性尿道炎

答案：C

69.临床上治疗焦虑症应用最广泛的药物为

A: 氟伏沙明

B: 阿米替林

C: 舍曲林

D: 帕罗西汀

答案：D

70.在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞(DC)的正常比例范围是

A: 0.03～0.08

B: 0.01～0.05

C: 0.20～0.40

D: 0.50～0.70

答案：D

71.既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

A: 阿米替林

B: 丙咪嗪

C: 氟伏沙明

D: 帕罗西汀

答案：C

72.从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是()

A: 伪麻黄碱

B: 布洛芬

C: 对乙酰氨基酚

D: 氯苯那敏

答案：D

73.（2015年真题）患者，女，51岁，体检时发现血压160/105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol/L（参考范围＜7.8mmol/L），甘油三酯1.52mmol/L（参考范围0.56~1.70mmol/L），总胆固醇6.26mmol/L（参考范围＜5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol/L（参考范围2.1~3.1mmol/L），高密度脂蛋白胆固醇1.20mmol/L（参考范围1.2~1.65mmol/L，肌酐60μmol/L（参考范围45~84μmol/L），蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 减少脂肪摄入

B: 适当运动

C: 不必限盐

D: 控制体重

答案：C

74.可引起血清总蛋白降低的是

A: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

B: 各种原因脱水所致的血液浓缩

C: 摄入不足、消化不良时

D: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

答案：C

75.（2016年真题）患者，女，62岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖，今日来院复诊，欲了解近三个月的血糖总体控制情况，应检测的指标是（）。

A: 血红蛋白

B: 空腹血糖

C: 糖化血红蛋白

D: 餐后2小时血糖

答案：C

76. Ⅱ期临床试验很难发现"低于1%发生频率"的不良反应，缘于

A: 考察不全面

B: 观察时间短

C: 管理漏洞

D: 病例数目少

答案：D

77. 人体正常体温的标准是直肠温度不超过

A: 37.2℃

B: 36.6℃

C: 37.6℃

D: 36.9

答案：C

78. 患者，女，62岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近3个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

A: 尿胆红素

B: 餐后2小时血糖

C: 空腹血糖

D: 糖化血红蛋白

答案：D

79. 药师日常承接的用药咨询以何种方式居多

A: 主动方式
B: 质问方式
C: 被动方式
D: 指令方式
答案：C

80.成人静脉血白细胞计数的正常范围值
A: （3.5～10.0）×109/L
B: （15.0～20.0）×109/L
C: （11.0～12.0）×109/L
D: （10.0～20.0）×109/L
答案：A

81.(常用的特殊解毒剂的适应证)，急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂
A: 谷胱甘肽
B: 乙酰半胱氨酸
C: 二巯丁二钠
D: 纳洛酮
答案：D

82.用药剂量相同，妊娠期的血药浓度低于非妊娠期，是由于
A: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢
B: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多
C: 妊娠期药物分布容积明显增加
D: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低
答案：C

83.（2021年真题）患者，女，31岁，1个月前顺一健康男婴。近2周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

A：应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药

B：氟西汀应于每日早餐后服用

C：向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加

D：为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善1个月后逐渐减量,直至停药

答案：D

84.提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

A：确认的信号

B：部分确认信号

C：尚不确定的信号

D：驳倒的信号

答案：A

85.起效快，抗焦虑作用强，对急性期焦虑患者可考虑短期使用的治疗药是

A：加兰他敏

B：丁螺环酮

C：苯海索

D：地西泮

答案：D

86.医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释OS．是指

A: 立即

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/028052124043007022