传染病试题与参考答案

一、单选题（共100题，　每题1分，　共100分）

1、根据《中华人民共和国传染病防治法》，霍乱属千何种传染病

A、强制管理传染病

B、到 2000 年消灭的传染病

C、监测管理传染病

D、严格管理传染病

E、限期控制的传染病

正确答案：A

2、乙脑病毒感染人体后，大多数人表现为

A、显性感染

B、病原体被清除

C、带菌者

D、隐性感染

E、潜伏性感染

正确答案：D

3、HIV侵入人体后，导致机体细胞免疫功能低下，是因为最主要损害了

A、库普弗细胞

B、B淋巴细胞

C、CD4+ T淋巴细胞

D、CD8+ T淋巴细胞

E、NK细胞

正确答案：C

4、关于肥达反应，错误的是

A、属直接凝集反应.

B、通常在发病1周后阳性

C、肥达反应阳性不能确诊

D、属补体结合试验

E、3〞4 周阳性率达 70%

正确答案：D

5、关千少尿期的肾综合征出血热患者，　下列化验结果中，可能直接危及患者生命的是

A、血清钾7　.6mmol/L

B、血尿素氮45mmol/L

C、血小板计数 54x109/L

D、血浆二 氧化碳结合力 22mmol/L

E、血清钙总量 1. 1mmol/L

正确答案：A

6、回有部可见边缘不整口小底力样溃疡

A、伤寒肠出血

B、 出血热肠出血

C、结核杆菌感染

D、阿米巴痢疾

E、肠炭疽

正确答案：D

7、对乙型肝炎抗病毒治疗的理解，不包括

A、是一个艰难而长期的过程

B、可以 联合用药，如干扰索、贺普丁、 中药

C、 改善临床症状

D、抑制病毒复制

E、完全清 除HBV， 包括HBsAg

正确答案：E

8、对菌痢而言正确的是

A、腹泻次数越多 ，病情越严重

B、体温越高，病情越严重

C、里急后重越明显病情越严重

D、越快出现休克病情越严重

E、血液中性粒细胞越多，病情越严重

正确答案：D

9、流脑的主要传染源是

A、隐 性感染者

B、 患者

C、潜在性感染者

D、受感染的动物

E、带菌者

正确答案：E

10、乙脑流行呈散发性最主要的原因是

A、 乙脑有严格季节性

B、蚊虫分布不均

C、患者得到了早期隔离与治疗

D、隐性感染多

E、家禽及猪分散饲养

正确答案：D

11、对乙脑有早期诊断价值的检测是

A、补体结合抗体

B、血凝抑制抗体

C、Vi抗体

D、特异性IgM抗体

E、中和抗体

正确答案：D

12、流行性出血热表现为

A、千病程 3～6 日出现，为斑丘疹或麻疹样皮疹，也有猩红热样皮疹，红色班疹分布千全身 、四肢、躯干和头面部，多有痒感，皮疹持续 5～8.疹退后无脱屑及色素沉着

B、皮疹初为稀疏淡红色班丘疹，直径2～4mm ，逐渐皮疹增多，融合呈卵圆形或不规则形，疹间可见正常皮肤

C、在病程 4～6 天出现多形性皮疹，为淡红色斑丘疹，多见千躯干部,1 周内隐退，无脱屑

D、起病后 2～3 日软聘充血明显，有多数细小出血点。 两胶下。上胸部、颈部、肩部等处皮肤有散在 、族状或搓抓状、索条样的淤点或淤斑

E、皮疹常呈椭圆形，3～Smm ，周围有红晕，疤疹浅表易破，皮疹星向心性分布，躯干最多

正确答案：D

13、长期发热脾大，粒细胞减少，骨髓培并有伤寒杆菌生长，最可能为

A、确诊伤寒患者

B、伤寒带菌者

C、伤寒病复发

D、支持临床诊 断伤寒

E、斑疹伤寒

正确答案：A

14、患者，男,23 岁，工人。以往有青霉素过敏史。10 天前发热， 腹痛，呕吐，腹泻。2～3 天后以 上症状减轻，而热度逐渐升高，3 天来持续高热。

T 39. 5*C， P 80/min, 肝肋下 2cm ，脾未触及。血分 析：WBC2x 109/L ，中性粒细胞 50%, 嗜酸细胞 0%’肥达反应 ""0""1:80, "H ""1: 320 。目前治疗应 首选以下哪种药

A、氨霉袁

B、SMZco

C、氨茉西林

D、诺氪沙星

E、红霉素

正确答案：D

15、关千乙脑的传染源下列哪项是错误的

A、乙脑是-种自然疫源性疾病，人和动物均可成为传染源

B、吸血编蝠可成为乙脑的传染源和长期储存宿主

C、 患者和隐性感染者是乙脑的重要传染源

D、家畜亦可为乙脑的重要传染源

E、猪为乙脑的主要传染源

正确答案：C

16、传染性单核细胞增各症

A、EB病毒

B、腮腺炎病毒

C、。普氏立克次体

D、B 溶血性链球菌

E、登革热病毒

正确答案：A

17、菌痢的主要传播途径是

A、性传播

B、粪—口传播

C、虫媒传播

D、血液传播

E、母婴传播

正确答案：B

18、关千细菌性痢疾的病理改变叙述错误的是

A、结肠黏膜可覆盖灰白色假膜

B、病变可导致肠穿孔

C、 乙状结肠和直肠病变最显著

D、细菌性痢疾的肠道病变主要在结肠

E、急性期病变为弥漫性纤维蛋白渗出性炎症

正确答案：B

19、对出血热来说下列 错误的是

A、是自然疫源性疾病

B、野生鼠类是主要传染源

C、青壮年男性发病较高

D、高血容量多发生千少尿期

E、出血热的发病原理和基本病变是 DIC

正确答案：E

20、患者，男，20 岁。昨日进食海产品，今日开始较频繁腹泻，水样便继之呕吐，但无腹痛，不发热，口渴，排肠肌疼痛。 查体： T36°C，BP60/40mmHg ，脱水，呼吸平稳心肺正常，腹平软 无压痛 四肢微凉。血象 WBC20. 0x109/L，粪便镜检： WBC0～2/HP。抢救该患者，最紧急措施是

A、大量补液

B、抗生素

C、给升压药

D、给止泻药

E、始氢化可的松静滴

正确答案：A

21、肾综合征出血热的主要病理变化是

A、 胃间质充血水肿及炎性细胞浸润

B、血管和淋巴内皮细胞损伤及出血

C、 肾内形成免疫复合物

D、小血管炎及周围炎性细胞浸润

E、全身小血管和毛细血管广泛性损害

正确答案：E

22、伤寒患者的确诊依据是

A、发热 1～2 周， 伴有消化道症状。肝脾大

B、大便培养 阳性

C、血或骨髓培养 阳性

D、肥达反应阳性

E、 臼细胞计数减少，嗜酸性粒细胞减少或消失

正确答案：A

23、艾滋病患者常见的继发肿瘤是

A、肝癌

B、卡氏肉瘤

C、肺癌

D、结肠癌

E、鼻咽癌

正确答案：B

24、痢疾杆菌的主要致病因素是

A、外毒素

B、神经毒素

C、肠毒素

D、吞入细菌数量

E、侵袭力和内毒素

正确答案：E

25、无发热及不适症状，十二指肠引流液培养伤寒杆菌阳性的是

A、斑疹伤寒

B、确诊伤寒患者

C、支持临床诊 断伤寒

D、伤寒病复发

E、伤寒带菌者

正确答案：E

26、流行性乙型脑炎时，病变的主要部位是

A、大脑灰质

B、软脑膜

C、脑皮质

D、大脑皮质及基底节、丘脑

E、小脑

正确答案：D

27、汉坦病毒

A、生活能力较弱不耐高温，不能在痂皮 中存活，易被消毒剂灭活。但能在痂疹液中— 65℃ 下存活8 年

B、在体外抵抗力较强，在— 20C 条件下保存数年，其传染性不变，能耐受56℃30 分钟的温度及 pH 3 的酸度；加热煮沸 (100℃)5 分钟或干热

160C20 分钟，紫外线照射 1小时，氯 1mg/L 30 分钟或甲醋(1 :4000) 37 *C 72小 时均可使之灭活

C、在体外抵抗力很强，紫外线照射，加热60°C 4 小时及 -般浓度的化学消毒剂（如苹酚，硫柳采等）均不能之灭活，在干燥或冰冻环境下能生存数月到数年，加热60°C 持续 10小时，煮沸(100-C ） 10分钟，高压蒸汽 122° C 10分钟或过氧乙酸 (0. 5%） 7.5分钟以上则可以灭活

D、对外界抵抗力较弱，加热 56° C 30 分钟和 一 般消毒剂如 0. 5% 次氨酸钠，5% 甲醒、70% 乙醇2%戊二醒等均可灭活，但 对紫外线不敏感

E、对脂溶剂很敏感易被紫外线及y射线灭活， -般消毒剂（磺酒 酒精、福尔马林等）均可将病毒杀灭

正确答案：E

28、为防止伤寒病的地区性流行，在当地采取哪项措施是不正确的

A、突击消灭苍蝇

B、集体预防服药

C、隔离患者

D、给易感染者注射伤寒疫苗

E、加强粪便管理

正确答案：B

29、 患者，女,34 岁。发热 1 周，以午后为高体温 38. 5° C左右， 上午在 37. 5% C左右，伴食欲不佳 、腹胀、恶心。外周血臼细胞偏低 。按 “上呼吸道感染 ” 处理，但未见疗效，疑似//伤寒 '。"以下化验，最简便而阳性率最高的是

A、血培养.

B、尿培养

C、大便培养

D、骨髓培养

E、肥达氏反应

正确答案：A

30、 乙脑病毒入侵人体后引起发病的有关因素，应除外

A、血脑屏障的健全情况

B、机体防御功能

C、病毒的毒力

D、感染病毒的数量

E、蚊叮咬部位

正确答案：E

31、我国目前发病率最高

A、痢疾志贺菌

B、罗氏志贺菌

C、福氏志贺菌

D、鲍氏志贺菌

E、宋内志贺菌

正确答案：C

32、白喉病原治疗首选药为

A、环丙沙星

B、青毒素

C、红霉素

D、链霉素

E、氨苯青霉袁

正确答案：B

33、流行性乙型脑炎时，不会产生哪项病变

A、脑膜充血水肿

B、脑脊液形成脓液

C、脑内胶质细胞增生

D、脑软化灶形成

E、神经细胞坏死

正确答案：B

34、对千急性重症型肝炎最有诊断意义的临床症状是

A、明显出血症状

B、黄疸迅速加深

C、高度乏力.恶心、呕吐

D、肝浊音界缩小

E、神经、精神症状出现

正确答案：E

35、一位发热5日的患者，疑为伤寒。为确诊，应首选的检查是

A、肥达反应

B、血培养

C、尿培养

D、便培养

E、血细胞计数及分关

正确答案：B

36、 乙脑极期的临床表现中，应除外

A、意识障碍

B、惊厥与抽插

C、呼吸衰竭以中枢性为主

D、病程早期休克

E、稽留高热或弛张型发热

正确答案：D

37、伤寒的典型临床表现是

A、 中长程稽留高热、 肝脾肿大、周围血象不高、肥达反应 ″H ″、,,O″均升高

B、午后低热，肝牌肿大，周围血象不高肥达反应阳性

C、长程弛张热肝脾不大，周围血象细胞总数 中性粒细胞升高，肥达反应 ″H ″升高

D、长程间歌高热、肝脾肿大，全血细胞减少，消化道出血

E、长程间歌寒战、 高热肝脾肿大，周围血象正常，重度贫血，肥达反应阴性

正确答案：A

38、关千甲型肝炎的诊断，哪一说法是错误的

A、临床症状＋抗-HAV-IgM 阳性可确诊为甲型肝炎

B、临床症状＋大便分离出 HAV 可确诊为甲型肝炎

C、临床症状＋抗-HAV升高4倍 可确诊为甲型肝炎

D、抗-HAV-IgM阴性不可排 除甲型肝炎

E、单次甲肝抗体 阳性即可确认甲型肝炎

正确答案：E

39、为尽快明确霍乱病例的诊断，应检测

A、大便培养

B、大便悬滴及制动试验

C、大便常规

D、大便涂片找细菌

E、大便检测特异性抗原

正确答案：B

40、EB病毒为

A、单股负链 RNA

B、部分双链，部分单链的环状DNA

C、单股 RNA

D、双股 DNA

E、单股 DNA

正确答案：D

41、血管通透性 增加，血浆外渗所教的是

A、 中毒性菌痢休克

B、霍乱 / 副霍乱休克

C、流脑暴发型休克

D、伤寒发生休克

E、流行性出血热休克

正确答案：E

42、被带有 HBsAg 阳性血污染的针头刺破手指时，最重要的措施为

A、过 氧乙酸泡手

B、局部擦礁酒消毒

C、肌肉注射乙型肝炎疫苗

D、肌肉注射乙型肝炎免疫球蛋白

E、肌肉注射丙种球蛋白

正确答案：D

43、 对千伤寒患者病后获得的免疫力，说法不对的是

A、免疫与血清中,,O″ 抗体有关

B、少有第 2 次发病者

C、免疫与血清中 ″vi″抗体无关

D、病后免疫力持久

E、免疫与血清中″H″ 抗体无关

正确答案：A

44、HBV 基因组前 C 区 1896 位发生突变，形成终止密码子，导致( )

A、不能产生 HBsAg

B、不能产生 HBeAg

C、不能产生 HBcAg

D、不能产生 HBV DNA

E、乙肝病毒消失

正确答案：B

45、流脑病原治疗 首选

A、氨每素

B、青霉素

C、磺胺

D、头袍菌素

E、无特殊治疗

正确答案：B

46、患者，男,60 岁。千 8月 6 日早上开始发热，体溫1°C ,傍晚时开始持续抽擂并迅速发生深度昏迷，瞳孔忽大忽小，呈叹息样呼吸，既往有糖尿病病史。化验乙脑特异性 IgM 抗体阳性。目前诊断应属千下列哪一一型

A、轻型

B、普通型

C、重型

D、极重型

E、非典型

正确答案：D

47、患者，男,40 岁。发热 20余 日，腹泻 2 〞4 次 /日，体温 38 〞39°C。查体：脉搏80 次/min ，肝脾大。血常规示臼细胞 2.5x109/L。肥达反应 01:80,H 1: 106, 1 周后复查，01:160,H 1:320。肝功：ALT 300U/L。尿（＋）。 抗-HBc(+) ，抗HBs(+) 。该患者最可能的诊断是

A、钩端螺旋体病

B、流行性出血热

C、乙型病毒性肝炎

D、症疾

E、伤寒合并中毒性肝炎

正确答案：E

48、有关乙脑的概念，下列哪项是不正确的

A、人对乙脑病毒普遍易感 ，感染后多为潜伏性感染

B、传染源是患者、家畜、家禽

C、蚊虫既是传播媒介，又是乙脑病毒的长期储存宿主

D、猪作为传染源的意义比人重要

E、乙脑是自然疫源性疾病

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028054021025007005