

普外科考试题及答案

1、下列哪项不符合小儿急性阑尾炎的临床特点()

- A、有右下腹明显压痛和肌紧张的典型体征
- B、病情发展快且较重，早期即出现高热、呕吐等症状
- C、穿孔率可达 30%
- D、并发症和死亡率较高
- E、治疗原则是早期手术

答案：A

2、老年人急性阑尾炎的临床特点是()

- A、阑尾容易缺血、坏死
- B、腹痛、恶心明显
- C、常有寒战、高热
- D、右下腹压痛明显
- E、显著腹肌紧张

答案：A

3、女性，18 岁，甲状腺弥漫性肿大。无突眼，甲状腺摄碘试验：2 小时 25%，24 小时 50%。清晨空腹测定脉搏 70 次/分。血压 16/10kPa(120/80mmHg)，SPECT 检查甲状腺无结节，最可能的诊断是()

- A、甲状腺功能减退
- B、甲状腺功能亢进
- C、甲状腺炎
- D、单纯性甲状腺肿
- E、结节性甲状腺肿

答案：D

4、对上消化道大出血最有价值的诊断方法是哪项()

- A、临床观察判定
- B、吞少量稀钡检查
- C、红细胞比容测定
- D、凝血因子的检查
- E、急诊胃镜检查

答案：E

5、最常见的肠梗阻是()

- A、肠扭转
- B、嵌顿疝
- C、粘连性肠梗阻

D、蛔虫性肠梗阻

E、绞窄性肠梗阻

答案：C

6、肝破裂的主要表现是(闭合性)()

A、肝区疼痛

B、上腹部外伤史

C、出血性休克

D、腹膜刺激征

E、胆道出血

答案：C

7、肛瘘治疗最佳的方法是()

A、局部换药

B、瘘道切除

C、抗生素

D、挂线疗法

E、温水坐浴

答案：D

8、关于处理门静脉高压症并发上消化道大出血，哪一项是不恰当的()

A、对有黄疸、腹水病人宜选用脾切除加大网膜腹膜后固定术

B、对年轻且肝功能良好者，可选用急症分流术

C、对有黄疸病人，宜行三腔双囊管处理

D、切开胃前壁，缝扎曲张静脉法止血效果不确切

E、贲门周围血管离断术，可收到立即止血效果

答案：A

9、随月经周期疼痛的乳腺肿块可能是()

A、乳腺癌

B、导管内乳头状瘤

C、乳房囊性增生病

D、乳腺纤维腺瘤

E、乳房脂肪坏死

答案：C

10、女性，45岁，脐周痛12小时伴恶心，呕吐，吐物为胃内容，量少，2小时前扩散至全腹痛，右下腹部压痛，反跳痛，腹肌紧张，以右下腹为著，结肠充气试验(+)，白细胞数 $26 \times 10^9/L$ ，应考虑()

A、急性胰腺炎

- B、急性胆囊炎
- C、右输尿管结石
- D、右输卵管妊娠破裂
- E、急性阑尾炎穿孔

答案：E

11、男性，62岁，十二指肠球部溃疡出血，行旷置式胃大部切除术，术后当晚，胃管流出大量鲜血，血压下降。心率加快，出血原因可能是()

- A、吻合口出血
- B、小弯侧胃断端出血
- C、旷置的十二指肠溃疡出血
- D、术后残胃出血
- E、血小板减少引起出血

答案：C

12、腹部闭合性损伤诊断的关键在于确定有无()

- A、休克
- B、内脏损伤
- C、腹壁损伤
- D、腹膜后血肿
- E、颅脑损伤

答案：B

13、男性，36岁，半年来，时有腹泻与便秘，3个月来腹部有隐痛，近两天大量便鲜血，直肠指诊和腹部触诊没有发现异常。X线钡透检查见，距肛门约25cm处肠腔有约4.0cm，充盈缺损，近端肠腔有扩张，诊断应考虑为()

- A、直肠壶腹癌
- B、升结肠结核
- C、乙状结肠癌
- D、降结肠结核
- E、溃疡性结肠炎

答案：C

14、女性，27岁，发现甲状腺结节3个月，近1个月来出现Horner综合征，喉镜检查发现右侧声带麻痹。最可能的诊断是()

- A、重度甲亢
- B、甲状腺腺瘤并发囊内出血
- C、结节性甲状腺肿恶变
- D、桥本氏甲状腺炎

E、甲状腺癌

答案：E

15、26岁女性，左乳房外上象限内3cm圆形光滑肿块已8个月，质韧，活动佳，可能为()

A、早期乳癌

B、纤维腺瘤

C、柏哲乳头病

D、乳房囊性增生病

E、结核

答案：B

16、中老年妇女，一侧乳房内单一无症状包块，对侧阴性。最可能的诊断是()

A、乳房囊性增生病

B、纤维腺瘤

C、乳房结核

D、乳癌

E、积乳囊肿

答案：D

17、肠梗阻诊断明确后，最重要的是确定()

A、梗阻的程度

B、梗阻的部位

C、梗阻的原因

D、梗阻是否引起肠绞窄

E、梗阻的发生速度

答案：D

18、在判断甲状腺结节良恶性时，下列哪项不正确?()

A、单发结节恶性机会较多发结节大

B、囊性结节也可能是恶性的

C、“冷结节”都是恶性的

D、实性结节的恶性率较高

E、儿童单发结节的恶性机会较大

答案：C

19、男性，40岁，反复呕血1周，每次呕血量约500ml，无溃疡病及肝炎史，为明确出血原因应选用何种检查()

A、X线钡餐检查

- B、选择性腹腔动脉造影
- C、纤维胃镜
- D、三腔双囊管
- E、血液学检查

答案：C

20、胆囊动脉多源于()

- A、肝左动脉
- B、肝固有动脉
- C、胃十二指肠动脉
- D、肝右动脉
- E、胃右动脉

答案：D

21、男性，24岁，下腹部被重物击伤6小时，持续腹痛伴呕吐，全腹明显压痛、反跳痛及肌紧张，肠鸣音消失，最可能的诊断是()

- A、肝破裂
- B、脾破裂
- C、腹壁挫伤
- D、肠管破裂
- E、腹壁后血肿

答案：D

22、男性，49岁，胃窦部巨大溃疡直径2cm经内科治疗4周无效，拟行手术，首选手术方式为()

- A、胃大部切除术，Billroth I式
- B、胃大部切除术，Billroth II式
- C、高选择性迷走神经切断术
- D、全胃切除术
- E、胃楔形切除术

答案：A

23、左右半肝划分的标志为()

- A、镰状韧带
- B、门静脉
- C、肝总管
- D、下腔静脉右缘至胆囊中部
- E、下腔静脉左缘至胆囊中部

答案：E

24、腹股沟斜疝与直疝的区别要点，错误的是()

- A、突出部位和路径
- B、形状
- C、与阴囊关系
- D、嵌顿发生机率
- E、透光试验

答案：E

25、腹部闭合性损伤，腹痛，烦躁，口渴，血压下降，诊断尚未确定，应给予处理是()

- A、吗啡止痛
- B、给水止渴
- C、鲁米那镇静
- D、扶持患者去放射线科透视
- E、以上都不对

答案：E

26、急性阑尾炎的主要症状()

- A、恶心呕吐
- B、低热
- C、转移性右下腹痛
- D、便秘
- E、食欲减退

答案：C

27、患者，男，45岁，上腹痛4天伴恶心，呕吐，吐少量胃内容物。查体上腹部压痛，巩膜可疑黄染，体温38℃，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶值64温氏单位，尿淀粉酶326温氏单位，可考虑为()

- A、急性胰腺炎
- B、急性胆囊炎
- C、急性胆管炎
- D、急性肠系膜淋巴结炎
- E、溃疡病穿孔

答案：A

28、女，50岁。大便带血3个月，排便有下坠感，里急后重，直肠镜检查距肛门10cm处3cm×3cm肿块，菜花状，质脆，易出血，病理诊断直肠腺癌。若选择手术，最佳术式为()

- A、经腹会阴直肠癌根治术

- B、经腹直肠癌切除术
- C、经腹直肠癌切除、人工肛门、远端封闭手术
- D、拉下式直肠癌切除术
- E、局部切除加放疗术

答案：B

29、男性，50岁，上腹不适，食欲不振三个月。一个月来出现黄疸进行性加重，有体重减轻，全身明显黄染，肝未触及，深吸气时可触到肿大胆囊底部，无触痛。化验血胆红素15mg/dl，尿检胆红素阳性。最可能是()

- A、肝炎
- B、胆石症
- C、胰头癌
- D、慢性胰腺炎
- E、肝癌

答案：C

30、出血坏死型胰腺炎最常见的并发症是()

- A、化脓性腹膜炎
- B、败血症
- C、消化道出血
- D、胰周围脓肿
- E、休克

答案：E

31、毕I式与毕II式胃大部分切除术的主要区别是()

- A、切断十二指肠
- B、切除胃的多少
- C、胃肠吻合口的部位
- D、近端空肠与胃小弯的关系
- E、结肠前或结肠后胃肠吻合

答案：C

32、直肠肛管交界的齿状线在临床上的重要性是()

- A、齿线上的直肠有神经反射弧
- B、齿状线上的直肠易受感染
- C、齿状线上下血液供应、神经、淋巴引流各异
- D、齿状线、肛管容易受伤
- E、齿状线下是外括约肌所在部位

答案：C

33、腹部空腔脏器破裂最主要的临床表现是()

- A、胃肠道症状
- B、腹膜刺激征
- C、全身感染症状
- D、气腹征
- E、肠麻痹

答案：B

34、女性，40岁，因右侧甲状腺单发肿物，颈部淋巴结无肿大，施行甲状腺肿物摘除术，病理报告为甲状腺乳头状腺癌，术后5天拆线。拆线后还应对病人作如下哪种处理()

- A、口服碘剂
- B、口服甲状腺片
- C、再次手术清除患侧淋巴结
- D、再次手术将患侧腺体连同峡部全切除，对侧腺体大部切除
- E、颈部放射治疗

答案：D

35、女性，54岁，诊断为急性坏疽性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎入院，行阑尾切除术。术后第5天腹胀、腹痛、发热，体温39℃，大便4~6次/日，呈水样。肛门有下坠感，腹部有轻压痛，未触及肿块。首先应考虑并发症是()

- A、急性肠炎
- B、阑尾残株炎
- C、门静脉炎
- D、肠间隙脓肿
- E、盆腔脓肿

答案：E

36、腹部最易受损的空腔脏器是()

- A、胃
- B、小肠
- C、结肠
- D、十二指肠
- E、直肠

答案：B

37、急性胰腺炎时，血清淀粉酶变化的特点，下列哪项不正确()

- A、发病24小时内即可被测得
- B、淀粉酶 $>500\text{U/dl}$ 索氏法可诊断

- C、尿淀粉酶升高持续时间比血淀粉酶长
- D、淀粉酶值的高低与病变程度成正比
- E、淀粉酶的测值越高，诊断的准确率也越高

答案：D

38、男，40岁。4年前行阑尾切除术，昨日突然出现右下腹部阵发性绞痛，伴恶心，呕吐。排便停止。见腹部膨隆，肛门指诊检查阴性，X线立位平片可见多个液平面，血红蛋白110g/L，Na⁺125mmol/L，上述疾病诊断的主要依据是()

- A、典型临床表现
- B、腹部检查见肠型及蠕动波
- C、化验检查电解质改变明显
- D、肛门指诊检查阴性
- E、X线立位片可见多个液气面

答案：E

39、肛管直肠疾病哪一种可发生恶性变()

- A、肛裂
- B、嵌顿性内痔
- C、肛窦炎
- D、直肠息肉
- E、高位肛瘘

答案：D

40、腹部闭合性损伤最常见的脏器是()

- A、肝
- B、肾
- C、脾
- D、结肠
- E、胰腺

答案：C

41、黄疸病人合并肿大而无触痛的胆囊时，最可能是()

- A、急性胆囊炎
- B、慢性胆囊炎、胆囊积水
- C、胆囊颈部结石嵌顿
- D、中下段胆管癌
- E、胆总管下段结石

答案：D

42、最多见的直肠肛管周围脓肿是()

- A、肛门周围脓肿
- B、坐骨直肠窝脓肿
- C、骨盆直肠窝脓肿
- D、直肠后间隙脓肿
- E、直肠粘膜下脓肿

答案：A

43、术中偶然发现一侧甲状腺内有 0.5cm 的癌灶，冰冻切片证实为乳头状腺癌，未浸润包膜，最适宜的治疗方案为()

- A、病侧腺叶切除加峡部切除
- B、病侧腺叶大部切除
- C、病侧腺叶切除加同侧颈淋巴结清扫
- D、病侧腺叶切除加峡部切除加对侧腺叶大部切除
- E、双侧腺叶次全切除

答案：D

44、男性，42岁，丰盛酒宴饱餐后。上腹剧痛，伴恶心，呕吐，吐物为胃内容物，吐后腹痛更加剧，如刀割样，注射阿托品，痛不止，已6小时。体检：脉搏124次/分，血压80/50mmHg，痛苦容貌，腹胀，全腹肌紧张，压痛及反跳痛，上腹部为重，肠鸣音消失，肝浊音界存在，右下腹穿刺得淡红色血性液体，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶320单位(温氏法)，血钙 $1.5mmol/L(6mg/dl)$ ，经3小时治疗观察，病情无好转，诊断应考虑为()

- A、溃疡病穿孔，弥漫性腹膜炎
- B、胆囊穿孔，弥漫性腹膜炎
- C、急性胃炎
- D、急性出血坏死性胰腺炎
- E、急性绞窄性肠梗阻

答案：D

45、男性，35岁，诉乏力，心悸，恍惚，步履不稳已2年，其间先后3次出现精神失常和癫痫样发作，一个月前，因早餐前从事体力劳动，引起四肢抽搐。神志不清，验血糖 $2.0mmol/L$ ，静脉注射50%葡萄糖溶液60ml后，症状缓解，既往无头部外伤史，无其他阳性体征，诊断应考虑为()

- A、症状性癫痫
- B、特发性癫痫
- C、胰岛素瘤
- D、饥饿性低血糖

E、促胃液素瘤

答案：C

46、肝破裂可出现()

A、失血性休克

B、胆汁性腹膜炎

C、外伤性血胆症

D、肝脏浊音界扩大

E、以上均可出现

答案：E

47、甲亢患者服用碘剂错误的是()

A、甲亢症状基本控制、脉率 90 次/分以下、T3、T4 正常才开始服用

B、常用复方碘化钾溶液

C、需一直服用至手术，术后可停用

D、碘剂可抑制甲状腺素的释放

E、碘剂使腺体缩小变硬，利于手术

答案：C

48、腹部创伤剖腹探查术的要点是()

A、动作轻柔，有顺序有重点地探查

B、可靠止血

C、妥善处理内脏损伤

D、清洗引流腹腔

E、以上均是

答案：E

49、男性，43 岁，2 个月前发生上消化道出血，经胃镜检查证实为食管静脉曲张，既往有乙型肝炎病史，目前肝功能有轻度损害，应选择哪个术式，既能预防食管曲张静脉再出血，又对肝功能影响最小()

A、脾肾静脉分流术

B、肠系膜上静脉-下腔静脉分流术

C、门腔静脉分流术

D、脾切除术

E、脾切除，贲门周围血管离断术

答案：E

50、常用的直肠肛管检查体位不包括()

A、左侧卧位

B、右侧卧位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028075056054006033>