

外科护理学题库4

51. 此时应采用的处理措施是B [单选题] *

- A. 充分补液 (正确答案)
- B. 适当补液
- C. 给强心药，减慢输液
- D. 使用血管扩张剂
- E. 使用血管收缩剂

1. 苯巴比妥钠作为局部麻醉前必需的用药，主要是因为E [单选题] *

- A. 有镇静作用 (正确答案)
- B. 有催眠作用
- C. 能减少呼吸道分泌
- D. 能减轻迷走神经反射
- E. 能预防局麻药中毒反应

2. 硬膜外麻醉最严重的并发症是D [单选题] *

- A. 血压下降 (正确答案)
- B. 血管扩张
- C. 尿潴留
- D. 全脊髓麻醉
- E. 呼吸变慢

3. 为防止全麻时呕吐和手术后腹胀，手术前禁食、禁饮的时间E [单选题] *

- A. 4h禁食，2h禁水 (正确答案)
- B. 6h禁食，4h禁水
- C. 8h禁食，6h禁水

D. 10h禁食. 4h禁水

E. 12h禁食, 4~6h禁水

D. 10h禁食. 4h禁水 E. 12h禁食, 4~6h禁水

4. 椎管内麻醉术前用阿托品的目的是C [单选题]*

A. 预防呕吐 (正确答案)

B. 减少胃肠道内腺体分泌

C. 减弱迷走神经反射

D. 减轻内脏牵拉痛

E. 镇静

5. 下列哪种麻醉方法不是局部麻醉D [单选题]*

A. 表面麻醉 (正确答案)

B. 局部浸润麻醉

C. 局域阻滞麻醉

D. 吸入麻醉

E. 神经阻滞

6. 鞍区麻醉适用于A [单选题]*

A. 肛门会阴部手术 (正确答案)

B. 下腹部手术

C. 盆腔手术

D. 下肢手术

E. 腹股沟手术

7. 常用吸入麻醉药是C [单选题]*

A. 硫喷妥钠 (正确答案)

B. 氯胺酮

C. 异氟烷

- D. 芬太尼
- E. 氯琥珀胆碱

8. 吸入麻醉不可缺少的术前用药是C [单选题] *

- A. 苯巴比妥钠 (正确答案)
- B. 地西泮
- C. 阿托品
- D. 吗啡
- E. 异丙嗪

9. 当病人发生局麻中毒反应时，应首先采取的措施是E [单选题] *

- A. 地西泮静脉注射 (正确答案)
- B. 补液
- C. 硫喷妥钠静脉注射
- D. 吸氧
- E. 停止局麻药注入

10. 预防全麻病人发生误吸的主要措施是D [单选题] *

- A. 选择静脉麻醉 (正确答案)
- B. 术前用阿托品
- C. 术前用止吐药
- D. 术前禁食禁饮
- E. 术前放置胃管

11. 麻醉前常规禁食的时间是C [单选题] *

- A. 5h (正确答案)
- B. 6h
- C. 12h
- D. 18h

E 24h

A.5h B. 6h C. 12h D. 18h E 24h

12. 以1%普鲁卡因溶液做局部浸润麻醉，一次最大用量是E [单选题] *

A. 200mg (正确答案)

B. 300mg

C. 400mg

D. 500mg

E. 1000mg

13. 全身麻醉患者清醒前最危险的意外及并发症是A [单选题] *

A. 呕吐物窒息 (正确答案)

B. 体温过低

C. 坠床

D. 引流管脱出

E. 意外损伤

14. 关于全麻后的护理，下列叙述哪项不正确E [单选题] *

A. 病人未完全清醒，取侧卧位或去枕平卧 (正确答案)

B. 长时间未清醒时，应定时翻身

C. 保持呼吸道通畅

D. 监测血压、呼吸

E. 清醒病人可常规进食

15. 全麻后完全清醒的指标是D [单选题] *

A. 呼之能睁眼 (正确答案)

B. 对刺激有反应

C. 能听到讲话

D. 能正确回答问题

E. 能翻身活动

16. 腰麻后头痛的主要原因是B [单选题] *

A. 术中血压下降 C. 颅内压增高 E. 精神因素 (正确答案)

C. 颅内压增高 E. 精神因素

C. 颅内压增高 E. 精神因素 B. 脑脊液外漏

E. 精神因素 B. 脑脊液外漏

E. 精神因素 B. 脑脊液外漏 D. 迷走神经亢进

17. 腰麻后病人去枕平卧6~8h主要是预防A [单选题] *

A. 头痛 C. 低血压 E. 腰痛 (正确答案)

C. 低血压 E. 腰痛

C. 低血压 E. 腰痛 B. 呕吐

E. 腰痛 B. 呕吐

E. 腰痛 B. 呕吐 D. 切口痛

18. 硬膜外麻醉最严重的并发症是E [单选题] *

A. 血压下降 (正确答案)

B. 血管扩张

C. 尿潴留

D. 呼吸变慢

E. 全脊髓麻醉

19. 局麻药用量过大或误入血管可引起E [单选题] *

A. 发热反应 (正确答案)

B. 自身免疫反应

C. 变态反应

D. 虚脱

E. 中毒反应

20. 有高血压病史病人，在全麻时血压下降超过术前血压的 提示为低血压C

[单选题]*

A. 10% (正确答案)

B. 20%

C. 30%

D. 40%

E. 50%

二、A2型题 填空题]

21. 患者，男性，67岁，因右肺癌需行右肺切除手术其麻醉方式应采取E

[单选题]*

A. 硬膜外麻醉 (正确答案)

B. 基础麻醉加局部麻醉

C. 静脉给药的全身麻醉

D. 特制面罩给药的吸入性全身麻醉

E. 气管内插管给药的吸入性全身麻醉

22. 丁女士，30岁，全麻下开颅手术，术后已清醒，应采取的卧位是C [单选题]

*

A. 半卧位 (正确答案)

B. 平卧位

C. 头高斜坡位

D. 平卧头转向一侧

E. 侧卧位

23. 王先生，55岁，全麻术后未清醒，突然出现鼾声，是何问题B [单选题]*

A. 呼吸道被痰堵塞 (正确答案)

B. 舌后坠

- C. 喉痉挛
- D. 即将醒来
- E. 以上都不是

24. 一男性患者，30岁，拟行阑尾切除术，术前常规禁食的时间不得少于D
[单选题]*

- A. 4h(正确答案)
 - B. 14h
 - C. 6h
 - D. 12h
 - E. 8h
- A. 4h B. 14h C. 6h D. 12h E. 8h

25. 男性，45岁。腰麻注药后，先感胸闷，继而心慌、烦躁、恶心、呕吐，血压下降，随后呼吸困难。首先考虑为E [单选题]*

- A. 中毒反应(正确答案)
- B. 过敏反应
- C. 注射药物过快
- D. 剂量过大
- E. 麻醉平面过高

26. 女性，42岁。拟行阑尾切除术，在腰麻开始后不久，收缩压从麻醉前的14.7kPa(110mmHg)下降至11.7kPa(88mmHg)，此时应从静脉输液中加入哪一种药物B [单选题]*

- A. 间羟胺(正确答案)
- B. 麻黄碱
- C. 肾上腺素
- D. 多巴胺
- E. 去甲肾上腺素

27. 男性，51岁。拟在指神经阻滞下行左手食指脓性指头炎切开引流术。护理措施中错误的是D [单选题] *

- A. 常规麻醉前用药 (正确答案)
- B. 局麻药限量使用
- C. 防止局麻药注入血管
- D. 局麻药中加入适量肾上腺素
- E. 局麻药浓度不能过高

28. 一徐女士，准备在局部麻醉下行背部脂肪瘤切除术，术前饮食管理的要求是E [单选题] *

- A. 禁食4h (正确答案)
 - B. 禁食6h
 - C. 禁食8h
 - D. 禁食24h
 - E. 不必禁食
- A. 禁食4h B. 禁食6h C. 禁食8h D. 禁食24h E. 不必禁食

29. 石先生，50岁。无吸烟史和肺部疾病史。因右半结肠癌在全麻下行右半结肠切除手术后麻醉未清醒，呼吸时出现鼾声，此时首先采取的措施是D [单选题] *

- A. 观察病情 (正确答案)
- B. 气管插管
- C. 环甲膜穿刺
- D. 托起患者下颌
- E. 吸痰

30. 张女士，56岁。因左乳肿块在门诊手术室进行手术治疗。为防止局麻药中毒反应，下列措施哪项是正确的C [单选题] *

- A. 药物直接注入血管 (正确答案)
- B. 一次性给足量局麻药
- C. 普鲁卡因中加少量肾上腺素
- D. 发生毒性反应时应减少用药量
- E. 虚弱患者对药物反应弱，应增加药量

31. 男性，32岁，全麻下开颅手术，术后已清醒，应采取的体位是B [单选题] *

- A. 半卧位 (正确答案)
- B. 头高斜坡卧位
- C. 平卧位
- D. 平卧头转向一侧
- E. 侧卧位

三、A3型题 [单选题] *

(32~33题共用题干)(正确答案)

男性，30岁。在普鲁卡因局部浸润麻醉下行双侧腋臭皮肤切除。手术中患者突然大叫，惊厥，发绀，心率126 / min。

32. 该患者发生了何种情况D [单选题] *

- A. 休克 (正确答案)
- B. 抑制型毒性反应
- C. 过敏反应
- D. 兴奋型毒性反应
- E. 癔症

33. 目前抗惊厥的首要措施是E [单选题] *

- A. 静脉输液 (正确答案)
- B. 静脉注射间羟胺
- C. 静脉注射肾上腺素
- D. 吸氧

女性，36岁。右上腹阵发性疼痛3h入院。查体：急性痛苦病容，心肺未见异常；Murphy征阳性。B超示胆囊壁增厚，内有强光团伴声影。初步诊断为急性结石性胆囊炎。决定行胆囊切除术。

34. 该患者最适宜的麻醉方式是C [单选题] *

- A. 表面麻醉 (正确答案)
- B. 局部浸润麻醉
- C. 硬膜外阻滞
- D. 吸入麻醉
- E. 神经阻滞

35. 该患者麻醉后一般不出现的并发症是C [单选题] *

- A. 血压下降 (正确答案)
- B. 硬膜外血肿
- C. 头痛
- D. 全脊髓麻醉
- E. 局麻药中毒

四、A4型题 [单选题] *

(36~38题共用题干) (正确答案)

男性，46岁。4年来恶心、胃胀、食欲不振、周身乏力，2周前突然呕血400ml。体检：生命体征平稳，神情，表情淡漠。心肺无异常。肝于右锁骨中线肋下3.0cm，脾脏左肋下4.0cm，移动性浊音阳性，双下肢水肿。实验室检查：白细胞减少，血小板减少，出凝血时间延长；转氨酶增高，胆红素增高，白蛋白比例倒置；吞钡X线检查食管静脉曲张；超声检查提示脾大、腹水。诊断为门静脉高压征。拟行脾切除、门奇静脉断流术。

36. 该患者最适宜的麻醉方式是D [单选题] *

- A. 硬膜外阻滞 (正确答案)
- B. 腰麻
- C. 表面麻醉
- D. 全身麻醉

37. 该患者丕篮选用的麻醉药物是D [单选题] *

- A. 异氟醚 (正确答案)
- B. 乙醚
- C. 安氟醚
- D. 氟烷
- E. 笑气

38. 该患者因麻醉引起的并发症中，哪一项丕焦至呼吸系统并发症C [单选题] *

- A. 呕吐.误吸 (正确答案)
- B. 舌后坠
- C. 苏醒延迟
- D. 喉痉挛
- E. 呼吸抑制

39. 该患者最适宜的麻醉方式是A [单选题] *

- A. 硬膜外阻滞 (正确答案)
- B. 腰麻
- C. 表面麻醉
- D. 吸入麻醉
- E. 神经阻滞

40. 该患者麻醉前给药不能选择哪一种药物D [单选题] *

- A. 东莨菪碱 (正确答案)
- B. 异丙嗪
- C. 地西洋
- D. 阿托品
- E. 苯巴比妥钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028117012032006132>