

2024 年甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》 考试必背 200 题题库大全含答案（精练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

- A: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg；随后 75~100mgqd，长期维持
- B: 25~50mgqd，长期维持
- C: 75~100mgbid，长期维持
- D: 100~150mgqd，长期维持

答案：A

2. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度中度贫血为

- A: 30~60g / L
- B: 90~120g / L
- C: 120~160g / L
- D: 60~90g / L

答案：D

3. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500 $\mu\text{mol} / \text{L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 痛风
- B: 风湿性关节炎

C: 类风湿关节炎

D: 假性痛风

答案：A

4. 新生儿白细胞计数的正常范围值

A: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案：D

5. 丝裂霉素的主要毒副作用是（）

A: 出血性膀胱炎

B: 心脏毒性

C: 肺纤维化

D: 溶血性尿毒症

答案：D

6. 儿科用药中，对新生儿或婴儿最常用的给药途径是

A: 静脉滴注

B: 静脉注射

C: 肌肉注射

D: 口服给药

答案：A

7. 自我药疗时，初治滴虫性阴道炎，每日口服甲硝唑 800mg 连续用药时间为

A: 1 天

B: 5 天

C: 7 天

D: 3 天

答案：C

8. 妊娠初始 3 个月妇女禁用的药品是

A: 阿司匹林

B: 硫酸铝

C: 沙利度胺

D: 乳酸菌素

答案：C

9. 属于 β 受体阻断剂的是

A: 乙酰胆碱

B: 福莫特罗

C: 异丙托溴铵

D: 美托洛尔

答案：D

10. 急性脑血管病中病死率最高的疾病为

A: 原发性蛛网膜下腔出血

B: 脑出血

C: 短暂性脑缺血发作

D: 脑梗死

答案：B

11. 大剂量或连续使用顺铂可导致药源性肾病的机制是

A: 不可逆性肾小管坏死

- B: 前列腺素合成障碍
- C: 肾间质纤维化
- D: 阻塞肾小管、肾小球

答案：A

12. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- B: 需监测 INR
- C: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是Ⅱa 因子)
- D: 与食物和药物相互作用小

答案：B

13. 急性痛风性关节炎常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的部位是

- A: 踝关节?
- B: 腕关节?
- C: 第一跖趾关节?
- D: 膝关节?

答案：C

14. 患者,女,72 岁,有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频,尿常规检查示大量白细胞,尿细菌数 105cfu/m,诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 复方磺胺甲噁唑片
- D: 莫西沙星片

答案：C

15. III期临床试验

- A: 以患者为给药对象
- B: 以健康志愿者为给药对象
- C: 以特殊人群为给药对象
- D: 以目标适应证患者为给药对象

答案：D

16. 妊娠期妇女不宜选用药物是

- A: 青霉素
- B: 华法林
- C: 维生素 A
- D: 氯化钾

答案：B

17. 头痛伴恶心且一侧瞳孔改变，提示可能有

- A: 脑膜炎
- B: 动脉瘤
- C: 脑肿瘤
- D: 脑血管意外

答案：B

18. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 庆大霉素

- B: 依替米星
- C: 呋喃唑酮
- D: 克林霉素

答案：C

19. 患者，男，65 岁，良性前列腺增生病史 3 年，高血压病史 2 年，咳嗽，咳痰 10 余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周 2 次排便，长期口服硝苯地平控释片 30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$

- A: 异丙托溴铵溶液
- B: 氨溴索注射液
- C: 布地奈德混悬液
- D: 硝苯地平控释片

答案：A

20. 以下所列腹泻类别中，最适宜应用酶制剂的是()。

- A: 病毒性腹泻
- B: 肠道菌群失调所致的腹泻
- C: 激惹性腹泻
- D: 消化性腹泻

答案：D

21. 患者，女，23 岁，正在服用短效复方口服避孕药，但避孕失败，怀疑与服用的其他药物有关，可能造成这种结果的药物是

- A: 卡马西平
- B: 伊曲康唑

C: 克拉霉素

D: 胺碘酮

答案：A

22. 激素和抗激素制剂会导致甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、垂体等功能变化

A: 水盐代谢

B: 运动系统

C: 内分泌系统

D: 血液系统

答案：C

23. 给予维生素 B/C 的依据是

A: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

B: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

C: 有助于合成红细胞

D: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素

答案：D

24. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

A: 持续 3~5 分钟

B: 针刺或刀扎样锐性痛

C: 压迫、发闷

D: 胸痛

答案：B

25. 大量长期应用可导致老年人肠道菌群失调或真菌感染并发症的药物是

- A: 利尿药
- B: 降糖药
- C: 抗过敏药
- D: 广谱抗生素

答案：D

26. 药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致血清总胆固醇升高的药物是

- A: 胰岛素
- B: 苯妥英钠
- C: 氯氮平
- D: 阿司匹林

答案：C

27. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 埃索美拉唑镁肠溶片
- B: 枸橼酸铋钾胶囊
- C: 甲硝唑片
- D: 克拉霉素片

答案：D

28. 结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎等传染病可呈现

- A: 淋巴细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 单核细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案：A

29. 普萘洛尔的别名是

A: 安痛定

B: 消心痛

C: 心痛定

D: 心得安

答案：D

30. 真菌引起阴道炎（）

A: 庆大霉素

B: 咪康唑

C: 聚甲酚磺醛

D: 甲硝唑

答案：B

31. 1U 维生素 A 相当于

A: 0.3 μg 维生素 A

B: 0.03 μg 维生素 A

C: 3 μg 维生素 A

D: 30 μg 维生素 A

答案：A

32. 患者，女，58 岁，有 2 型糖尿病病史，因头疼、头晕就诊。体征和实验室检查：餐前血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.8%，血压 166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h。推荐在降糖的基础上合并选用

- A: 氢氯塞嗪
- B: 赖诺普利
- C: 特拉唑嗪
- D: 二甲双胍

答案：B

33. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒，立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再服用阿莫西林。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A: 肯定
- B: 可能无关
- C: 很可能
- D: 可能

答案：C

34. 根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

- A: 严重高血压
- B: 急性尿潴留
- C: 慢性荨麻疹
- D: 急性胰腺炎

答案：B

35. 以下可能导致锥体外系反应(药源性神经系统疾病)的药物是

- A: 哌甲酯
- B: 茶碱

C: 麻黄碱

D: 氯丙嗪

答案: D

36. IV 期新药临床试验样本数要求

A: 主要病种 ≥ 300 例

B: ≥ 300 例

C: 常见病 ≥ 12000 例

D: 20~30 例

答案: C

37. 以下所列药物中，适宜用于儿童患者的是()。

A: 万古霉素

B: 氟喹诺酮类

C: 氨基糖苷类

D: 青霉素

答案: D

38. 痛风急性发作期选用的抗痛风药物

A: 阿司匹林

B: 别嘌醇

C: 呋塞米

D: 秋水仙碱

答案: D

39. 消化性溃疡的注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

A: 维生素 E?

B: 维生素 C?

C: 维生素 D3?

D: 维生素 B12?

答案: D

40. 患者，女，39 岁，有哮喘病史。1 天前因发热服用阿司匹林 250mg，用药后 30 分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

A: 吸入色甘酸钠

B: 吸入倍氯米松

C: 口服麻黄碱

D: 吸入沙丁胺醇

答案: D

41. 保钾利尿剂

A: 雷米普利

B: 阿利吉仑

C: 阿米洛利

D: 依普利酮

答案: C

42. 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

B: 在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

C: 在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

D: 在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

答案: C

43. 患者,男,60 岁,因轻度冻疮(无破溃)到药店购药,药师应推荐的药品是()

- A: 10%樟脑软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 利巴韦林软膏

答案: A

44. 下列药品中,应该贮存在棕色玻璃瓶内的是

- A: 硝酸甘油片
- B: 狂犬疫苗
- C: 硫酸镁
- D: 硫糖铝片

答案: A

45. 糖化血红蛋白检查结果可显示糖尿病患者过去 3~4 周的血糖水平,正常值为

- A: 48%~60%
- B: 3.8%~4.0%
- C: 5.0%~8.0%
- D: 4%~6%

答案: C

46. 包括索引、文摘和题录等,查阅非常方便

- A: 二级文献
- B: 研究论文
- C: 药学网络
- D: 三级文献源

答案：A

47. 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是()

- A: 氯苯那敏
- B: 头孢氨苄
- C: 坎地沙坦
- D: 碳酸氢钠

答案：B

48. 抗感冒药中具有“使鼻黏膜血管收缩、解除鼻塞症状”作用的成分

- A: 伪麻黄碱
- B: 双氯芬酸
- C: 天麻素
- D: 金刚烷胺

答案：A

49. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 食醋
- B: 浓茶
- C: 烟
- D: 酒

答案：D

50. 血小板计数正常值范围是（ /L）

- A: $(100 \sim 300) \times 10^9$
- B: $(150 \sim 200) \times 10^{12}$
- C: $(50 \sim 100) \times 10^9$

D: $(200 \sim 250) \times 10^{12}$

答案：A

51. 有卒中病史的急性冠状动脉综合征患者禁用

A: 阿司匹林

B: 替格瑞洛

C: 普拉格雷

D: 替罗非班

答案：C

52. 患者，女，65 岁，因稳定型心绞痛服用阿替洛尔治疗，药师应告知患者每天应自测心率，静息心率控制在

A: 65~70 次 / 分

B: 40~45 次 / 分

C: 55~60 次 / 分

D: 35~40 次 / 分

答案：C

53. I 类手术切口应用第三代头孢菌素，属于

A: 不合理联合用药

B: 超适应证用药

C: 无适应证用药

D: 过度治疗用药

答案：C

54. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内 cAMP 含量，缓解慢性心衰症状的是

A: 硝普钠

B: 氨力农

C: 地高辛

D: 多巴酚丁胺

答案: B

55. 能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是 ()

A: 他汀类

B: 烟酸类

C: 依折麦布

D: 普罗布考

答案: C

56. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 奥美拉唑

B: 维生素 B6

C: 昂丹司琼

D: 雷尼替丁

答案: C

57. 对一般药品而言，安全贮存的环境可以是

A: 室温 20℃

B: 室温 (20~30℃)

C: 室温 25℃

D: 室温 (10~30℃)

答案: D

58. 属于 B 级高危药品的是

A: 血液透析液

B: 50%葡萄糖注射液

C: 全胃肠外营养液

D: 5%葡萄糖注射液

答案: C

59. 判断尿路感染是复发还是再感染，多以在停药后几周再发为依据

A: 6 周

B: 4 周

C: 5 周

D: 3 周

答案: A

60. 会引起头晕、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘

A: 蛋白同化激素

B: β -受体阻断剂

C: 精神刺激剂

D: 利尿剂

答案: B

61. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

A: 1%硫酸铜

B: 1%硫酸镁

C: 3%过氧化氢

D: 1%氯化钠

答案: B

62. Hb 量 31~60g/L 可诊断为

A: 重度贫血

- B: 中度贫血
- C: 轻度贫血
- D: 基本正常

答案：A

63. 隔日一次用药的外文规范缩写的是

- A: q. d
- B: q. o. d
- C: q. h
- D: q. n

答案：B

64. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为（）

- A: 溶栓的同时
- B: 溶栓 12h 前
- C: 溶栓 24h 后
- D: 溶栓 12h 后

答案：C

65. 关于药物经济学研究方法，下列说法误的是

- A: 最小成本法不能对不同疾病间进行比较
- B: 成本效用方法不能对不同疾病间进行比较
- C: 成本效益方法能对医疗与非医疗项目进行比较
- D: 成本效果分析不能对医疗与非医疗项目进行比较

答案：B

66. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

- A: 抗胆碱能药物

- B: 5 α 还原酶抑制剂
- C: α 1 阻断剂
- D: 选择性 α 1 激动剂

答案：A

67. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 氯霉素
- B: 洛伐他汀
- C: 阿昔洛韦
- D: 氯化钾

答案：B

68. 应用两种以上药物以增强与确保疗效

- A: 早期
- B: 适量
- C: 联合
- D: 规律

答案：C

69. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

- A: 0.8g，2 次 / 日
- B: 0.8g，4 次 / 日
- C: 0.8g，5 次 / 日
- D: 0.8g，3 次 / 日

答案：D

70. 用量大时，会出现中毒症状，呼吸快而浅，血压上升等，严重时会出现呼吸麻痹而死亡

- A: 精神刺激剂
- B: 蛋白同化激素
- C: β -受体阻断剂
- D: 利尿剂

答案：A

71. 顺应人体生物节律的变化，适宜清晨给药的是

- A: 洛伐他汀
- B: 地塞米松
- C: 鞣酸蛋白
- D: 强力泻药

答案：B

72. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

- A: 血液透析
- B: 血液置换
- C: 腹膜透析
- D: 血液滤过

答案：B

73. 能早期发现患者伤害、尽快地采取干预措施的是

- A: 岗位工作问责
- B: 病历审查
- C: 直接观察
- D: 计算机检测方法

答案：D

74. 真菌引起的阴道炎宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 咪康唑
- C: 庆大霉素
- D: 聚甲酚磺醛

答案：B

75. 需要用 10%酒精或植物油冲洗的是

- A: 皮肤污染酚类毒物
- B: 眼内进入固体腐蚀性颗粒
- C: 眼内污染毒物
- D: 毛发被毒物污染

答案：A

76. 关于现代药学的发展,以药品供应为中心阶段的特征是

- A: 以新药研制为中心
- B: 以促进合理用药为主
- C: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作
- D: 以药品工业化生产为中心

答案：C

77. 治疗寻常痤疮给予锌

- A: 日服 0.05mg
- B: 日服 180mg
- C: 日服 80mg
- D: 日服 30~40mg

答案：D

78. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者的药品是

- A: 孟鲁司特
- B: 异丙托溴铵
- C: 氨茶碱
- D: 噻托溴铵

答案：A

79. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

- A: 维生素 A
- B: 复合维生素 B
- C: 维生素 C
- D: 维生素

答案：B

80. 患者，男性，68 岁，患 2 型糖尿病 5 年，检查：餐前血糖 5.8mmol/L，餐后 12.4mmol/L，糖化血红蛋白 7.2%，应首选的降糖药为

- A: 格列苯脲？
- B: 罗格列酮？
- C: 二甲双胍？
- D: 阿卡波糖？

答案：D

81. 属于浓度依赖性抗菌药，评估此类药物的 PK / PD 参数主要有 C_{max} / MIC 或 $AUC_{0\sim24} / MIC$ ，提高此类抗菌药物疗效的策略主要是提高 C_{max} ，一般推荐日剂量单次给药方案的药物是

- A: 氨茶碱
- B: 左氧氟沙星
- C: 利奈唑胺
- D: 头孢克洛

答案：B

82. 支气管扩张的临床表现是

- A: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- B: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
- C: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血
- D: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

答案：C

83. 人体正常体温的标准是直肠温度不超过

- A: 37.2℃
- B: 36.6℃
- C: 37.6℃
- D: 36.9

答案：C

84. (抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

- A: 加巴喷丁
- B: 卡马西平

C: 扑米酮

D: 乙琥胺

答案: B

85. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 艾司唑仑

B: 舍曲林

C: 阿米替林

D: 丁螺环酮

答案: B

86. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

A: 依非韦伦

B: 利托那韦

C: 齐多夫定

D: 利巴韦林

答案: A

87. 阿卡波糖片的适宜服药时间是

A: 餐中

B: 清晨

C: 餐后

D: 餐前

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/028137026043007022>