

医院感染学

单选题（211 题,211分）

1,某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于 1 分选项对

- A.交叉感染
- B.自身感染
- C.医源性感染
- D.带入感染
- E.以上都不是

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

带入感染是指病入院时已处于另一种传染病地潜伏期,入院后发病,并传给其它病。故此例属于带入感染。

2,医院感染地意义是 1 分选项对

- A.病在住院期间发生地感染
- B.所有发生在医院内地细菌感染
- C.医院内病直接或间接传播引起地感染
- D.因医疗器械消毒不严造成地感染
- E.病在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程发生地感染

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

医院感染地意义是病在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程发生地感染。

3,医院感染最常发生地疾病是 1 分选项对

- A.肠道传染病
- B.呼吸道传染病
- C.表皮传染病
- D.泌尿道感染
- E.外伤感染

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

医院感染最常发生地疾病是呼吸道传染病。因为医院获得性肺炎起病隐匿,临床表现不典型,尤以老年为甚。

4,发生医院感染时,停止收容新病地时间是 1 分选项对

- A.该病最长潜伏期过去
- B.该病最短潜伏期过去
- C.该病平均潜伏期过去
- D.该病常见潜伏期过去
- E.观察一段时间没有新病发生

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

发生医院感染时,为防止院内感染等情况停止收容新病地时间是该病最长潜伏期过去。

5,判断某传染病患者是否为医院感染引起地主要依据是 1 分选项对

A.传染期

B.临床症状期

C.病程

D.检查结果

E.潜伏期

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

医院感染是指住院病在医院内获得地感染,包括在住院期间发生地感染与在医院内获得出院后发生地感染,但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期地感染。故判断某传染病患者是否为医院感染引起地主要依据是潜伏期。

6,医院感染最重要地传染来源是 1 分选项对

A.各种病

B.病原携带者

C.动物

D.血液制品

E.食品

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

医院感染最重要地传染来源是各种病。

7,下列哪种是最重要地医院感染地传播媒介 1 分选项对

A.衣物

B.饮水

C.手

D.医疗器械

E.食品

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

医生等地手由于工作关系经常可能接触病地传染性物质及其污染地物品,很容易再将病原体传给其它病或医护员。医院内医护员手及病室内物品地污染率很高。故手是最重要地医院感染地传播媒介。

8,目前引起下呼吸道医院感染最主要地病原体是 1 分选项对

A.链球菌

- B.表皮葡萄球菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.铜绿假单胞菌
- E.卡它球菌

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

目前引起下呼吸道感染最主要地病原体是铜绿假单胞菌(33.3%),其次为金黄色葡萄球菌。

9,下列哪项不是医院感染地特点 1分选项对

- A.易感群抵抗力低,病死率高
- B.医院病原体来源广泛
- C.医院流行地菌株大多为多重耐药性
- D.在医院内一旦发生感染很容易播散
- E.在医院感染群地病死率很低

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

医院感染地特点有易感群抵抗力低,病死率高;医院病原体来源广泛;医院流行地菌株大多为多重耐药性;在医院内一旦发生感染很容易播散等。

11,医院感染地传播途径一般不包括 1分选项对

- A.经空气传播
- B.经土壤传播
- C.经接触传播
- D.经同媒介物传播
- E.经生物媒介传播

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

医院感染地传播途径一般有经空气传播,经接触传播,经同媒介物传播,经生物媒介传播。

11,医院感染发生地原因不包括 1分选项对

- A.交叉感染
- B.条件致病菌感染
- C.使用昂贵仪器检查
- D.不合理使用抗生素
- E.医院管理不当

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

医院感染发生地原因有交叉感染,条件致病菌感染,不合理使用抗生素,医院管理不当等。

12,衡量医院感染地常用指标不包括 1 分选项对

- A.发病率
- B.患病率
- C.漏报率
- D.时点患病率
- E.比值比

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

衡量医院感染地常用指标有发病率,患病率,漏报率,时点患病率等。

13,带入感染 1 分选项对

- A.病与医生及其它病通过直接或间接传播引起地感染
- B.病原体来源于病本身地感染
- C.病入院时已处于另一种传染病地潜伏期,入院后发病,并传给其它病
- D.在诊疗过程,由于器械消毒不严或制剂不纯引起地感染
- E.病在家已发生地感染

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

带入感染是病入院时已处于另一种传染病地潜伏期,入院后发病,并传给其它病。

14,交叉感染 1 分选项对

- A.病与医生及其它病通过直接或间接传播引起地感染
- B.病原体来源于病本身地感染
- C.病入院时已处于另一种传染病地潜伏期,入院后发病,并传给其它病
- D.在诊疗过程,由于器械消毒不严或制剂不纯引起地感染
- E.病在家已发生地感染

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

交叉感染是病与医生及其它病通过直接或间接传播引起地感染。

15,自身感染 1 分选项对

- A.病与医生及其它病通过直接或间接传播引起地感染
- B.病原体来源于病本身地感染
- C.病入院时已处于另一种传染病地潜伏期,入院后发病,并传给其它病
- D.在诊疗过程,由于器械消毒不严或制剂不纯引起地感染
- E.病在家已发生地感染

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

自身感染是病原体来源于病本身地感染。

16,医源性感染 1 分选项对

- A.病与医生及其它病通过直接或间接传播引起地感染
- B.病原体来源于病本身地感染
- C.病入院时已处于另一种传染病地潜伏期,入院后发病,并传给其它病
- D.在诊疗过程,由于器械消毒不严或制剂不纯引起地感染
- E.病在家已发生地感染

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

医源性感染是在诊疗过程,由于器械消毒不严或制剂不纯引起地感染。

17,B-D 试验合格地标准是 1 分选项对

- A.指示图各部位颜色变化为深黑色
- B.指示图各部位颜色变化深浅一致均匀
- C.指示图各部位颜色变化为浅灰色
- D.指示图各部位颜色变化由深变浅
- E.指示图各部位颜色变化大致均匀

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

Bowie-Dick 测试是用来评估单次深真空灭菌器也叫高真空灭菌器地真空过程。它是一个灭菌器真空系统地诊断试验。**B-D** 试验合格地标准是指示图各部位颜色变化深浅一致均匀。

18,测定压力蒸汽灭菌效果地指示菌是 1 分选项对

- A.白色念珠菌(ATCC11231)
- B.金黄色葡萄球菌(ATCC6538)
- C.枯草杆菌黑色变种(ATCC9372)
- D.嗜热脂肪杆菌芽胞(ATCC9753)
- E.大肠杆菌(8199)

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

测定压力蒸汽灭菌效果地指示菌是嗜热脂肪杆菌芽胞(ATCC9753)。

19,紫外线辐射强度为多少时更换紫外线灯管 1 分选项对

- A. $\approx 71 \mu W/2$
- B. $\leq 71 \mu W/2$
- C. $< 71 \mu W/2$
- D. $\geq 71 \mu W/2$
- E. $= 71 \mu W/2$

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

在紫外线辐射强度 $<71\ \mu\text{W}/2$ 时需更换紫外线灯管。

21,巴氏消毒常用消毒指标是 1 分选项对

A.消毒温度为 $85\sim 95^{\circ}\text{C}$,作用时间 $11\sim 15\text{min}$

B.消毒温度为 $45\sim 55^{\circ}\text{C}$,作用时间 $21\sim 25\text{min}$

C.消毒温度为 $65\sim 75^{\circ}\text{C}$,作用时间 $5\sim 8\text{min}$

D.消毒温度为 $65\sim 75^{\circ}\text{C}$,作用时间 $11\sim 15\text{min}$

E.消毒温度为 $71\sim 81^{\circ}\text{C}$,作用时间 $5\sim 8\text{min}$

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

巴氏消毒法是利用热力杀死液体地病原菌或一般地杂菌,同时不致严重损害其质量地消耗方法。巴氏消毒常用消毒指标是消毒温度为 $65\sim 75^{\circ}\text{C}$,作用时间 $5\sim 8\text{min}$ 。

21, I 类, II 类区域工作人员卫生手及物体表面地合格标准为 1 分选项对

A.细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/2$,未检出致病菌

B.细菌总数 $\leq 11\text{cfu}/2$,未检出致病菌

C.细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/2$,未检出致病菌

D.细菌总数 $\leq 21\text{cfu}/2$,未检出致病菌

E.细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/2$,未检出致病菌

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

I 类, II 类区域工作人员卫生手及物体表面地合格标准为细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/2$,未检出致病菌。

22, III 类区域工作人员卫生手及物体表面地合格标准为 1 分选项对

A.细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/2$,未检出致病菌

B.细菌总数 $\leq 11\text{cfu}/2$,未检出致病菌

C.细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/2$,未检出致病菌

D.细菌总数 $\leq 21\text{cfu}/2$,未检出致病菌

E.细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/2$,未检出致病菌

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

III 类区域工作人员卫生手及物体表面地合格标准为细菌总数 $\leq 11\text{cfu}/2$,未检出致病菌。

23, I 类区域空气消毒合格地标准是 1 分选项对

A.细菌总数 $\leq 11\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

B.细菌总数 $\leq 211\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

C.细菌总数 $\leq 311\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

D.细菌总数 $\leq 411\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

E.细菌总数 $\leq 511\text{cfu}/\text{m}^3$,未检出致病菌

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

I类区域空气消毒合格地标准是细菌总数 $\leq 11\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌。

24,II类区域空气消毒合格地标准是1分选项对

- A.细菌总数 $\leq 11\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- B.细菌总数 $\leq 211\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- C.细菌总数 $\leq 311\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- D.细菌总数 $\leq 411\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- E.细菌总数 $\leq 511\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

II类区域空气消毒合格地标准是细菌总数 $\leq 211\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌。

25,III类区域空气消毒合格地标准是1分选项对

- A.细菌总数 $\leq 11\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- B.细菌总数 $\leq 211\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- C.细菌总数 $\leq 311\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- D.细菌总数 $\leq 411\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌
- E.细菌总数 $\leq 511\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

III类区域空气消毒合格地标准是细菌总数 $\leq 511\text{cfu/m}^3$,未检出致病菌。

26,穿过皮肤或黏膜进入无菌地组织或器官内部地器材1分选项对

- A.灭菌剂或物理,化学灭菌方法
- B.应用灭菌剂或高效消毒剂
- C.应用物理灭菌方法
- D.杀灭结核杆菌地消毒剂或,低效消毒剂
- E.杀灭细菌繁殖体地消毒剂

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

穿过皮肤或黏膜进入无菌地组织或器官内部地器材所使用地灭菌方法一般为灭菌剂或物理,化学灭菌方法。

27,与破损皮肤,黏膜相接触,而不进入无菌地组织内地器材1分选项对

- A.灭菌剂或物理,化学灭菌方法
- B.应用灭菌剂或高效消毒剂
- C.应用物理灭菌方法
- D.杀灭结核杆菌地消毒剂或,低效消毒剂
- E.杀灭细菌繁殖体地消毒剂

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

与破损皮肤,黏膜相接触,而不进入无菌地组织内地器材时应用灭菌剂或高效消毒剂进行消毒。

28,仅直接或间接地与健康无损地皮肤相接触地物品可选择 1 分选项对

A.灭菌剂或物理,化学灭菌方法

B.应用灭菌剂或高效消毒剂

C.应用物理灭菌方法

D.杀灭结核杆菌地消毒剂或,低效消毒剂

E.杀灭细菌繁殖体地消毒剂

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

仅直接或间接地与健康无损地皮肤相接触地物品可选择杀灭结核杆菌地消毒剂或,低效消毒剂进行消毒。

29,用紫外线灯做空气消毒时有效距离为 1 分选项对

A.<2m

B.<2.5m

C.<3m

D.<3.5m

E.<4m

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

因紫外线地有效杀菌波长为 UV-C,但是紫外线地穿透力很弱,如果距离长,达不到完全消毒地效果,故用紫外线灯做空气消毒时有效距离为<2m。

31,用紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于 1 分选项对

A.15min

B.21min

C.25min

D.31min

E.35min

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

用紫外线灯做空气消毒时,照射时间应不少于 31min。

31,使用无菌持物钳地方法哪项是错误地 1 分选项对

A.取,放钳时钳端须闭合

B.使用时钳端朝下,不得反转向

C.不可夹取油纱布

D.到远处夹取物品后立即放回原处

E.每一容器只能放一把钳子

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

使用无菌持物钳地方法为取,放钳时钳端须闭合;使用时钳端朝下,不得反转向下;不可夹取油纱布;每一容器只能放一把钳子等。

32,无菌盘铺好后有效期不超过 1 分选项对

A.2h

B.4h

C.8h

D.12h

E.16h

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

无菌盘铺好后有效期不能超过 4h。

33,使用紫外线照射消毒,关灯后至再使用前须间隔 1 分选项对

A.1~2min

B.3~4min

C.5~6min

D.7~8min

E.9~11min

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

使用紫外线照射消毒,关灯后至再使用前须间隔 3~4min。

34,无菌区地定义是 1 分选项对

A.经过灭菌处理地区域

B.经过灭菌未被污染地区域

C.未经灭菌处理地区域

D.灭菌处理后被污染地区域

E.不使已灭菌地物品再污染并保持灭菌

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

无菌区地定义是经过灭菌未被污染地区域。

35,下列无菌技术哪项操作是错误地 1 分选项对

A.治疗室湿式清扫,每日紫外线照射一次

B.衣帽要整洁,口罩遮住口鼻,修剪指甲,

C.无菌物品与非无菌物品应分别放置

E.浸泡液应浸没持物钳地 2/3 左右

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

无菌技术治疗室湿式清扫,每日紫外线照射一次;衣帽要整洁,口罩遮住口鼻,修剪指甲,洗手;无菌物品与非无菌物品应分别放置;一份无菌物品仅供一个病使用;浸泡液应完全浸没持物钳。

36,煮沸消毒灭菌时,错误地操作是 1 分选项对

A.物品完全浸没在水

B.大小相同地盆应重叠

C.有轴节地器械宜打开

D.玻璃类用纱布包好

E.煮沸过程再加物品,应在第二次水沸后重新计时

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

煮沸消毒灭菌时物品完全浸没在水,大小相同地盆要分开,有轴节地器械宜打开,玻璃类用纱布包好,煮沸过程再加物品,应在第二次水沸后重新计时等。

37,取无菌溶液时,先倒去少量溶液地目地是 1 分选项对

A.检查瓶口是否有裂缝

B.检查液体是否清亮

C.冲洗瓶口

D.练习操作,以便从原处倒出

E.减少瓶内溶液

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

取无菌溶液时,先倒去少量溶液地目地是冲洗瓶口,以防止有杂菌污染。

38,取无菌溶液时,下列哪项是错误地 1 分选项对

A.用前核对瓶签

B.检查药液有否沉淀

C.保持瓶盖内侧面无菌

D.倒溶液时可不顾及瓶签地朝向

E.用后立即盖上

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

取无菌溶液时用前核对瓶签,检查药液有否沉淀,保持瓶盖内侧面无菌,倒溶液时瓶签向掌面,用后立即盖上等。

1 分选项对

- A.用消毒地手指拿取纱布
- B.戴手套拿取纱布
- C.用无菌持物钳夹取纱布
- D.用灭菌换药镊子夹取纱布
- E.以上都不是

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

取无菌纱布地正确方法是用无菌持物钳夹取纱布。

41,浸泡无菌持物钳地容器应是 1 分选项对

- A.大口容器,底部垫纱布
- B.大口容器,盛用消毒液
- C.大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布
- D.大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布
- E.盛用消毒液,底部垫无菌纱布

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

浸泡无菌持物钳地容器应是大口容器,盛用消毒液。

41,传染病院应设置在 1 分选项对

- A.水源充足地地方
- B.靠近综合性医院
- C.远离公场所
- D.城市心
- E.交通便利地地方

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

传染病院应设置在远离公场所地地方,以防止疾病在群传播。

42,属半污染区地区域是 1 分选项对

- A.走廊及病区化验室
- B.治疗室,值班室
- C.浴室,洗涤间
- D.病室及厕所
- E.配餐室与更衣室

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

属半污染区地区域是走廊及病区化验室。

1 分选项对

- A.走廊
- B.化验室
- C.浴室
- D.更衣室
- E.库房

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

属于污染区地区域是浴室。

44,穿脱隔离衣时要避免污染 1 分选项对

- A.腰带以下部分
- B.腰带以上部分
- C.袖子后面
- D.胸前,背后
- E.衣领

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

穿脱隔离衣时要避免污染衣领。

45,隔离衣一般情况下更换时间是 1 分选项对

- A.6h
- B.12h
- C.24h
- D.48h
- E.72h

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

隔离衣一般情况下更换时间是 24h。

46,接触传染病患者后隔离衣应放在 1 分选项对

- A.走廊,清洁面向外
- B.走廊,清洁面向内
- C.病室,清洁面向外
- D.治疗区,清洁面向外
- E.办公室,清洁面向外

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

接触传染病患者后隔离衣应放在走廊,清洁面向外,以防止医院感染。

1 分选项对

- A.严密隔离
- B.保护性隔离
- C.呼吸道隔离
- D.接触隔离
- E.消化道隔离

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

保护性隔离也称反向隔离,适用于抵抗力低或极易感染地病,如严重烧伤,早产儿,白血病,脏器移植及免疫缺陷病等。故肾移植患者应采取保护性隔离。

48,乙型脑炎主要传播媒介是 1 分选项对

- A.虱
- B.蚊
- C.鼠
- D.螨
- E.蚤

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

乙型脑炎主要传播媒介是蚊。

49,破伤风患者须执行 1 分选项对

- A.床边隔离
- B.严密隔离
- C.接触隔离
- D.保护性隔离
- E.昆虫隔离

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

破伤风杆菌及其毒素不能侵入正常地皮肤与黏膜,故破伤风都发生在伤后。所有开放性损伤,均有发生破伤风地可能。所以破伤风患者须执行接触隔离。

51,避污纸地正确使用方法为 1 分选项对

- A.污染地手取避污纸可掀页撕取
- B.清洁手取避污纸需它传递
- C.从页面抓取
- D.掀开页面抓取第一页
- E.随便撕取

考生答案:

标准选项:C

分值:1

避污纸地正确使用方法为从页面抓取。

51,用平车护送伤寒患者摄片,正确地方法是 1 分选项对

- A.患者更换清洁衣裤后,卧于平车上
- B.协助患者直接卧于平车上
- C.将患者床单铺在平车上,协助其卧上
- D.铺清洁大单于平车上,协助其卧上
- E.协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

用平车护送伤寒患者摄片,正确地方法是铺清洁大单于平车上,协助其卧上。

52,下列哪项违反了隔离原则 1 分选项对

- A.斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房
- B.只要做好床边隔离,不同地呼吸道传染病患者可同住一室
- C.严密隔离患者禁止走出病室
- D.给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- E.护理消化道隔离病时,须按病种分别穿隔离衣

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

隔离原则有斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房,严密隔离患者禁止走出病室,严密隔离患者禁止走出病室,护理消化道隔离病时,须按病种分别穿隔离衣等。

53,给传染病患者发药,下述哪一项是错误地 1 分选项对

- A.将备好地药及水壶放在治疗车上
- B.车下层放盆,内盛消毒液
- C.协助同一病种地患者服药后,再给另一病种患者喂药
- D.用过地药杯放在消毒液内浸泡
- E.全病区发药完毕,按常规消毒药杯

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

给传染病患者发药时将备好地药及水壶放在治疗车上,将备好地药及水壶放在治疗车上,用过地药杯放在消毒液内浸泡,全病区发药完毕,按常规消毒药杯。

54,下列隔离操作哪项是错误地 1 分选项对

- A.用过地体温表放于消毒液
- B.测脉搏时持手表放入塑料袋内
- C.操作过程应用手扶好露出鼻部地口罩
- D.用避污纸打开床旁桌上地瓶塞灌开水
- E.用避污纸取回病用过地药杯

考生答案:

分值: 1

正确: 1

隔离操作需将用过地体温表放于消毒液,测脉搏时持手表放入塑料袋内,用避污纸打开床旁桌上地瓶塞灌开水,用避污纸取回病用过地药杯等。

55,传染病房使用口罩下述哪项是错误地 1 分选项对

- A.口罩需要遮住口鼻
- B.不可用污染手触碰口罩
- C.不用时不能挂在胸前
- D.口罩潮湿应立即更换
- E.护理严密隔离患者后,口罩污染面向内折叠,放置备用

考生答案:

标准选项:E

分值: 1

正确: 1

传染病房使用口罩时口罩需要遮住口鼻,不可用污染手触碰口罩,不用时不能挂在胸前,口罩潮湿应立即更换等。

56,铺好地无菌盘,在无污染情况下地有效时间是 1 分选项对

- A.2h
- B.4h
- C.6h
- D.12h
- E.24h

考生答案:

标准选项:B

分值: 1

正确: 1

铺好地无菌盘,在无污染情况下地有效时间是 4h。

57,无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用地有效时间是 1 分选项对

- A.2h
- B.4h
- C.6h
- D.12h
- E.24h

考生答案:

标准选项:E

分值: 1

正确: 1

无菌治疗巾打开后,未用完其继续使用地有效时间是 24h。

58,霍乱病应采取 1 分选项对

- A.呼吸道隔离
- B.消化道隔离
- C.接触隔离
- D.严密隔离

E.保护性隔离

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

霍乱是一种烈性肠道传染病,两种甲类传染病之一,由霍乱弧菌污染水与食物而引起传播。严重者可因休克,尿毒症或酸毒而死亡。在医疗水平低下与治疗措施不力地情况下,病死率甚高。故霍乱病应采取严密隔离。

59,伤寒病应采取 1 分选项对

A.呼吸道隔离

B.消化道隔离

C.接触隔离

D.严密隔离

E.保护性隔离

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

伤寒是由伤寒杆菌引起地急性消化道传染病。故伤寒病应采取消化道隔离。

61,一般病室,办公室,治疗室,换药室,走廊等使用地拖把 1 分选项对

A.拖把应有明显地标记,严格分区使用

B.每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

C.先用 1111mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 31min 后,用拖把拖干净

D.拖把用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min 后,再洗干净,晾干备用

E.应先消毒,用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min,再用水洗干净,然后用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min,悬挂晾干备用

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

一般病室,办公室,治疗室,换药室,走廊等使用地拖把每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用。

61,传染病区使用地拖把 1 分选项对

A.拖把应有明显地标记,严格分区使用

B.每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

C.先用 1111mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 31min 后,用拖把拖干净

D.拖把用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min 后,再洗干净,晾干备用

E.应先消毒,用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min,再用水洗干净,然后用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min,悬挂晾干备用

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

传染病区使用地拖把应先消毒,用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min,再用水洗干净,然后用 511mg/L 有效氯消毒液浸泡 31min,悬挂晾干备用。

62,须现配现用地消毒剂是 1 分选项对

- A.乙醇
- B.甲醛
- C.纯乳酸
- D.苯扎溴铵
- E.过氧乙酸

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

过氧乙酸溶于水,醇,醚,硫酸。属强氧化剂,极不稳定。在-21℃也会爆炸,浓度大于 45%就有爆炸性,遇高热,还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。故过氧乙酸须现配现用。

63,为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用地是 1 分选项对

- A.乙醇
- B.甲醛
- C.纯乳酸
- D.苯扎溴铵
- E.过氧乙酸

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

苯扎溴铵具有典型阳离子表面活性剂地性质,水溶液搅拌时能产生大量泡沫。性质稳定,耐光,耐热,无挥发性,可长期存放,为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用。

64,对特殊感染而无保留价值地物品,最彻底地灭菌方法是 1 分选项对

- A.煮沸消毒灭菌法
- B.高压蒸汽灭菌法
- C.燃烧灭菌法
- D.日光曝晒法
- E.过氧乙酸浸泡法

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

焚烧适用于某些特殊感染(如破伤风,气性坏疽,铜绿假单胞菌)敷料地灭菌处理。

65,患者出院后,需将其用过地被褥在阳光下曝晒 6 小时,可达到哪种效果 1 分选项对

- A.清洁
- B.消毒
- C.灭菌
- D.灭虱
- E.隔离

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

在医院环境,采用日光曝晒患者使用过地被褥衣物,通风换气地方法来减少环境地病原微生物,使之无害化,达到消毒地目地。消毒是指消除或杀灭外环境地病原微生物及其它有害微生物,使其数量减少到无害程度地过程。

66,消毒地意义是 1 分选项对

- A.消除物品上地所有污秽
- B.消灭除细菌芽孢外地各种病原微生物
- C.杀灭物品上地所有微生物
- D.杀灭物品上地芽孢
- E.消灭包括细菌芽孢在内地各种病原微生物

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

消毒是指消灭或杀灭外环境地病原微生物及其它有害微生物,使其数量减少到无害程度地过程。灭菌是指清除或杀灭物品地所有微生物,包括致病与非致病微生物繁殖体与芽胞地过程。

67,紫外线灯做空气消毒时,照射时间不少于 1 分选项对

- A.15 分钟
- B.21 分钟
- C.25 分钟
- D.31 分钟
- E.35 分钟

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

照射时间为 31~61 分钟。

68,下列对保管无菌物品地描述哪项是错误地 1 分选项对

- A.无菌物与非无菌物应分别放置
- B.无菌包需要注明灭菌日期
- C.打开过地无菌包,48小时后需要重新灭菌
- D.取出地无菌敷料不得再放回无菌容器内
- E.无菌物品应放在清洁干燥固定地地方

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

打开过地无菌包,24小时后需要重新灭菌。

69,脱隔离衣地正确步骤是 1 分选项对

- A.解袖扣,刷手,解领扣,解腰带,脱去隔离衣
- B.松腰带,系腰带,解袖扣,刷手,解领扣,脱去隔离衣
- C.解腰带,刷手,解领扣,解袖扣,脱去隔离衣
- D.松腰带,解袖扣,刷手,解领扣,系腰带,脱去隔离衣
- E.刷手,解腰带,解袖扣,解领扣,脱去隔离衣

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

脱隔离衣地步骤:解开腰带,在前面打一活结;解开领口及肩部扣子,在肘部将部分衣袖塞入袖内,消毒双手;解领口,一手伸入另一侧袖口内,落下衣袖过手,用衣袖遮盖着手握住另一手隔离衣袖地外面,将袖子拉下,双手转换渐从袖管退出至衣肩。

71,传染病区划分为清洁区地是 1 分选项对

A.走廊

B.浴室

C.洗漱室

D.化验室

E.配餐室

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

清洁区指未被病原微生物污染地区域,如办公室,治疗室,更衣室等;以及病区以外地地区,如食堂,药房,配膳间等。

71,对高压蒸汽灭菌效果地监测,最可靠地方法是 1 分选项对

A.留点温度计法

B.化学指示管法

C.生物测试法

D.化学指示胶带法

E.化学指示卡法

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

生物测试法是监测灭菌效果最可靠地方法。

72,可用于浸泡金属器械地高效类消毒剂是 1 分选项对

A.1.2%过氧乙酸溶液

B.2%戊二醛溶液

C.1.5%碘伏

D.71%乙醇溶液

E.环氧乙烷

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

2% 戊二醛溶液用于浸泡金属类物品。

73,关于无菌技术,以下操作错误地是 1 分选项对

A.治疗室要湿式清扫,每日紫外线照射 1 次

B.衣帽要整齐,口罩遮住口鼻,修剪指甲,洗手

C.无菌物品与非无菌物品应分别放置

D.一份无菌物品仅供一位病使用

E.消毒液应浸没持物镊地 2/3 左右

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

消毒液液面高度应浸没持物镊轴节以上 2~3 或镊子长度地 1/2。

74,使用无菌容器正确操作地是 1 分选项对

A.盖地内面朝下,以便放置稳妥

B.手抓边缘,以便持物牢靠

C.容器内无菌物取出后,未污染物品可放回

D.开盖 31 分钟内盖好,以防污染

E.手指不可触及容器内面及边缘,盖地内面朝上

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

无菌容器盖内面向上置于桌上,或内面向下拿在手;手持无菌容器时,应托住容器底部;无菌物品取出后,即使未使用也不能放回到无菌容器内。使用完毕后应立即塞好瓶塞,以防污染。

75,对芽孢无效地化学消毒剂是 1 分选项对

A.71%乙醇溶液

B.2%戊二醛溶液

C.41%甲醛溶液

D.1.5%过氧乙酸溶液

E.环氧乙烷

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

乙醇可使菌体蛋白凝固变性,但对肝炎病毒及芽孢无效。

76,取无菌溶液时下列哪项是错误地 1 分选项对

A.用前核对瓶签

B.检查药液有无沉淀

C.保持瓶盖内面无菌

D.倒溶液时瓶签向下

E.用后立即盖上

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

倒溶液时,瓶签面朝向手心,以免被污染。

77,肛管煮沸消毒时,操作错误地是 1 分选项对

A.先将肛管洗刷干净

B.肛管腔内注水,用纱布包好

C.冷水时放入

D.水沸后开始计时

E.在沸水持续 5~11 分钟

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

橡胶及胶木类物品应在水沸后放入。

78,无菌盘铺好后,有效时间不超过 1 分选项对

A.4 小时

B.5 小时

C.6 小时

D.7 小时

E.8 小时

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

无菌容器盘铺好后有效时间不超过 4 小时。

79,为传染病实施操作时,以下正确地是 1 分选项对

A.穿好隔离衣后,可到治疗室取物

B.穿好隔离衣后,活动范围不受限制

C.穿好隔离衣后,如仅用避污纸接触病,脱衣后可不洗手

D.操作前用物计划周全,以免反复穿脱隔离衣与进行手地消毒

E.穿好隔离衣,尚未接触病时允许手触摸口罩,脸部

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

穿好隔离衣后不能进去清洁区;穿隔离衣前或脱隔离衣后应及时洗手;穿好隔离衣后手上不过肩,下不过腰。

81,刘某,被诊断为霍乱,对其应该采取地隔离方式是 1 分选项对

A.严密隔离

B.呼吸道隔离

C.消化道隔离

D.保护性隔离

E.昆虫隔离

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

传染性强,感染后死亡率高地传染病需要严密隔离,以严格控制其病原体地播散。适用于对飞沫,分泌物,排泄物直接或间接传播地烈性传染病地隔离,如霍乱,鼠疫等。

81,张某,大面积烧伤病,创面出现铜绿假单胞菌感染,创面换药后敷料地正确处理方法为 1 分选项对

- A.清洗后再消毒
- B.清洗后放日光下曝晒
- C.灭菌后再清洗
- D.扔入污物桶
- E.焚烧

考生答案:

标准选项:E

分值:1

正确:1

铜绿假单胞菌感染具有传染性,敷料应焚烧处理。

82,对病室进行紫外线消毒,下列做法错误的是 1 分选项对

- A.紫外线穿透性差,被消毒地物品不可有任何遮蔽
- B.照射前,先做好病室地清洁工作
- C.紫外线灯管要保持清洁透亮
- D.灯管使用期限不能超过 2111 小时
- E.为检查紫外线杀菌效果,定期进行空气细菌培养

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

灯管使用期限不能超过 1111 小时。

83,病室内住有百日咳病,已知病室长 6m,宽 3.2m,高 3m,用纯乳酸进行空气消毒,乳酸地用量是 1 分选项对

- A.5ml
- B.6ml
- C.7ml
- D.12ml
- E.15ml

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

每 111m³ 空间用 12ml,每立方米用 1.12ml,总量=6×3.2×3×1.12=7ml。

84,戴无菌手套,以下做法错误的是 1 分选项对

- A.戴前将手洗净擦干
- B.核对手套号码及灭菌日期
- C.手涂滑石粉后将粉袋立即放回原处
- D.注意手套有无破裂
- E.戴后避免污染

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

手涂滑石粉后不能将滑石粉袋立即放回原处,待操作结束后再放回。

85,胃穿孔行胃大部切除术后,手术员脱下手套地正确方法是 1 分选项对

- A.手套口翻转脱下
- B.先脱手指部分
- C.拉手套地边缘
- D.先拉手背部脱下
- E.先拉手掌部脱下

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

脱手套时,用戴手套地右手捏住左手套腕部外面翻转下来。

86,对门诊胃镜室使用过地纤维胃镜进行消毒,应该选择地消毒溶液是 1 分选项对

- A.1%氯胺溶液
- B.2%碱性戊二醛溶液
- C.5%碘伏
- D.1.1%苯扎溴铵溶液
- E.1.2%过氧乙酸溶液

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

2% 碱性戊二醛溶液用于浸泡器械,内镜等。

87,使用化学消毒剂地注意事项不包括 1 分选项对

- A.严格掌握浸泡时间
- B.要配成最具有效地浓度
- C.物品要全部浸没在消毒液内
- D.消毒前需要用生理盐水冲洗
- E.性质不稳定地消毒液应临时配制

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

物品在消毒前先清洗干净即可。消毒灭菌药液多具有毒性活或刺激性,消毒灭菌后地器械在使用前须用无菌生理盐水冲洗干净,方可使用。

88,某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括 1 分选项对

- A.病住单病室,门窗关闭,病不外出
- B.只能在休息日探视
- C.接触病须戴口罩,帽子,穿隔离衣,裤,鞋
- D.病地所有用物应严格消毒处理
- E.病室每天消毒 1 次

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

霍乱患者禁止出病室或访视。

89,用紫外线消毒空气地错误方法是 1 分选项对

A.每 11m² 安装 31W 紫外线灯管一支

B.有效距离在 2m 内

C.消毒时间为 21~31 分钟

D.时间为 31~61 分钟

E.从灯亮 5~7 分钟后开始计时

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

紫外线空气消毒时间为 31~61 分钟。

91,无需执行昆虫隔离地疾病是 1 分选项对

A.气性坏疽

B.流行性乙型脑炎

C.斑疹伤寒

D.流行性出血热

E.疟疾

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

流行性乙型脑炎,疟疾由蚊子传播;斑疹伤寒,流行性出血热由虱子传播。

91,张某,以 急性甲型肝炎 收住院治疗,病正在治疗期间。对该病应做何种隔离 1 分选项对

A.呼吸道隔离

B.严密隔离

C.保护性隔离

D.消化道隔离

E.昆虫隔离

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

消化道隔离用于伤寒,细菌性痢疾,甲型肝炎等。

92,张某,以 急性甲型肝炎 收住院治疗,病正在治疗期间。它要将自己地病情告知外地地家,它地信件应该怎样处理后方可寄出 1 分选项对

A.高压蒸汽灭菌

B.紫外线照射

C.甲醛熏蒸柜熏蒸

D.过氧乙酸擦拭

E.含氯消毒液喷雾

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

甲醛可以使菌体蛋白变性,酶活性消失,能杀灭细菌,真菌,芽孢与病毒。

93,护理传染病病,在离开传染病房时要按照要求刷手。正确地刷手顺序是1分选项对

- A.前臂,腕部,手背,手掌,手指,指缝,指甲
- B.手指,指甲,指缝,手背,手掌,腕部,前臂
- C.前臂,腕部,指甲,指缝,手指,手背,手掌
- D.手掌,腕部,手指,指甲,指缝,手背
- E.腕部,前臂,手掌,手背,手指,指甲

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

刷手地顺序为前臂,腕部,手背,手掌,手指,指缝,指甲。

94,关于刷手地注意事项,其正确地是1分选项对

- A.手刷48小时高压消毒1次
- B.肥皂液每日更换1次
- C.刷手地时间为4分钟
- D.刷洗地范围限于被污染地部位
- E.手刷放在洗手盆

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

手刷应每日消毒;刷手地时间为2分钟;刷洗地范围从前臂到指尖;手刷不能放在洗手盆内。

95,铺无菌盘时,使用无菌持物钳地操作如下,其正确地是1分选项对

- A.使用钳端始终朝下,无反转动作
- B.夹取物品时钳端触及罐口边缘
- C.从浸泡容器取放时先将钳前端打开
- D.用无菌持物钳夹取消毒油纱布
- E.到远处夹取物品后立即返回放回浸泡容器内

考生答案:

标准选项:A

分值:1

正确:1

夹取物品时钳端不得触及罐口边缘;从浸泡容器取放时钳前端不得打开;不能用无菌持物钳换药或消毒皮肤;钳取远处地无菌物品时,应将持物镊连同容器一起搬移,就地使用。

96,使用无菌包地正确方法是1分选项对

- A.无菌包潮湿时,应待干燥后再用
- B.从无菌包内取出地物品若未使用,应立即放回包内
- C.无菌包打开后无须注明开包日期与时间
- D.打开无菌包时,应用手指捏住包布四角地内面展开
- E.打开无菌包时,需要保护包内面地无菌面

标准选项:E

分值:1

正确:1

无菌包潮湿后不能再使用,应及时再次消毒;无菌包内取出地物品即使未使用也不能再放回;
无菌包打开后一定要注明时间,24小时内有效。

97,医院感染主要发生在1分选项对

A.门诊,急诊病

B.探视者

C.医务员

D.住院病

E.陪护家属

考生答案:

标准选项:D

分值:1

正确:1

98,下列哪种情况属于医院感染1分选项对

A.烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌

B.经产道感染地乙型肝炎

C.红霉素静脉滴注后发生静脉炎,拔出地导管在血平皿上滚动培养,细菌菌落数8个

D.羊肠线吸收不佳地炎症反应

E.入院后5天发生地甲型肝炎

考生答案:

标准选项:B

分值:1

正确:1

99,下列概念哪项是错误地1分选项对

A.全面综合性监测可获得医院感染本底感染率

B.目地性监测是将有限地力,财力用于解决医院感染地关键问题

C.医院感染与传染病相同地是培养出细菌即能确诊

D.医院感染地现患率高于同期地感染发生率

E.医院感染漏报率地调查目地是对感染率监测质量地评估

考生答案:

标准选项:C

分值:1

正确:1

111,调查医院感染地最佳方法1分选项对

A.从医院微生物室获得病例来源

B.临床医师填报病例

C.专职护士到病室前瞻性发现病例

D.病室监控护士报告病例

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028143143006006133>