

一、單項選擇題

- 1 《抗菌藥物臨床應用管理措施》已于2月13日經衛生部部務會審議通過，現予以公布，自（A）起施行。
- A 8月1日 B 9月1日
C 5月1日 D 6月1日
- 2 (B) 負責本行政區域內醫療機構抗菌藥物臨床應用的監督管理。
- A 市級以上地方衛生行政部門 B 縣級以上地方衛生行政部門
C 市級以上地方醫療機構 D 縣級以上地方醫療機構
3. 有關亞胺培南-西司他丁鈉（泰能），下列說法不對的是（C）
- A. 是一種廣譜的β-內酰胺類抗菌藥物
B. 推薦的每天最高總劑量不超過每天50毫克/公斤體重或每天4克
C. 亞胺培南與西司他丁鈉的重量比為2:1
D. 嗜麥芽窄食單胞菌感染時不適合選用
4. 有關注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉，下列說法不對的是（B）
- A. 對青霉素或頭孢菌素類抗生素過敏者禁用
B. 成人每平常用量為4-6克
C. 應用本品時應防止飲用品有酒精的飲料
D. 部分病人用本品可引起維生素K缺乏和低凝血酶原血症
5. 抗菌藥物分級管理目錄由各（B）制定，報（）立案。
- A 市級衛生行政部門制定 省級衛生行政部門
B 省級衛生行政部門 衛生部
C 當地醫療機構 當地衛生行政部門
D 當地醫療機構 上級衛生行政部門
6. 有關頭孢菌素類藥物，下列說法不對的是（D）。
- A. 一代頭孢對革蘭陽性菌作用強，對革蘭陰性菌作用弱
B. 三代頭孢對革蘭陰性菌作用強，對革蘭陽性菌作用弱
C. 一、二代頭孢對銅綠假單胞菌幾乎無作用，而三代頭孢中頭孢哌酮，頭孢他啶等有作用
D. 頭孢吡肟、頭孢米諾屬於第四代頭孢菌素
- 7、氟康唑和伊曲康唑不推薦用於幾種月如下嬰兒？（C）
- A.2 B.4 C.6 D.8 E.10
- 8 對的的抗菌治療方案需考慮：（D）。
- A 患者感染病情 B.感染的病原菌種類
C.抗菌藥作用特點 D.以上都對
9. 可輔以抗菌藥局部應用的狀況有：（C）
- A 化膿性胸膜炎大量胸腔積液 B 反復發作性尿路感染
C 包裹性厚壁膿腫 D 化膿性腹膜炎
10. 下列哪種狀況有抗菌藥聯合用藥指征：（B）
- A 慢支急性發作 B 病原菌尚未查明的嚴重細菌感染
C 急性腎盂腎炎 D 急性細菌性肺炎
11. 抗菌藥物分級管理是為了（C）
- A 規範抗菌藥物按一、二、三線使用 B 按感染病情輕重分別用藥
C 抗菌藥物臨床合理使用的管理

12. 限制使用类抗菌药是限制：(A)
 A 抗菌药应用适应证和合用人群 B 限制抗菌药作二线使用
 C 限制抗菌药用于重症感染患者
13. 下列状况何种是防止用药的适应证(D)
 A 昏迷 B 中毒 C 上呼吸道感染 D 人工关节移植手术
14. 防止用药用于何种状况也许有效 (D)
 A 用于防止任何细菌感染 B 长期用药防止
 C 晚期肿瘤患者 D 风湿热复发
15. 外科手术前防止用药应在何时使用 (B)
 A 手术开始前 24 小时 B 术前 0.5-2 小时内
 C 手术开始后 2 小时 D 手术结束后 2 小时
16. 手术前防止用药目的是防止 (D)
 A 切口感染 B 手术深部器官或腔隙的感染
 C 肺部感染 D 切口感染和手术深部器官或腔隙感染
17. 外科手术防止用药多数不超过(B)
 A 手术后 3 天 B 术后 24 小时 C 术后 1 周 D 用至患者出院
18. 肝功能减退时，不需调整给药剂量的药物为 (D)
 A 红霉素酯化物 B 利福平 C 氟康唑 D 头孢他啶
19. 肾功能减退时，需调整给药剂量的药物为(A)
 A 头孢唑林 B 克林霉素 C 利福平 D 大环内酯类
20. 新生儿感染时不适宜选用(D)
 A 头孢菌素 B 青霉素类 C 克林霉素 D 氨基糖苷类
21. 氨基糖苷类抗生素不适宜用于(D)
 A 腹腔感染 B 感染性心内膜炎 C 革兰阴性菌败血症 D 孕妇无症状菌尿
22. 下列哪种药物对铜绿假单胞菌不具抗菌活性(D)
 A 哌拉西林 B 头孢哌酮 C 头孢他啶 D 头孢噻肟
23. 大肠埃希菌所致尿路感染治疗不适宜选用(A)
 A 克林霉素； B SMZ/TMP； C 氨苄西林/舒巴坦； D 左氧氟沙星
24. 氨基糖苷类抗生素具一定耳肾毒性，合用于(B)
 A. 中耳炎； B 严重 G-b 感染； C 扁桃体炎； D 小儿尿路感染。
25. 肺炎链球菌、溶血性链球菌感染的首选药物为 (D)
 A. 氧氟沙星； B 头孢他啶； C 庆大霉素； D 青霉素
26. 治疗甲氧西林耐药葡萄球菌感染时首选：(D)
 A. 氨苄西林/舒巴坦 B 头孢唑林 C 克林霉素 D 万古霉素
27. 妊娠期可以选用的抗菌药物有(D)
 A. 庆大霉素 B 环丙沙星 C 克拉霉素 D 哌拉西林
28. 治疗艰难梭菌引起的假膜性肠炎可选用(D)
 A 甲硝唑 B 诺氟沙星 C 氨苄西林 D 克林霉素
29. 治疗厌氧菌感染可以选用：(D)
 A 氨基糖苷类 B 头孢唑林 C 环丙沙星 D 甲硝唑
30. I 类切口手术防止使用抗菌药物比例不超过 (B)
 A 20% B 30% C 40% D 50%
31. 氨基糖苷类对如下那种细菌抗菌活性差(B)

- A 大肠埃希菌 B 肺炎链球菌 C 铜绿假单胞菌 D 肺炎克雷伯菌
32. (A) 是本机构抗菌药物临床应用管理的第一负责人
A 医疗机构重要负责人 B 医疗机构分管院长
C 医疗机构医务科 D 医疗机构药剂科
33. 有关头孢呋辛的应用, 對的的有(C)
A 成人常用量为每次 1.5~3 克 2.25--6g B 每 6 小时给药 必要时可 q6h
C 每 8 小时给药 D 每 12 小时给药
34. (C) 应当配置抗菌药物等有关专业的临床药师。
A 所有医院 B 三级医院 C 二级以上医院
35. 链球菌引起的化脓性扁桃体炎, 由于耐药尽量不选择哪种抗菌药物(A)
A 大环内酯类药; B 头孢菌素类; C 青霉素; D 喹诺酮类药
36. 如下不属于大环内酯类药物的是: (B)
A 红霉素; B 庆大霉素; C 阿奇霉素; D 克拉霉素
37. 消除半衰期短者, 应一日多次给药:(D)
A 青霉素类; B 头孢菌素类和其他 β 内酰胺类; C 红霉素、克林霉素
D 以上都对
38. 临床药师负责对本机构抗菌药物临床应用 (D)。
A 提供技术支持 B 指导患者合理使用抗菌药物 C 参与抗菌药物临床应用管理工作 D 以上全对
39. 所谓合理用药是指(D)
A 选择對的药物和给药途径; B 要以最小的社会消耗获得最大的社会效果;
C 安全; D 以上都对
40. 抗菌药物的使用状态在人体内构成了哪三方面的关系? (A)
A: 药物和细菌、药物和人体、人体和细菌之间的关系;
B: 抗原和抗体、抗原和补体、抗体和补体之间的关系;
C: 药物和细菌、药物和人体、药物和抗体之间的关系;
D: 药物和细菌、药物和人体、抗体和细菌之间的关系
41. 我国抗菌药物使用不合理的状况有(D)
A: 有适应症却没有用;
B: 该用高剂量的时候的剂量局限性;
C: 没有适应症却用了, 或使用抗菌药物剂量过大、疗程过长;
D: 以上都对
42. 价格昂贵的抗菌药物在抗菌分级管理规定中一般列为 (C) 使用抗菌药物。
A. 非限制使用 B. 限制使用 C. 特殊使用
43. 下列哪种状况有抗菌药联合用药指征 (B)
A 慢支急性发作 B 病原菌尚未查明的严重细菌感染
C 急性肾盂肾炎 D 急性细菌性肺炎
47. 下列哪种药物为第二代头孢菌素 (D)
A. 头孢硫脒 3 代 B. 头孢地尼 3 代 C. 头孢噻肟 3 代 D: 头孢尼西
44. 根据《卫生部办公厅有关抗菌药物临床应用管理有关问题的告知》(卫办医政发【】38 号) 文献, 氟喹诺酮类药物的经验性治疗可用于 (D) 感染, 其他感染性疾病治疗要在病情和条件许可的状况下, 逐渐实现参照致病菌药敏试验成果或当地细菌耐药监测成果选用该类药物。
A. 肠道感染

- B.小区获得性呼吸道感染
C.小区获得性泌尿系统感染
D 以上都對
45. 临床微生物室開展(D)
A 微生物培养、分离、鉴定和药物敏感试验等工作
B 提供病原學诊断和细菌耐药技术支持
C 参与抗菌药物临床应用管理工作
D 以上全對
46. 青霉素 G 最常見的不良反應是 (D)
A. 肝肾损害 B. 耳毒性
C. 胃肠道反应 D. 過敏反应
47. 细菌對青霉素产生耐药性的机制是 (B)
A. 细菌的代謝途径变化
B. 细菌产生了水解酶
C. 细菌细胞膜對药物通透性变化
D. 细菌产生了大量 PABA(對氨基甲酸)
E. 细菌产生了钝化酶
48. 治疗钩端螺旋体病应首选的抗生素是 (D)
A. 紅霉素 B. 氯霉素 C. 链霉素 D. 青霉素 G
49. 對阿莫西林描述錯誤的是 (A)
A. 對肺炎双球菌、变形杆菌的杀菌作用较氨基苄西林弱
B. 胃肠道吸取良好
C. 為對位羟基氨基苄西林
D. 抗菌谱、抗菌活性与氨基苄西林相似
E. 用于下呼吸道感染的治療
56. 治疗金黄色葡萄球菌引起的骨髓炎应选 (D)
A. 頭孢唑啉 B. 多粘菌素 E C. 链霉素
D. 林可霉素 E. 紅霉素
57. 頭孢菌素中抗绿脓杆菌作用最强的是 (B)
A. 頭孢曲松 B. 頭孢他啶 C. 頭孢哌酮
D. 頭孢噻吩 E. 頭孢氨苄
58. 對頭孢菌素描述錯誤的是 (E)
A. 第一、第二代药物對肾脏均有毒性
B. 与青霉素仅有部分交叉過敏現象
C. 抗菌作用机制与青霉素类似
D. 与青霉素类有协同抗菌作用
E. 第三代药物對革兰阳性菌和革兰阴性菌的作用均比第一、第二强
59. 對大环内酯类抗生素的描述, 錯誤的是 (A)
A. 本类细菌對各药间有完全的交叉耐药性
B. 酯化衍生物可增長口服吸取
C. 不易透過血脑屏障
D. 口服重要不良反應為胃肠道反应
E. 抗菌谱窄, 比青霉素略广
60. 紅霉素的重要不良反應是 (D)

-) 紅霉素的不良反應有胃腸道反應，過敏反應，肝臟反應。
 A. 耳毒性 B. 肝損傷 C. 過敏反應 D. 胃腸道反應 E. 二重感染
61. 治療支原體肺炎宜首選的藥物是 (C)
 A. 鏈霉素 B. 氯霉素 C. 紅霉素 D. 青霉素
62. 對青霉素過敏的革蘭陽性菌感染者可用 (A)
 A. 紅霉素 B. 氨苄西林 C. 羧苄西林 D. 苯唑西林
63. 萬古霉素的抗菌作用機制是 (E)
 A. 干擾細菌的葉酸代謝 B. 影響細菌胞膜的通透性
 C. 克制細菌蛋白質的合成 D. 克制細菌核酸代謝
 E. 阻礙細菌細胞壁的合成
64. 急救鏈霉素過敏性休克宜選用的藥是 (A)
 A. 葡萄糖酸鈣 B. 地高辛 C. 苯海拉明
 D. 地塞米松 E. 去甲腎上腺素
65. 廣譜抗菌藥物長期大量應用易導致 (C)
 A 過敏反應 B 雙硫倫樣反應 C 菌群失調 D 聽神經損害
66. 如下耳、腎毒性最低的藥物是 (E)
 A. 西索米星 B. 慶大霉素 C. 妥布霉素
 D. 阿米卡星 E. 奈替米星
67. 有關鹽酸左氧氟沙星注射液，下列說法錯誤的是 (D)
 A 妊娠期婦女禁用
 B 本品不可以用於小兒
 C 本品應防止與茶鹼同步使用
 D 本品可用於圍手術期防止用藥
- 68 呼吸機有關肺炎是指機械通氣 \geq ()小時後和停用呼吸機、拔除人工氣道導管()小時後內發生的新的感染性肺實質炎症。(A)
 A 48, 48 B 24, 48 C 48, 72 D 72, 72
- 69 機械通氣最初 (B) 天內發生者為早發性呼吸機有關肺炎
 A 3 , B 4 , C 5 , D 2
70. 不是氟喹諾酮類藥物的共同特點是 (B)
 A. 口服吸取好 B. 細菌對其不產生耐藥性
 C. 抗菌譜廣 D. 抗菌作用強 E. 不良反應少
71. 服用磺胺時，同服小蘇打是由於 (A)
 A. 減少不良反應 B. 增強抗菌活性 C. 擴大抗菌譜
 D. 增進磺胺藥的吸取 E. 延緩磺胺藥的排泄
72. 阿昔洛韋重要合用的疾病是 (D)
 A. 甲狀腺功能亢進 B. 結核病 C. 白色念珠菌感染
 D. DNA 病毒感染 E. 血吸蟲病
73. 有關頭孢噻吩鈉藥物過量，對的的有 (D)
 A. 本品無特效拮抗藥
 B. 可予以對症治療，大量飲水及補液
 C. 可為血液透析和腹膜透析清除
 D. 以上都對
74. 磺胺類藥物通過克制下列哪種酶而起作用 (C)
 A. 一碳基團轉移酶 B. 二氫葉酸還原酶

- C. 二氢叶酸合成酶 D. β -内酰胺酶 E. DNA 回旋酶
- 75 在下列药物中，有神经肌肉阻滞不良反应的药物为(C)
- A. 青霉素 B. 氟喹诺酮类 C. 氨基糖苷类 D. 头孢菌素
- 76 下列药物中不属于 β -内酰胺类的是(E)
- A. 拉氧头孢 B. 头孢曲松 C. 哌拉西林 D. 氨曲南 E. 舒巴坦
- 77 控制医院感染最简朴最有效最以便最经济的措施是(C)
- A. 环境消毒 B. 合理使用抗菌素 C. 洗手 D. 隔离传染病人
- 78 加强抗菌药物的合理应用，如下哪种说法是错误的(A)
- A. 不必执行抗菌药物临床应用的基本原则
B. 對的合理的实行抗菌药物给药方案
C. 加强抗菌药物临床合理应用的管理
D. 减少或者延缓多重耐药的产生
- 79 下列抗菌药物中，对于老年人和小朋友最安全的品种是(C)
- A. 氟喹诺酮类 B. 氨基糖苷类 C. β -内酰胺类 D. 氯霉素类
- 80 女婴，5天，发热昏迷入院，皮肤黄染，囟门饱满，病理反射阳性，脑脊液有大量中性粒细胞，首选(B)
- A. 氯霉素 B. 青霉素 G C. 磺胺嘧啶 D. 头孢哌酮 E. 庆大霉素
- 81 三级医院购进抗菌药物品种不得超过(B)种。二级医院不得超过35种
- A. 35 B. 50 C. 60 D. 70
- 82 目前医院内抗菌药物使用率高的影响是(D)
- A. 减轻病人的经济承担 B. 减少抗菌药物有关的药物不良反应
C. 节省卫生资源 D. 导致细菌耐药性的产生
- 83 下列药物中，体外抗菌活性最强的是(D)
- A. 氧氟沙星 B. 诺氟沙星 C. 洛美沙星 D. 环丙沙星 E. 氟罗沙星
- 84 下列药物中属于四代头孢的抗菌药物是(D)
- A. 头孢哌酮 B. 头孢西丁 2代 C. 头孢噻肟 D. 头孢吡肟
- 85 下列药物中属于二代头孢的抗菌药物是(B)
- A. 头孢噻吩 B. 头孢尼西 C. 头孢西丁 D. 头孢噻肟
- 86 下列药物中属于一代头孢的抗菌药物是(A)
- A. 头孢噻吩 B. 头孢尼西 C. 头孢西丁 D. 头孢噻肟
- 87 下列哪些药物属于杀菌药(A)
- A. 青霉素类 B. 氯霉素类 C. 大环内酯类 D. 磺胺类
- 88 下列药物组合有协同作用的是(D)
- A. 青霉素+螺旋霉素 B. 青霉素+四环素
C. 青霉素+四环素 D. 青霉素+庆大霉素
- 89 青霉素在体内的重要消除方式(B)
- A. 肝脏代谢 B. 肾小管分泌排泄 C. 被血浆酶破坏 D. 肾小球滤过
- 90 具有一定肾脏毒性的 β -内酰胺类抗生素是(C)
- A. 第三代头孢菌素 B. 第二代头孢菌素 C. 第一代头孢菌素 D. 天然青霉素
- 91 对铜绿假单胞菌感染无效的抗生素是(C)
- A. 羧苄西林 B. 头孢哌酮 C. 头孢尼西 D. 庆大霉素
- 92 对幽门螺旋杆菌作用较强的 β -内酰胺类抗生素是(D)
- A. 青霉素 B. 氨苄西林 C. 氯唑西林 D. 阿莫西林
- 93 大环内酯类抗生素对哪种病原微生物无效(C)

- A G+球菌 B G-球菌 C 大肠杆菌 D 军团菌 E 立克次体
- 94 呋塞米可增长下列哪种药物的耳毒性 (D)
A 四环素 B 青霉素 C 磺胺嘧啶 D 链霉素
- 95 磺胺甲噁唑口服用于全身感染时与甲氧苄啶合用的原因 (A)
A 增长抗菌作用 B 减少口服时的刺激 C 减少尿中磺胺结晶析出 D 减慢磺胺药的代谢
- 96 可局部用于治疗皮肤、口腔及阴道念珠菌感染的药物是 (D)
A 两性霉素 B 多黏霉素 C 四环素 D 制霉菌素
- 97 治疗急慢性骨及关节感染宜选用 (A)
A 克林霉素 B 多西环素 C 吉他霉素 D 青霉素
- 98 不良反应最小的咪唑类抗真菌药是 (C)
A 酮康唑 B 咪康唑 C 氟康唑 D 克霉唑
- 99 丙磺舒与青霉素合用可增强青霉素疗效，其原因是 (D)
A 延缓抗药性的产生 B 在杀菌作用上有协同作用 C 对细菌代谢有双重阻断作用 D 竞争性克制青霉素肾小管的分泌
- 100 对铜绿假单胞菌和耐药金葡萄菌均无效的是 (A)
A 阿莫西林 B 哌拉西林 C 苯唑西林 D 头孢他啶
- 101 抗菌药物的选择及其合理使用是控制和治疗院内感染的关键和重要措施。不符合合理使用抗生素的原则的是 (D):
A. 病毒性感染者不用
B. 尽量防止皮肤粘膜局部使用抗生素
C. 联合使用必须有严格指征
D. 发热原因不明者若无明显感染的征象可少许应用
- 102 下列抗生素中不属于杀菌剂的是: (B)
A. 喹诺酮类
B. 大环内酯类 抑菌
C. 糖肽类 杀菌
D. 头孢菌素类 杀菌
- 103 某患者3周前忽然发冷，发热 T39°C，按肺炎治疗未愈，一周前开始咳大量脓臭痰，痰培养为脆弱类杆菌，胸片示右上肺大片致密影及大空洞，不可选用的抗生素是 (C)
A. 甲硝唑
B. 氯林可霉素
C. 青霉素
D. 洁霉素
E. 替硝唑
- 104 经验性使用抗菌药物应考虑 (E)
A、某类(种)感染病原谱及其流行病学分布规律 B、病情 C、抗菌药物知识
D、耐药状况 E、以上均是
- 104 抗生素治疗牙周病的原则是 (B)
A. 用于牙周基础治疗效果好的患牙
B. 用于急性感染的牙周疾病
C. 尽量使用抗需氧菌抗生素
D. 与特殊细菌有关的早发性牙周疾病尽量采用全身给药途径

- ? 105、越权限使用上一级抗菌药物时间权限为 (C)
 A、8 小时 B、12 小时 C、24 小时 D、48 小时
106. 对头孢菌素描述错误的是 (E)
 A. 第一、第二代药物对肾脏均有毒性 B. 与青霉素仅有部分交叉过敏反应
 C. 抗菌作用机制与青霉素类似 D. 与青霉素类有协同抗菌作用
 E. 第三代药物对革兰阳性菌和革兰阴性菌的作用均比第一、第二强
- 107 易透过血脑屏障进入脑脊液的抗真菌药是 (E)
 A. 制霉菌素 B. 灰黄霉素 C. 咪康唑 D. 酮康唑 E. 氟康唑
- 108、细菌耐药率超过 (A) 的抗菌药物，应将预警信息及时通报有关医务人员？ A、30% B、40% C、50% D、60%
- 109 对万古霉素描述错误的是 (C)
 A. 仅对革兰阳性菌有强大杀菌作用 B. 细菌对它不产生耐药性
 C. 与其他抗生素有交叉耐药性 D. 治疗耐青霉素金黄色葡萄球菌所致的严重感染
 E. 较大剂量，严重可致耳聋及听力损害
- 110 治疗克林霉素所致假膜性肠炎应选 (B)
 A. 环丙沙星 B. 万古霉素 C. 红霉素 D. 氯霉素 E. 头孢氨苄
- 111 下列哪种药物对克林霉素所致假膜性肠炎有效 (C)
 A 红霉素 B 林可霉素 C 万古霉素 D 阿奇霉素
- 112 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效 (D)
 A G-菌 B 铜绿假单胞菌 C 结核杆菌 D 厌氧菌
113. 药学专业技术人员调剂处方时必须做到 (D)。
 A. 三查七对 B. 三查拾对 C. 四查七对 D. 四查拾对
- 114、卫办医政发 () 38 号文献规定：应严格控制 (C) 药物作为外科围手术期防止用药。A 头孢菌素类 B、氨基糖苷类 C、氟喹诺酮类 D、大环内酯类
- 115、肝功能减退的感染患者，应防止使用 (C)。
 A. 去甲万古霉素 B. 头孢他啶 C. 利福平 D. 头孢曲松
- 116、引起医院内感染的致病菌重要是 (B)。
 A. 革兰阳性菌 B. 革兰阴性菌 C. 真菌 D. 支原体
- 117、根据卫办医政发 () 38 号文的规定，氟喹诺酮类药物的经验性治疗不可用于 (A)。
 A. 院内获得性呼吸道感染 B. 社区获得性呼吸道感染
 C. 肠道感染 D. 社区获得性泌尿系统感染
- 118、加强抗菌药物的合理应用，如下哪种说法是错误的？ (A)
 A 不必执行抗菌药物临床应用的基本原则 B 对的、合理地实行抗菌药物给药方案
 C 加强抗菌药物临床合理应用的管理 D 减少或者延缓多重耐药菌的产生
- 119、治疗产 ESBLs (肺炎克雷伯菌超广谱 β -内酰胺酶) 菌感染首选 (D)。
 A. 碳青霉烯类、酶抑制剂复合制剂 B. 三代头孢、氨基糖苷类
 C. 氟喹诺酮类、氨基糖苷类 D. 酶抑制剂复合制剂、头霉素类
- 120、甲状腺手术一般不需要使用抗菌药物，如需用药应选 (A)
 A、一代头孢菌素类 B、氨基糖苷类
 C、氟喹诺酮类 D、二代头孢菌素类
- 121、剖宫产手术，围手术期用药对的说法是：(C)

-)
- A、剖宫产手术防止用药应首选大环内酯类药物
B、剖宫产手术术前用药应在术前 30 分钟至 2 小时内给药。
C、剖宫产手术围手术期宜选择一代头孢菌素，应在结扎脐带后给药。
D、以上都不对
- 122、围手术期给药时，当患者对 β -内酰胺类抗菌药物过敏者，可选用 (A)
防止葡萄球菌、链球菌感染。
A、克林霉素 B、氨曲南 C、环丙沙星 D、阿奇霉素
- 123、围手术期给药时，当患者对 β -内酰胺类抗菌药物过敏者，可选用 (B)
防止革兰氏阴性杆菌感染。
A、克林霉素 B、氨曲南 C、环丙沙星 D、阿奇霉素
- 124、I 类切口手术常用防止抗菌药物为 (A)
A、头孢唑啉 B、头孢噻肟
C、头孢硫脒 D、头孢呋辛
- 125、防止感染、治疗轻度或者局部感染应当首先选用 (A) 抗菌药物
A、非限制使用级 B、限制使用级 C、特殊使用级 D、以上都对
- 126、下列哪个药物不适宜作为围手术期防止用药 (C)
A、头孢唑啉 B、头孢呋辛 C、阿奇霉素 D、头孢曲松
- 127 老年感染患者一般不适宜选用：(C)
A 青霉素类 B 克林霉素 C 氨基糖苷类 D 头孢菌素类
- 128、专题整改活动方案规定，医院门诊、住院患者抗菌药物使用率分别不超过
(B) A、20% 50% B、20% 60% C、30% 70% D、30% 80%
- 129、专题整改活动方案规定 I 类切口手术患者防止使用抗菌药物比例不超过
(B) A、20% B、30% C、40% D、50%
- 130、专题整改活动方案规定抗菌药物使用强度力争控制在 (C) DDD 如下
A、20 B、30 C、40 D、50
- 131、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检查样本送检率不低于 (B)
A、20% B、30% C、40% D、50%
- 132、抗菌药物临床应用专项治理中抗菌药物不包括 (D)
A、抗细菌药 B、抗衣原体、支原体、立克次体螺旋体药
C、抗真菌药 D、抗病毒、寄生虫药
- 133、世界卫生组织对合理使用药物的定义是 (D)
A、患者能得到适合于他们的临床需要和个体需要的药物以及对的用药措施
B、药物必须质量可靠、可获得 C、药物必须可承担得起 D、以上全都是
- 134、合理用药原则包括 (D) A、安全 B、有效 C、经济 D、以上均是
- 135、增进合理用药的重要措施对的有 (E)
A、制定合理用药有关的临床应用指南 B、严格医师和药师资质，建立抗菌药物分级管理 C、建立抗菌药物临床应用和细菌耐药监测体系
D、加大监督管理力度，严厉查处抗菌药物使用不合理状况 E、以上均是
- 136、抗菌药物分几级进行管理 (C) A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
- 137、抗菌药物分级管理“限制使用类”抗菌药物使用权限为 (B)
A、住院医以上 B、主治医师以上 C、副主任医以上 D、主任医师
- 138、经验性使用抗菌药物应考虑 (E)
A、某类(种)感染病原谱及其流行病学分布规律

B、病情 C、抗菌药物知识 D、耐药状况 E、以上均是

- 139、细菌耐药率超过（ A ）的抗菌药物，应将预警信息及时通报有关医务人员？ A、30% B、40% C、50% D、60%
- 140、细菌耐药率超过多少的抗菌药物，应当暂停临床应用（ A ）
A、75% B、80% C、90% D、50%
- 141、每张处方不得超过（ C ）种药物。A、3 B、4 C、5 D、不限
- 142、处方开具当日有效。特殊状况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不得超过（ B ）天。A、2 B、3 C、4 D、7
- 143、处方管理措施规定医疗机构予以取消医师处方权的情形有：（ E ）
A、被责令暂停执业；被注销、吊销执业证书； B、考核不合格离岗培训期间；
C、不按照规定开具处方或使用药物，导致严重后果的；
D、因开具处方牟取私利 E、以上均是
- 144、如下哪种抗菌药物的作用机理是破坏细菌的细胞壁（ C ）。
A、红霉素 B、四环素 C、青霉素 D、庆大霉素
- 145、如下哪类抗菌药物的作用机理是克制细菌 DNA 的合成（ C ）。
A、四环素类 B、氨基糖甙类 C、喹诺酮类 D、磺胺类
- 146、如下属于时间依赖性抗菌药物的是（ C ）。
A、妥布霉素 B、环丙沙星 C、替卡西林 D、万古霉素
- 147、联合用药的缺陷是（ D ）。
A、有时可使药物疗效减少，并且出现毒副反应的也许性比单一用药要高
B、费用会大量增长 C、假如不恰当的联合使用，会导致耐药性 D、以上皆是
- 148、如下不属于广谱抗生素的是（ B ）。
A、氯霉素 B、氨曲南 C、四环素 D、诺氟沙星
- 149、长期用喹诺酮药物会引起心电图发生什么变化（ B ）。
A、T波倒置 B、QT间期延长 C、出现U波 D、PR间期延长
- 150、喹诺酮药物的不良反应有哪些（ D ）。
A、中枢神经系统的兴奋性增长和光毒性 B、骨关节损害和跟腱炎
C、心脏的损害和肝毒性 D、以上皆是
- 151、在头孢菌素中，抗阳性菌活性最强的是（ A ）。
A、一代头孢 B、二代头孢 C、三代头孢 D、四代头孢
- 152、如下抗菌药中，抗菌谱最广的是（ D ）。
A、青霉素 B、万古霉素 C、哌拉西林 D、阿莫西林
- 153、对绿脓杆菌有效的头孢菌素是（ B ）。
A、头孢唑啉 B、头孢他啶 C、头孢氨苄 D、头孢拉定
- 154、肺炎链球菌重要对哪种抗菌药耐药（ C ）。
A、喹诺酮类 B、头孢菌素 C、大环内酯类 D、氨基糖苷类
- ?? 155、产 ESBL 肺炎克雷伯菌流行时，应限制（ A ）。
A、头孢菌素类 B、四环素类 C、氨基甙类 D、喹诺酮类
- 156、在葡萄球菌的耐药菌株中，最常见的是（ A ）。
A、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 B、表皮葡萄球菌
C、腐生葡萄球菌 D、白葡萄球菌
- 157、青霉素类的药物对如下哪些细菌不敏感（ D ）。
A、肺炎链球菌 B、绿脓杆菌 C、金黄色葡萄球菌 D、肠球菌
- 158、针对耐药菌，可以采用的措施是（ D ）。
A、理解病人对细菌的耐药状态 B、针对耐药研发某些新的抗菌药物

- C、合理用药 D、以上皆是
- 159、下列哪项药物联合是有利的互相作用（ C ）
A、多潘立酮与 654-2 B、链霉素与庆大霉素
C、异烟肼与乙胺丁醇 D、四环素与钙剂
- 160、喹诺酮类也许引起新生儿：（ A ）
A、软骨损害 B、肾毒性 C、耳毒性 D、心肌损害
- 161、肝功能减退感染患者应防止使用的抗菌药物是：（ A ）
A、磺胺药 B、青霉素 C、头孢唑啉 D、头孢他啶
- 162、VRE 代表何种耐药菌：（ D ）
A、青霉素耐药肺炎链球菌 B、甲氧西林耐药金葡萄菌
C、耐甲氧西林表葡萄菌 D、万古霉素耐药肠球菌
- 163、醫院感染中常见的 MRSA 是指何种耐药细菌？（ A ）
A、甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌 B、耐万古霉素金黄色葡萄球菌
C、铜绿假单胞菌 D、大肠艾希菌
- 164、青霉素及大多短半衰期头孢菌素类抗菌药物使用措施对的是（ A ）
A、溶于 100ml 氯化钠中迅速(30min)静滴或溶于 20~40ml 氯化钠中缓慢(5min)静推，每隔 3~4 个半衰期给药一次 B、每日一次给药
C、加葡萄糖中静滴 D、青霉素钾盐可迅速静脉注射 E、可加入碱性溶液
- 165、有关药物互相作用描述错误的是（ A ）
A、对象为一种药物 B、同步或先后经相似或不一样途径给药时
C、药物原有的作用发生减弱 D、出现不应有的效应
- 166、药物的体内过程是（ A ）
A、吸取、分布、代谢和排泄 B、分布 C、排泄 D、以上全不是
- 167、清洁手术患者防止应用抗菌药最佳是在皮肤切开前（ A ）。
A、半小时 B、6 小时 C、12 小时 D、24 小时
- 168、一般状况，清洁手术术后用抗菌药一般不超过（ B ）。
A、12 小时 B、24 小时 C、48 小时 D、72 小时
- 169、短时间防止性使用抗菌药物的长处是（ D ）
A、减少毒副作用 B 不易产生耐药菌株 C、不易引起微生态紊乱 D、以上都对
- 170、手术部位醫院感染的防止中，手术前应注意（ D ）
A、治疗原发病 B、加强营养 C、对的的术前皮肤准备 D、以上都对
- 171、影响手术部位感染确定的与宿主有关危险因素：（ A ）
A、疾病严重指数 B、远隔感染灶 C、鼻腔携带金葡萄菌 D、以上都是
- 172、卫生部公布的《中国国家处方集》是中国第一部统一的国家级权威性的处方集，处方集的编写和公布的目的是（ D ）
A、规范医疗行为 B、提高临床药物应用水平 C、贯彻临床途径管理 D、以上均是
- 173、新生儿感染治疗不适宜选用：（ A ）
A 环丙沙星 B 头孢曲松 C 青霉素 D 以上都是
- 174、妊娠期不适宜选用的抗菌药有：（ C ）
A 青霉素 B 头孢呋辛 C 环丙沙星 D 磷霉素
- 175、成人伤寒沙门菌感染的治疗，首选药物（ B ）
A 氯霉素 B 喹诺酮 C 氨苄西林 D 万古霉素
- 176、老年人和小朋友在应用抗菌药时，最安全的品种是（ C ）：

A. 氟喹诺酮类 B. 氨基糖苷类 C. β -内酰胺类 D. 氯霉素类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/035012230014012002>