

2024 年广西壮族自治区都安瑶族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题王牌题库【综合卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 立克次体感染首选

- A: 四环素
- B: 头孢菌素
- C: 氯霉素
- D: 多黏菌素

答案：A

2. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

- A: 丙酸睾酮
- B: 甲睾酮
- C: 他达拉非
- D: 西地那非

答案：D

3. 硫脲类药物的基本作用是

- A: 抑制 $\text{Na}^{+}-\text{K}^{+}$ 泵
- B: 抑制碘泵
- C: 抑制甲状腺蛋白水解酶
- D: 抑制甲状腺素的生物合成

答案：D

4. 通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用用于治疗痤疮的药物是
()

- A: 壬二酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 维 A 酸
- D: 阿达帕林

答案：B

5. 烟酸缺乏时发生

- A: 成人佝偻病
- B: 脚气病
- C: 夜盲症
- D: 糙皮病

答案：D

6. 常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

- A: 男子乳房女性化
- B: 锥体外系反应
- C: 女性月经不调
- D: 室性心律失常

答案：B

7. 外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

- A: 环磷酰胺
- B: 聚甲酚磺醛
- C: 地屈孕酮
- D: 阿霉素

答案：B

8. 属于芳基乙酸类的是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：C

9. (2021 年真题) 患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片 (100mg/d) 预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是 ()。

- A: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术
- B: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血
- C: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血
- D: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术

答案：A

10. 治疗轻、中型糖尿病的是

- A: 磺酰脲类
- B: A 和 B 均无效
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：D

11. 长期大量服用维生素 K

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：B

12. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

A: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg

B: 每天化疗前，口服地塞米松 12mg

C: 每天化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂

D: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松 12mg

答案：A

13. 适用于吸烟的老年哮喘患者，且不易产生耐受性的药物是

A: 特布他林

B: 异丙托溴铵

C: 沙美特罗

D: 布地奈德

答案：B

14. 在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

A: 聚乙二醇 4000

B: 甘油

C: 酚酞

D: 乳果糖

答案：A

15. 不属于减鼻充血药的是()

- A: 色甘酸钠
- B: 麻黄碱
- C: 伪麻黄碱
- D: 羟甲唑啉

答案: A

16. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 50S 亚基
- B: 细胞内膜 PBP
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 核糖体的 30S 亚基

答案: B

17. (2020 年真题) 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 阿司匹林
- C: 华法林
- D: 头孢哌酮

答案: D

18. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

- A: 二甲双胍
- B: 普通胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 格列喹酮

答案: D

19. 患者，女，24 岁，妊娠 2 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 环丙沙星
- B: 青霉素 G
- C: 头孢哌酮
- D: 阿莫西林

答案：A

20. 关于哌替啶下列说法错误的是

- A: 本品与芬太尼可交叉过敏
- B: 本品务必在单胺氧化酶抑制剂停用 14 日以上方可给药
- C: 产妇分娩镇痛时及哺乳期间用量酌减
- D: 未明确诊断的疼痛，可以使用本品

答案：D

21. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

- A: 禁止接触塑料制品
- B: 禁食热饮热水
- C: 禁食冷饮冷水、接触凉物
- D: 用生理盐水做溶剂

答案：C

22. 老年患者长期大剂量应用 PPIs 可能导致的典型不良反应是

- A: 乳房发育
- B: 骨折
- C: 消化不良

D: 心律不齐

答案：B

23. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

A: 一日一次，睡前使用

B: 一日一次，晨起使用

C: 一日一次，固定时间使用

D: 一日二次，早、晚使用

答案：A

24. （2019 年真题）某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是（）

A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

C: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg

答案：B

25. 以下关于复方托吡卡胺的描述，正确的是

A: 高血压、动脉硬化、冠状动脉供血不足者慎用

B: 可用于术后防止粘连

C: 可诱发未经诊断的闭角型青光眼

D: 妊娠期妇女慎用

答案：A

26. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

- A: 巯嘌呤
- B: 吉非替尼
- C: 紫杉醇
- D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：C

27. （2016 年真题）铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

- A: 头孢曲松
- B: 头孢他啶
- C: 罗红霉素
- D: 利奈唑胺

答案：B

28. 伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者，不宜使用的降糖药物是（）

- A: 比格列
- B: 格列美脲
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：D

29. 抗心绞痛药物的主要目的是（）

- A: 缩小心室容积
- B: 扩张冠状动脉
- C: 减慢心率
- D: 降低心肌耗氧量

答案：D

30. 抑制绦虫细胞内线粒体的氧化磷酸化过程，高浓度时可抑制虫体呼吸并阻断对葡萄糖的摄取，从而使之发生变质的是

- A: 三苯双脒
- B: 伯氨喹
- C: 氯硝柳胺
- D: 葡萄糖酸锑钠

答案：C

31. 属于第二代 α_1 肾上腺素受体阻断剂的是

- A: 西地那非
- B: 度他雄胺
- C: 特拉唑嗪
- D: 他达拉非

答案：C

32. 选择性地兴奋 β

- A: 奈多罗米
- B: 酮替芬
- C: 扎鲁司特
- D: 沙丁胺醇

答案：D

33. 下述药物中，不属于促动力药的是

- A: 莫沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 氢氧化铝
- D: 多潘立酮

答案：C

34. 以下患者中可以使用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的是()

- A: 孕妇
- B: 双侧肾动脉狭窄患者
- C: 高钾血症患者
- D: 高血压患者和心力衰竭患者

答案：D

35. 一日 2 次，早餐和晚餐前 60 分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

- A: 瑞格列奈
- B: 艾塞那肽
- C: 格列齐特
- D: 利拉鲁肽

答案：B

36. 螺内酯利尿的作用机制是

- A: 抑制 Na^+ , K^+ - 2Cl^- 转运系统
- B: 拮抗醛固酮
- C: 抑制碳酸酐酶
- D: 抑制 Na^+ , K^+ - 2Cl^- 同向转运系统

答案：B

37. 长期大量使用林旦后会导致的不良反应是

- A: 眼部水肿
- B: 白细胞减少
- C: 肝脏损害

D: 中枢神经系统毒性

答案：D

38. 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

A: 大环内酯类

B: 氟喹诺酮类

C: 氨基糖苷类

D: 四环素类

答案：B

39. 有激素样作用，长期服用可导致男性乳房发育、阳痿、女性月经失调的是

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 醛固酮

D: 依他尼酸

答案：C

40. 延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

A: 胺碘酮

B: 奎尼丁

C: 维拉帕米

D: 美西律

答案：A

41. 属于芳基乙酸类的是

A: 吲哚美辛

B: 对乙酰氨基酚

C: 塞来昔布

D: 阿司匹林

答案：A

42. (2017 年真题) 影响毛细血管通透性的促凝血药是 ()

A: 鱼精蛋白

B: 维生素 K1

C: 卡巴克络

D: 血凝酶

答案：C

43. 可为患者提供一定的能量，对于长期昏迷的患者尤为适用的药物是

A: 甘露醇

B: 螺内酯

C: 阿米洛利

D: 甘油果糖

答案：D

44. (2018 年真题) 长期大剂量使用，会降低阿司匹林对心血管的保护作用，应避免合用的药物是 ()

A: 贝那普利

B: 布洛芬

C: 格列齐特

D: 阿托伐他汀

答案：B

45. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别骨髓抑制较严重的是

- A: 顺铂
- B: 亚叶酸钙
- C: 卡铂
- D: 奥沙利铂

答案：C

46. 巨幼红细胞性贫血可选用()

- A: 维生素 K
- B: 叶酸
- C: 尿激酶
- D: 肝素

答案：B

47. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 甲睾酮
- C: 非那雄胺
- D: 丙酸睾酮

答案：A

48. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 艾塞那肽
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：C

49. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 丙卡特罗
- B: 沙美特罗
- C: 特布他林
- D: 福莫特罗

答案：D

50. 四环素类首选用于()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 布鲁菌病
- C: 伤寒、副伤寒
- D: 钩端螺旋体病

答案：B

51. 袢利尿药中，结构中不含有磺酰胺基，可以用于对磺胺过敏者的是()

- A: 布美他尼
- B: 依他尼酸
- C: 托拉塞米
- D: 呋塞米

答案：B

52. 属于贝丁酸类的调节血脂药是()

- A: 辛伐他汀
- B: 烟酸
- C: 依折麦布
- D: 非诺贝特

答案：D

53. 头孢曲松()

- A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- B: 用于非典型致病原感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎
- D: 肾毒性较大

答案：C

54. 避孕药的作用机制不包括

- A: 使子宫黏膜内腺体生长
- B: 改变子宫颈黏液
- C: 抑制排卵
- D: 使子宫腺体制造糖原减少

答案：A

55. 激动岛受体，对慢性心力衰竭疗效较好()

- A: 硝普钠
- B: 地高辛
- C: 氨力农
- D: 多巴酚丁胺

答案：D

56. 治疗重度消瘦营养不良的糖尿病的是

- A: 磺酰脲类
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: A 和 B 均无效

答案：C

57. 患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应选

- A: 阿莫西林
- B: 红霉素
- C: 庆大霉素
- D: 奈替米星

答案：C

58. 与碳酸氢钠等碱性药物并用，能引起尿液及粪便变色的是

- A: 酚酞
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 乳果糖
- D: 开塞露

答案：A

59. 改善心肌收缩功能，抑制血管肥厚，可以减低血管僵硬程度，改善动脉顺应性抗高血压药是

- A: 利尿降压药
- B: α 受体激动药
- C: 钙离子通道阻滞药
- D: 血管紧张素转换酶抑制药

答案：D

60. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

- A: 阿托品
- B: 20%甘露醇
- C: 羟苄唑

D: 奥布卡因

答案: A

61. β_3 受体激动后的影响是

A: 增加心率

B: 支气管扩张

C: 脂肪分解

D: 肌肉震颤

答案: C

62. 变异型心绞痛宜选用

A: 维拉帕米

B: 地尔硫

C: 硝苯地平

D: 普萘洛尔

答案: C

63. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

A: 青霉素+氯霉素

B: 青霉素+红霉素

C: 青霉素+阿米卡星

D: 青霉素+四环素

答案: C

64. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用
- B: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗
- C: 口服补液盐是复方制剂，II、II 代表不同的配方
- D: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐

答案：D

65. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

- A: 激活抗凝血酶
- B: 直接对抗血小板聚集
- C: 环氧酶失活，减少 TXA₂ 生成，产生抗血栓形成作用
- D: 降低凝血酶活性

答案：C

66. 银杏叶提取物用于

- A: 早期帕金森病
- B: 神经源性尿崩症
- C: 特发性震颤
- D: 慢性脑功能不全

答案：D

67. 治疗贾第鞭毛虫病最有效的药物是()。

- A: 甲硝唑
- B: 氯喹
- C: 伯氨喹
- D: 奎宁

答案：A

68. 以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

- A: 可待因、吗啡、右美沙芬
- B: 喷托维林、苯丙哌林、可待因
- C: 苯丙哌林、可待因、吗啡
- D: 喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林

答案：D

69. 关于糖皮质激素抗炎作用特点的描述，不正确的是

- A: 抑制白细胞和吞噬细胞移行血管外，减轻炎症浸润
- B: 稳定溶酶体膜，抑制致炎物的释放
- C: 直接收缩血管，减少渗出和水肿
- D: 促进肉芽组织生成，加速组织修复

答案：D

70. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 赖氨酸
- D: 精氨酸

答案：D

71. 对 G

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第四代头孢菌素

答案：A

72. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的药物是

- A: 氯喹
- B: 奎宁
- C: 伯氨喹
- D: 青蒿素

答案：D

73. 短效糖皮质激素是

- A: 氟氢可的松
- B: 氢化可的松
- C: 甲泼尼龙
- D: 地塞米松

答案：B

74. 痛风急性发作时首选的药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 非布司他
- C: 碳酸氢钠
- D: 秋水仙碱

答案：D

75. 单纯性下尿路感染可选择的药物是

- A: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- B: 利奈唑胺+哌替啶
- C: 磷霉素氨丁三醇
- D: 磷霉素钠+万古霉素

答案：C

76. 不溶于水，微溶于有机溶剂的是

- A: 博来霉素
- B: 羟喜树碱
- C: 替尼泊苷
- D: 依托泊苷

答案：B

77. 属于合成的麻醉性镇痛药的是

- A: 美沙酮
- B: 布洛芬
- C: 可待因
- D: 吗啡

答案：A

78. 抑制血管紧张素转化酶的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 氯沙坦
- C: 米力农
- D: 卡托普利

答案：D

79. 治疗铜绿假单胞菌感染选用()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 红霉素
- C: 庆大霉素
- D: 多西环素

答案：C

80. 拓扑异构酶抑制剂

- A: 丝裂霉素
- B: 顺铂
- C: 环磷酰胺
- D: 喜树碱类

答案：D

81. 抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是()

- A: 地高辛
- B: 螺内酯
- C: 毛花苷丙
- D: 米力农

答案：D

82. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: CYP2E1
- B: CYP286
- C: CYP2D6
- D: CYP2C19

答案：D

83. 对曲霉无效的药物是

- A: 伊曲康唑
- B: 伏立康唑
- C: 氟康唑
- D: 两性霉素 B

答案：C

84. 弥散性血管内凝血早期可选用()

- A: 叶酸
- B: 维生素 K
- C: 肝素
- D: 尿激酶

答案：C

85. (2020 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

- A: 乳酸钠
- B: 氯化钠
- C: 硫酸镁
- D: 氯化铵

答案：A

86. 下列关于胺碘酮的叙述，错误的是()

- A: 阻滞心肌细胞钠、钙及钾通道
- B: 降低窦房结和普肯耶纤维的自律性
- C: 对室上性和室性心律失常均有效
- D: 对 α 、 β 受体有激动作用

答案：D

87. (2018 年真题) 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是()

- A: 头孢唑林
- B: 头孢他啶
- C: 头孢呋辛

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 头孢米诺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/035220111122012033>