

黑龙江省金山屯区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库（典型题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 急性室性心律失常可选用

- A: 硝苯地平
- B: 美西律
- C: 利多卡因
- D: 阿托品

答案：C

2. 缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 B12
- C: 叶酸
- D: 铁剂

答案：D

3. 容易引起周围神经炎的抗结核药物的是

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 对氨基水杨酸
- D: 利福平

答案：A

4. 治疗癫痫持续状态可首选

- A: 地西泮
- B: 卡马西平
- C: 硫酸镁
- D: 氯丙嗪

答案：A

5. (2019 年真题) 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是 ()

- A: 多巴胺
- B: 去甲肾上腺素
- C: 地塞米松
- D: 肾上腺素

答案：D

6. 成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日 25~50 μg ，每 2 周增加

- A: 6 μg / kg
- B: 5 μg / kg
- C: 4 μg / kg
- D: 25 μg

答案：D

7. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖
- B: 氟康唑可使华法林代谢加快
- C: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿
- D: 氟康唑抑制卡马西平代谢

答案：B

8. 下列何药对心房颤动无治疗作用

- A: 胺碘酮
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 利多卡因

答案：D

9. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

- A: 月经期妇女
- B: 精神病患者
- C: 妊娠期妇女
- D: 中、老年人

答案：C

10. 促进微管的装配，抑制其解聚

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 他莫昔芬

B: 紫杉醇

C: 长春碱

D: 羟喜树碱

答案：B

11. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水
- B: 服药过程中适当补充维生素 B12
- C: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

答案：A

12. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程，促使细菌死亡，并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应，使原虫的氮链发生断裂的是

- A: 甲氧苄啶 (TMP)
- B: 莫西沙星
- C: 磺胺甲噁唑 (SMZ)
- D: 替硝唑

答案：D

13. 目前首选的口服减肥药是

- A: 鲑降钙素
- B: 奥利司他
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 阿法骨化醇

答案：B

14. 中枢性或肾性尿崩症可选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺

D: 螺内酯

答案：A

15. 人体主要的热能来源之一，被用来补充热量是

A: 葡萄糖

B: 果糖

C: 氨基酸

D: 维生素

答案：A

16. () 与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

A: 地高辛

B: 氨茶碱

C: 糖皮质激素

D: 氯霉素

答案：A

17. (2015 年真题) 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用 ()。

A: 复方托吡卡胺滴眼液

B: 毛果芸香碱滴眼液

C: 左氧氟沙星滴眼液

D: 碘苷滴眼液

答案：A

18. 下列抗肿瘤药物中存在高致吐风险的是

A: 甲氨蝶呤

B: 依托泊苷

C: 顺铂

D: 吉西他滨

答案: C

19. 治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用 ()

A: 阿法骨化醇

B: 葡萄糖酸钙

C: 依降钙素

D: 阿仑膦酸钠

答案: D

20. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次 / 分，R21 次 / 分，BP110 / 70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 肝功能不全者

B: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15~20mg / L 并且长疗程的患者

C: 肾功能不全者

D: 老年人

答案: A

21. 长期用药易发生低镁血症的药物是 ()

A: 胶体果胶铋

B: 复方碳酸钙

C: 奥美拉唑

D: 替普瑞酮

答案: C

22. 呋塞米的利尿作用机制主要是

- A: 抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- B: 抑制碳酸酐酶
- C: 抑制 Na^+-H^+ 交换
- D: 特异性阻滞 Na^+ 通道

答案：A

23. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 惊厥
- B: 心律失常
- C: 支气管痉挛
- D: 血压下降

答案：B

24. 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 喉头水肿、尿潴留
- B: 发热、血管扩张、面色潮红
- C: 头痛、胸闷、气急、出汗
- D: 血压升高或降低、心率加快调

答案：A

25. 普通儿童感冒患者，体温升高 ($>38.5^{\circ}\text{C}$)，宜选用的药物是()

- A: 氯苯那敏片
- B: 茶碱缓释片
- C: 右美沙芬片
- D: 对乙酰氨基酚滴剂

答案：D

26. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 赖氨酸

C: 复方氨基酸(18AA)

D: 精氨酸

答案：D

27. 维 A 酸类药物不能用于下述哪种疾病

A: 鱼鳞病

B: 银屑病

C: 角化异常性皮肤病

D: 光敏性皮肤病

答案：D

28. 不宜应用喹诺酮类药物的人群是

A: 婴幼儿

B: 溃疡病患者

C: 肝病患者

D: 老年人

答案：A

29. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节感染的药物是()

A: 青霉素

B: 四环素

C: 万古霉素

D: 林可霉素

答案：D

30. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是()

- A: 长春瑞滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 吉西他滨
- D: 巯嘌呤

答案：D

31. 对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

- A: 多柔比星
- B: 柔红霉素
- C: 表柔比星
- D: 吡柔比星

答案：A

32. 青霉素的抗菌谱不包括

- A: 破伤风杆菌
- B: 脑膜炎双球菌
- C: 肺炎球菌
- D: 伤寒杆菌

答案：D

33. 卡泊三醇禁用于

- A: 高钙血症患者
- B: 低钙血症患者
- C: 低钠血症患者
- D: 高钠血症患者

答案：A

34. 作用更为持久和抑制新骨形成的作用极低，可长期滞留于骨组织中，半衰期最长可达 300 日的第二代钙代谢调节药是

- A: 依替膦酸二钠
- B: 唑来膦酸
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 帕米膦酸二钠

答案：D

35. 巨幼红细胞性贫血应首选

- A: 叶酸+维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 亚叶酸钙
- D: 维生素 B

答案：A

36. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的是()

- A: 12 岁以下儿童禁用孟鲁司特钠
- B: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作
- C: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗
- D: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

答案：D

37. (2015 年真题) 治疗侵袭性念珠菌病首选 ()。

- A: 伏立康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 氟康唑

D: 氟胞嘧啶

答案: C

38. 通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

A: 青蒿素

B: 奎宁

C: 吡喹酮

D: 乙胺嘧啶

答案: A

39. 具有双向作用，小剂量时抑制骨吸收，大剂量时抑制骨形成的药物是()

A: 依替磷酸二钠

B: 阿仑磷酸钠

C: 帕米磷酸二钠

D: 氯屈磷酸二钠

答案: A

40. 属于雌激素类退乳药的是()

A: 他莫昔芬

B: 己烯雌酚

C: 甲羟孕酮

D: 睾酮

答案: B

41. 多巴胺受体阻断物的代表药物为()

A: 甲氧氯普胺

B: 格雷司琼

C: 托烷司琼

D: 昂丹司琼

答案：A

42. 氨基糖苷类的主要排泄途径是

A: 主要经呼吸道排泄

B: 经肝、肾双途径清除

C: 主要经肾脏排泄

D: 主要经肝脏清除

答案：C

43. 低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A: 每日化疗前，应用 5-HT

B: 5-HT

C: 奥美拉唑+口服地塞米松

D: 5-HT

答案：A

44. 大剂量使用维生素 K

A: 肝素

B: 双香豆素

C: 维生素

D: 氨甲苯酸

答案：A

45. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 螺内酯
- B: 二甲双肌
- C: 氯化钾
- D: 美司钠

答案：D

46. 显著降低糖尿病或肾病患者蛋白尿及微量蛋白尿的抗高血压药物是

- A: 贝丁酸类
- B: 血管紧张素转换酶抑制剂
- C: 血管紧张素 II 受体阻断剂
- D: 烟酸

答案：C

47. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

- A: 噻托溴铵
- B: 氨溴索
- C: 沙丁胺醇
- D: 喷托维林

答案：A

48. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 阿利克仑
- B: 地尔硫（ CC 卓）
- C: 坎地沙坦
- D: 左旋氨氯地平

答案：C

49. 在痛风急性期，应禁用的抗痛风药是

- A: 别嘌醇
- B: 布洛芬
- C: 舒林酸
- D: 秋水仙碱

答案：A

50. 属于头霉素类抗菌药物的是

- A: 氨曲南
- B: 头孢美唑
- C: 头孢他啶
- D: 头孢噻肟

答案：B

51. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 梗阻性肥厚型心脏病
- B: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- C: 慢性收缩性心力衰竭
- D: 室性心动过速、心室颤动

答案：C

52. 患儿，女，10岁，体重35kg，因发热、咳嗽10日而入院。体温波动于38.5℃~39.5℃之间，咳嗽为刺激性干咳，少痰，以清晨及夜间为著。于外院先后静点青霉素及头孢类抗生素共6日，病情无明显好转。查体：一般状态良，双肺呼吸音粗糙，余无阳性体征。血常规正常，结核菌素试验阴性，X线胸片示右肺中叶大片状阴影。临床诊断考虑为支原体肺炎。

A: 7日

B: 10 日

C: 5 日

D: 12 日

答案：A

53. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

A: 第三代头孢菌素

B: 第四代头孢菌素

C: 第一代头孢菌素

D: 第二代头孢菌素

答案：B

54. 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

A: 复方薄荷脑滴鼻液

B: 鲑鱼降钙素鼻喷剂

C: 异丙托溴铵吸入剂润德教育

D: 氟替卡松鼻喷剂

答案：A

55. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

A: 阿瑞吡坦

B: 格雷司琼

C: 甲地孕酮

D: 甲氧氯普胺

答案：B

56. 可用于恶性淋巴瘤的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 利妥昔单抗
- C: 甲氨蝶呤
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

57. 抑制真菌中由细胞色素 P450 介导的 14 α -甾醇去甲基化，从而抑制真菌细胞膜主要固醇类——麦角固醇的生物合成，损伤真菌细胞膜并改变其通透性，以致细胞内重要物质摄取受影响或流失而使真菌死亡的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 两性霉素
- C: 万古霉素
- D: 伊曲康唑

答案：D

58. 5 岁以下儿童首选的散瞳剂是

- A: 10%去氧肾上腺素滴眼剂
- B: 2%后马托品眼膏剂
- C: 1%硫酸阿托品眼膏剂
- D: 四环素可的松眼膏剂

答案：C

59. 以下激素的关系错误的是

- A: 促皮质素促进糖皮质激素的分泌
- B: 促皮质素释放激素促进促皮质素的分泌
- C: 糖皮质激素抑制促皮质素的分泌
- D: 糖皮质激素促进促皮质素释放激素的分泌

答案：D

60. 可引起听力减退或暂时耳聋的利尿药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：C

61. 达那唑的适应证不包括

- A: 白细胞减少症
- B: 纤维性乳腺炎
- C: 男性乳房发育
- D: 子宫内膜异位症

答案：A

62. 关于红霉素使用的叙述，错误的是

- A: 在明确需要的情况下可在妊娠期使用
- B: 重症肌无力病史的患者使用有病情加重的风险
- C: 主要由肝脏代谢，代谢物由肾脏排出
- D: 老年人使用发生尖端扭转型室性心动过速的风险增加

答案：C

63. 患者，女，72 岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

- A: 华法林
- B: 双氯芬酸
- C: 奥美拉唑

D: 氯吡格雷

答案: A

64. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性, 可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

A: 环丙孕酮

B: 地屈孕酮

C: 甲羟孕酮

D: 屈螺酮

答案: B

65. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是

A: 此类药物需在餐前即刻服用

B: 格列美脲属于本类药物

C: 此类药物不能单独服用

D: 此类药物可降低 2 型糖尿病者的餐前血糖

答案: A

66. 氨基糖苷类抗菌药无效的是

A: 结核杆菌

B: 需氧革兰阴性菌

C: 铜绿假单胞菌

D: 厌氧菌

答案: D

67. 可导致凝血酶原时间延长的是

A: 奥硝唑+乙醇

B: 替硝唑+华法林

C: 甲硝唑+乙醇

D: 替硝唑+苯巴比妥

答案: B

68. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

A: 乙胺嘧啶

B: 甲硝唑

C: 吡喹酮

D: 三苯双脒

答案: C

69. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

A: 膦甲酸钠

B: 奥司他韦

C: 两性霉素 B

D: 制霉菌素

答案: C

70. (2018 年真题) 不能减小前列腺的体积, 也不能降低 PSA 水平, 但可松弛前列腺平滑肌, 缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是 ()

A: 非那雄胺

B: 坦索罗辛

C: 他达拉非

D: 西地那非

答案: B

71. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A: 与氯化钠和碱性溶液(特别是氟尿嘧啶)之间存在配伍禁忌
- B: 应给予预防性或治疗性的止吐用药
- C: 直肠癌的首选药之一
- D: 其神经系统毒性与剂量大小无关

答案：D

72. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 胺碘酮
- B: 拟交感药
- C: 多巴胺
- D: 考来烯胺

答案：C

73. β 受体阻滞药降低眼压的作用机制是()

- A: 缩小瞳孔，开放前房角
- B: 增加房水的葡萄膜巩膜通路的外流和引流
- C: 减少房水生成，促进房水引流的排出
- D: 增加房水经小梁网的外流，降低眼压

答案：C

74. 磷霉素的主要抗菌作用机制是

- A: 抗叶酸代谢
- B: 增加细菌胞浆膜的通透性
- C: 干扰细菌细胞壁的合成
- D: 抑制细菌蛋白质合成

答案：C

75. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

- A: 尽量选择三价铁
- B: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- C: 注意预防铁负荷过重
- D: 选择适宜的病期、疗程和监测

答案：A

76. 治疗立克次体感染所致斑疹伤寒应首选

- A: 链霉素
- B: 青霉素
- C: 四环素
- D: 庆大霉素

答案：C

77. 叶酸与维生素 B12 联用治疗

- A: 溶血性贫血
- B: 小细胞低血红蛋白性贫血
- C: 巨幼细胞贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：C

78. 茶碱类主要用于

- A: 气管炎
- B: 支气管扩张
- C: 肺不张
- D: 支气管哮喘

答案：D

79. 有明显肾毒性的药物是

- A: 四环素
- B: 庆大霉素
- C: 诺氟沙星
- D: 青霉素

答案：B

80. 大剂量具有抗雄激素作用,可用于子宫内膜癌或肾癌的药物是

- A: 环丙孕酮
- B: 地屈孕酮
- C: 屈螺酮
- D: 甲羟孕酮

答案：A

81. (2021 年真题) 用于治疗湿性视网膜黄斑变性的药物是 ()

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 聚乙二醇滴眼液
- C: 硫酸阿托品眼用凝胶
- D: 雷珠单抗注射液

答案：D

82. 可影响胞浆膜通透性,引起细胞内重要物质外漏的药物是

- A: 多黏菌素
- B: 环丙沙星
- C: 特比萘芬
- D: 庆大霉素

答案：A

83. 适用于吸烟的老年哮喘患者，且不易产生耐受性的药物是

- A: 沙美特罗
- B: 异丙托溴铵
- C: 特布他林
- D: 布地奈德

答案：B

84. 阿糖胞苷属于

- A: 核苷酸还原酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: DNA 多聚酶抑制剂
- D: 胸苷酸合成酶抑制剂

答案：C

85. 尤其适用于伴有精神症状的儿童癫痫患者的是

- A: 乙琥胺
- B: 卡马西平
- C: 苯妥英钠
- D: 丙戊酸钠

答案：B

86. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用
- B: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 典型不良反应是恶心、呕吐、腹泻

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/035230134134012040>