

全科医学(医学高级): 眼科疾病考试试题(强化练习)

1、单选 糖尿病性视网膜病变II期的表现是()。

- A. 微动脉瘤或并有小出血点
- B. 白色软性渗出或并有出血斑
- C. 黄白色硬性渗出或并有出血斑
- D. 眼底有新生血管和纤维增生
- E (江南博哥). 眼底有新生血管或并有玻璃体积血

正确答案: C

2、多选 继发性青光眼引起眼压升高的原因()。

- A. 晶体混浊
- B. 眼球内容增加
- C. 眼外伤
- D. 房水排出多阻
- E. 散瞳造成

正确答案: B, D

3、单选 流行性出血性结膜炎传染途径为()。

- A. 呼吸道感染
- B. 消化道感染
- C. 接触传染
- D. 血液传染
- E. 空气传染

正确答案: C

4、单选 平行光线经过某镜片后在2m处形成焦点, 该镜片的屈光力为()。

- A. 2D
- B. 1D
- C. 3D
- D. 0.5D
- E. 0.25D

正确答案: D

5、单选 女, 34岁, 今晨突然恶心、呕吐, 伴眩晕, 视物旋转。查体: 双眼球震颤, 最可能的诊断为()。

- A. 青光眼
- B. 急性迷路炎
- C. 脑炎
- D. 癫痫
- E. 尿毒症

正确答案: B

6、单选 哪种白内障最常见()。

- A. 先天性白内障
- B. 外伤性白内障
- C. 老年性白内障
- D. 并发性白内障
- E. 继发性白内障

正确答案： C

7、多选 预防急性出血性结膜炎中，应采取（）。

- A. 隔离患者
- B. 用公用眼药水进行人群滴眼预防
- C. 加强公共浴池和游泳池管理
- D. 不使用公共洗脸用具
- E. 接诊医生应加强消毒

正确答案： A, C, D, E

8、单选 男性，17岁，右眼被铁屑崩伤1小时。检查见角膜缘处结膜伤口2mm，眼部检查未发现异物，下一步应进行（）。

- A. 眼电生理检查
- B. X线片
- C. 磁共振检查
- D. 缝合伤口
- E. 手术探查

正确答案： B

9、单选 结膜充血表现为（）。

- A. 靠近角膜缘充血明显
- B. 色泽暗红
- C. 靠近穹隆部充血明显
- D. 充血位于深层
- E. 呈放射状，模糊不清

正确答案： C

10、单选 下列眼病中，哪一种眼病不是致盲性眼病（）。

- A. 急性闭角型青光眼
- B. 老年白内障
- C. 角膜化学烧伤
- D. 单纯疱疹性角膜炎
- E. 急性卡他性结膜炎

正确答案： E

11、单选 患者被玻璃瓶炸伤右眼，检查见右角膜裂伤3mm，前房内大量出血，眼内其他结构看不清，下一步应（）。

- A. 眼B型超声波检查

- B. X 线摄片
- C. 前房穿刺放出积血
- D. 使用止血药，待出血吸收后进一步检查
- E. 间接眼底镜检查

正确答案： A

12、单选 真性糖尿病性白内障的临床特征不包括（）。

- A. 年龄较轻，多发生在 30 岁以下
- B. 双眼发病、进展迅速
- C. 晶状体呈雪花样混浊或点状混浊
- D. 伴有屈光变化
- E. 术前要控制血糖

正确答案： D

13、单选 急性卡他性结膜炎治疗中，下列哪一项处置是不正确的（）。

- A. 滴用抗生素眼膏
- B. 滴用抗生素眼水
- C. 冲洗结膜囊
- D. 热敷并遮盖患眼
- E. 适当休息

正确答案： D

14、单选 屈光性近视主要是由于（）。

- A. 角膜或晶状体曲率过小
- B. 眼轴长度短于正常范围
- C. 角膜或晶状体曲率过大
- D. 眼轴长度超出正常范围
- E. 角膜或晶状体直径过大

正确答案： C

15、单选 在眼病诊断中，较有参考价值的是（）。

- A. 矫正视力
- B. 裸眼视力
- C. 针孔视力
- D. 远视力
- E. 近视力

正确答案： A

16、单选 紫外线损伤主要造成（）。

- A. 虹膜损伤
- B. 视网膜灼伤
- C. 晶状体损伤
- D. 角膜上皮脱落

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036024233121010142>